

欽定四庫全書

子部

傷寒總病論卷三



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士臣趙正范

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

傷寒總病論卷三

結胃證

宋 龐安時 撰

病發於陽而反下之熱入內作結胃其病心下堅滿按之如石鞭而痛嘔強如柔產狀其脉寸口浮關上尺中皆沈或沈緊名曰結胃也下之則和宜大陷胃湯今作煮散

大黃

一兩半

芒硝

一兩八錢半

甘遂末

一字

異末先以水一升半煎大黃半升絞去大黃滓下硝末更煮一二沸內甘遂末和勻溫分二服一服快利止後服如作者散即先以水一盞煎大黃末四錢匕至八分下硝末二錢匕候化勻下甘遂末半錢匕沸勻溫服之移時未利再煎一服快利為度

藏結如結胃狀飲食如故時時下利寸口脉浮關上脉小細沈緊名曰藏結舌上白苔生者難治藏結無陽證

不往來寒熱其人反靜舌上苔滑不可攻也

結胃證其脉尺寸浮大者不可下下之則死

結胃證悉具煩躁甚者死

太陽病脉浮而動數浮則為風數則為熱動則為痛數則為虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒表未解也醫反下之動數變遲胃內拒痛胃中空虛宿熱動胃短氣煩躁心下懊懷陽氣內陷心下固鞭則為結胃大陷胃湯主之若不結胃但頭汗餘處無汗齊頸而還小便不利

身必發黃也

結胃無大熱者此為水結在胃脇也但頭微汗出者宜大陷胃湯

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌燥而渴日晡則少有潮熱從心下至小腹滿而痛不可近者宜大陷胃湯

虛弱家不耐大陷胃湯即以大陷胃丸下之

結胃者項亦強如柔瘕狀下之則和宜大陷胃丸

大黃^{四兩} 葶藶子^{一兩半} 朴硝^{一兩八錢} 杏仁^{二合}

杵二味內杏仁朴硝合研如脂丸如彈子大抄甘遂末一錢白蜜二合水二升煮取一升溫頓服之一宿乃下不下更服

小結胃正在心下按之則痛脉浮滑者宜小陷胃湯

半夏^{六錢半} 黃連^{一分} 栝樓^{一枚用四錢}

呔咀水三升煮栝樓至二升下諸藥煮取一升去滓溫溫服一盞食頃再服一日盡劑微解下黃涎即愈

太陽病下之脉促者不結胃此為欲解也脉浮者必結
胃脉緊者必咽痛脉弦者必兩脇拘急脉細數者頭痛
未止脉沈緊者必欲嘔脉沈滑者協熱而利脉浮滑者
必下血

寒實結胃無熱證者與三物白散方

小陷胃者非也

桔梗

三分

巴豆

一分

貝母

三分

細末內巴豆研勻白飲調下一錢羸人減之病在胃
上必吐在胃下必利未利啜熱粥投之利過不止飲

冷粥止之

龐曰近世治結胃多行針頭丸用硫黃陽起石者若病熱毒甚者必死唯治冷結寒實耳

心下痞證

病發於陰而反下之為痞

發熱惡寒為陽誤下則為結胃無熱惡寒為發於陰誤下

則為痞氣

傷寒下之後若發熱汗出者為欲解若心下滿而鞭痛者此為結胃也但滿而不痛此為痞氣宜半夏瀉心湯

甘草 黃芩

乾薑

人參

各一兩半

黃連

半兩

大棗

六枚

半

夏

一兩一分

呖咀水六升煮取三升去滓再煎一升半溫溫飲一

盞日三夜二

設下後津液入裏胃虛上逆寒結在心下故宜辛甘發散半夏下氣若能去濕

兼通心氣又甘草力大故乾薑黃連不能相惡也

心下痞按之濡其脉關上浮者宜大黃黃連瀉心湯

大黃

一兩

黃連

黃芩

各半兩

呖咀以鰕眼沸湯一升漬之須臾絞去滓溫溫分四

服得利止後服

寒濕迫心氣不行欲作熱也

心下痞悶而復惡寒汗出者大黃黃連瀉心湯內加附

子主之

附子

一枚炮去皮尖四破以水三合煎一合去附子以附子汁內湯中和勻服之

與瀉心湯而痞不解其人渴而口乾燥小便不利者五

苓散主之

方在可水證中

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噫食臭脇下

有水氣腹中雷鳴下利宜生薑瀉心湯

生薑

二人

參

甘草

黃芩

各一兩半

半夏

一分

大棗

六枚

黃連 乾薑

各半兩

呔咀水五升煮取三升去滓再煎取一升半溫作四

服

胃中不和為少陽水氣所制故用二薑之辛味

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞭也甘草瀉心湯主之

甘草

二兩

黃芩

乾薑

人參

各半兩

半夏

一分

大棗

六枚

黃連

半兩

哎咀水五升煎至三升去滓再煎取一升半溫作四

服

胃虛故加甘味

大下後復發汗心下痞惡寒者表未解不可攻痞當先

解表表解乃可攻痞攻痞宜大黃黃連瀉心湯

前加附子是汗

出多而惡寒表汗解而裏結未除故也此證是發後無汗惡寒故先須解表也

傷寒發熱汗出不解心下痞鞭吐嘔下利者大柴胡湯

主之

汗出嘔吐下利是胃中津液燥裏有結實非胃虛也故以大柴胡湯下之

病人脇下素有痞連臍傍引小腹入陰筋者此為藏結死

陽毒證

初得病一二日便成陽毒或服藥吐下後變成陽毒其病腰背痛煩悶不安狂言欲走或見鬼或下利其脉浮大而數面赤發斑如錦紋咽喉痛吐下膿血五日可治七日不可治升麻湯主之不可作煮散

升麻

當歸

甘草

各二分

雄黃

研一分

桂枝

一分

鼈甲

半兩

蜀椒分半

呔咀水二升煎一升去滓溫服一盞食頃再服溫覆手足出汗汗出則解未解重作之得吐尤佳

陽毒宜葛根龍膽湯

方在雜發汗證中

陰毒證

初得病一二日便成陰毒或服藥六七日以上至十日變成陰毒其病身重背強腹中絞痛咽喉不利毒氣攻心心堅強氣不得息嘔逆唇青面黑四支厥冷其脉沈

細而緊仲景云陰毒之候如被杖喉咽痛五六日可治

七日不可治甘草湯主之

不可作
煮散

甘草

鼈甲

升麻

當歸

桂枝

各二
分

蜀椒

一雄
分

黃

一個

呔咀水三升煎取一升去滓溫溫每飲一盞食頃再

服溫覆中毒當汗吐之汗吐則愈不吐再服之

治陰毒反陰丹

硫黃

五兩
研末

太陰玄精石

味鹹者
研末

硝石

研末各
二兩

用鐵銚子先鋪玄精石一半次鋪硝石一半中間下
硫黃又以硝石蓋硫黃都以玄精石蓋之用蓋子合
定令三斤炭火燒令得所勿以烟出多急取出以瓦
盆合定地下四面灰擁勿令烟出直候冷取細研蒸
餅心丸豌豆大艾湯下十五丸病重加至二三十丸
此法甚驗喘促吐逆者入口便安服此藥三五服覺
不退便於臍下一寸半灸之須是大炷百壯未愈可
至二百壯若手足極冷小便澀小腹鞭疔痛囊縮即