

欽定四庫全書

子部

博濟方卷四



南京中医药大学图书馆版权所有

博濟不卷四

宋王袞編

胎產

婦人藥石當以月信爲

備所須及合用湯藥仍

吉人於五臨事

以至不周如產婦但腹

未
州
疾
者
課
未
庭
候
也

坐產有坐產卧產各須

其間不得稍有僭仰

先生失道如未是其時

力衝擊於兒以致生疾

切忌產時傍人不得揮霍恐驚動產母只可令一兩老成并親屬人扶持令行或不能行即須且立直候兒逼生方可得正產或正卧切忌上草太早生病極多子母纔分莫問兒女速與童子小便一盞及逐惡血藥一服下得令便卧且候移時背靠軟物仰卧立膝高搯牀頭厚鋪裯褥遮障孔隙免有賊風所傷仍須三日內常令產婦鼻內聞猛醋烟以備血暈也又不得教熟睡頻喚省緣氣血全虛恐生昏亂凡在一七日內唯頻服童子

小便醇酒各半盞煎令沸放溫服日五七劑及食白淡
粥二七日食淡膾肉三七日漸食滋味一月內菜實生
冷恚怒嗔愁並皆不可稍染微病即成大病一百日內
氣血未和勿恃平寧便為無事往往自恣輒成大病凡
十二月產帳及藏胎衣但向月德月空上皆可假令正
月即月德在丙月空在壬上坐產婦丙上藏胎衣如壬
位不便即於丙上安之亦得但於集聖厯日上檢看備
詳也

藿香散 安胎和氣利胃膈治噎塞阻食

藿香 人參 茯苓去皮 白芷 甘草 威靈

仙 桔梗

右七味各等分杵為末每服二錢水一盞生薑三

片同煎六分溫服

阿膠散 治妊傷寒安胎出汗

大獨頭蒜

一顆以秋瓜蔓裹了外用黃泥固濟定以炭火二斤燒令通赤放冷打開

取出細研如未有瓜蔓但只以瓜根半兩代之

羌活 獨活 蒼朮

米泔浸一宿
去粗皮焙

紫苑 白朮 人參 附子炮去

皮

阿膠

真好者已上各一分

甘草

半兩炙

右一十味都擣為細末每服一大錢水一盞入連

鬚葱白一寸同煎至七分溫服如人行十里許連

二服至三服末後一服吃了便以冷水漱口一二

十遍漱罷以衣微蓋汗出大妙

催方滑胎散 治疼痛

槐子

炒

麥蘖

炒

貝母

炒

滑石

當歸

各炒

等分

右五味同為細末每於未產月十日前每日空心
用溫酒下二錢

滑胎散 產前服

牽牛子

一兩

赤土

少許

右二味研令極細母覺陣頻時煎榆白皮湯調下

一錢

又方

用臘月兔頭腦髓一箇攤於紙上均剪作符子
於上面書生字一箇覺陣頻動時於母釵子股
上夾定燈焰上燒灰盞子盛了煎丁香酒調下
治子死胎中方

黃明乳香

不限
多少

右於端午時或歲除夜收豬心血相和研為丸如
雞豆大以紅絹袋盛掛於門上如患者以冷酒磨
下一丸

備急丹 治產後惡血衝心或胎衣不下腹中血塊等

用錦文新大黃一兩杵羅為末用頭醋半斤同

熬成膏丸如梧桐子患者用溫醋湯七分一盞

化五丸服之須臾取下亦治馬墜內損者

香桂散 治產後臍下疼痛不止 產寶諸方作當歸散

當歸 川芎 各一分 官桂 去皮半兩

右三味同為細末分作三服每服酒一盞煎三五沸更入童便少許同煎至七分溫服甚者不過再

服必瘥

金黃散 治產後惡血攻心時發燥

蒲黃半兩 延胡索一兩 桂心一分

右三味杵為細末每服一錢用烏梅湯放冷調下

金花散 治逐惡物止腹疼

桂心去皮 威靈仙 白芷 當歸 牡丹皮各等

分

右五味同杵為末每服二錢煎麴湯調下大凡婦

人產後更須常體問產婦如所出惡物多即不須再三下之過即血虛氣極煩悶暈亂而生病焉如覺比常少及不行切須急攻之緣血隨氣行上掩於心故令煩悶而心滿急二者為異切在審詳蓋產婦體虛切不得妄亂進與湯散如別無狀候但與調氣治血湯散最妙

沒藥丸

治產後心胃煩燥惡血不快

沒藥

蠻薑

延胡索

乾漆

當歸

牛膝

牡丹皮

桂心

去皮

乾薑

各等分

右九味同為細末醋煮麴糊為丸如桐子大煎麴湯下十丸至十五丸不拘時

延胡散

治產後血渴不止

延胡索

鬱金

乾葛

官桂

去皮

青橘

去白

枳殼

各等分

右六味並以好醋浸一宿炙乾杵為細末每服一錢冷橘皮湯下不過三服差

常山飲 治產後血海虛乘熱發狂悶亂作時

常山 石膏 大黃煨 甘草炮 鼈甲醋炙

柴胡去皮

右六味各等分為末每服三錢水二盞煎至一盞
放冷服兼治室女體熱紅脈不行

芸臺散 治產後心腹諸疾

芸臺以紙襯炒 當歸 官桂 赤芍藥各等分

右四味為末每服二錢煖酒下趕下惡物

蓬莪茂散 治產後血海氣虛腹臟疼痛心胃症悶每

遇紅脈行或多或少及有塊積者

蓬莪茂

當歸

細切炒

大黃

紙裹慢火煨候紙黃佳

桃

仁

去尖麤炒黃色各一兩

桂心

芎藭

牡丹皮

木

香

延胡索

炒用

赤芍藥

各半兩

右一十味搗為細末每服一錢溫酒調下午前臨

卧各一服

大聖通真丸

馬鳴退

二兩
灰秤

人參

一兩
去蘆

甘草

二兩
炮

防風

一兩
分去蘆

當歸

二分
炙

芍藥

二兩

桔梗

三兩

石

膏

二兩
研如粉

白芷

一兩
一分

乾薑

一兩
炮

附子

一兩

炮

芎藭

一兩

藁本

一兩

澤蘭

二兩
一分

白蕪荑

一兩

川椒

三兩
出汗
取紅秤

栝子仁

一兩

石茺莢

一兩

一分
醋炒

蟬退

二兩
炒

蒼朮

一兩
炒

白薇

一兩

白

一兩

術

厚朴

一兩
一分
入生薑汁塗炙令香熟

木香

黃耆

牛膝

各一兩
本
法
原
不
用
此
三
味
好
事
者
加
之
亦
得

右二十六味擣羅為末煉蜜為丸如彈子大每日
空心茶酒任下 療八風十二脾寒氣乳風血瘀
又治胎不安子在腹中死兼療萬無不効 如胎
不安服一九便止 如娠時臨月日服一九至產
不知楚痛消去寒熱 如產衣復發惡露中風兼
傷寒汗不出以麻黃三分去根節杵末酒煎下藥
九汗出如多更進一九便止 腸堅積聚朝暮進
一九 陰中痛月經不調不過三九即差 又絕

產無子朝暮服之 輒因有子四肢脹滿洩利嘔
吐不能飲食赤白痢如因產惡物積於大腸中風
口噤不語挑開口研酒化一丸灌之即愈 男子
女人萬病悉皆治之言有所療說不具盡若阻道
途有疾輕重以意服兼治傷寒

大聖散 治婦人產前產後一切疾患大能安胎和氣
或子死腹中疔刺疼痛產後血暈血癖血滯血崩勞
血入四肢應是血臟患者并胎衣不下及傷寒嘔吐