

欽定古今圖書集成博物彙編草木部

第一百二十六卷目錄

鬼臼部彙考

鬼臼圖

鄭樵通志昆蟲草木部

本草綱目鬼臼

鬼臼部藝文一

差葉花贊

鬼臼部藝文二

瓊芝料

鬼臼部鉅錄

鬼針部彙考

本草綱目鬼針草

王孫部彙考

王孫圖

本草綱目王孫

王孫部紀事

王孫部雜錄

郎能部彙考

郎能圖

爾雅釋草

本草綱目鬼臼

佛甲部彙考

佛甲草圖

佛甲草圖

佛甲草圖

仙人部彙考

仙人草圖

本草綱目仙人草

仙人部藝文

仙人草贊

仙陽部彙考

仙陽圖

仙陽圖

仙陽圖

仙陽圖

仙陽圖

仙陽圖

仙陽圖

仙陽圖

仙陽圖

仙陽圖

仙陽圖

仙陽圖

仙陽圖

仙陽圖

仙陽圖

仙陽圖

仙陽圖

仙陽圖

仙陽圖

仙陽圖

仙陽圖

仙陽圖

仙陽圖

仙陽圖

宋謝惠達

宋謝惠達

宋謝惠達

宋謝惠達

宋謝惠達

宋謝惠達

宋謝惠達

宋謝惠達

宋謝惠達

宋謝惠達

宋謝惠達

宋謝惠達

宋謝惠達

宋謝惠達

宋謝惠達

宋謝惠達

宋謝惠達

宋謝惠達

宋謝惠達

宋謝惠達

宋謝惠達

宋謝惠達

宋謝惠達

宋謝惠達

宋謝惠達

宋謝惠達

宋謝惠達

宋謝惠達

獨荷草土部本草

早荷圖

唐凌鏡

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

山荷葉圖

八角盤圖

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

獨荷草

早荷圖

唐凌鏡

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

獨荷草

早荷圖

唐凌鏡

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花

差葉花



欽定古今圖書集成博物彙編草木部

第一百二十六卷目錄

鬼臼部彙考

鬼臼圖

鄭樵通志昆蟲草木略

本草綱目鬼臼

鬼臼部藝文一

羞蕙花贊

鬼臼部藝文二

瓊芝軒

鬼臼部鉅錄

鬼針部彙考

本草綱目鬼針草

王孫部彙考

王孫圖

本草綱目王孫

王孫部紀事

王孫部雜錄

郎能部彙考

郎能圖

爾雅釋草

本草綱目鬼臼

佛甲部彙考

佛甲草圖

佛甲草

仙人部彙考

仙人草圖

仙人草

本草綱目仙人草

仙人部藝文

仙人草贊

仙陽部彙考

仙陽圖

本草綱目仙陽

仙陽部雜錄

參參部彙考

參參圖

本草綱目參參

宋謝惠連

草木部第一百二十六卷

鬼臼部彙考

釋名

鬼臼

天目

解毒

馬目

羞蕙花

瘦田草

九日

鬼臼

辟瘴

吉母草

木律草

獨脚蓮

獨荷草

早荷

唐菱鏡

羞蕙花

山荷葉

八角盤

羞蕙花

羞蕙花

羞蕙花

羞蕙花

羞蕙花

羞蕙花

羞蕙花

羞蕙花

羞蕙花

羞蕙花

羞蕙花

羞蕙花

羞蕙花

羞蕙花

羞蕙花

羞蕙花

羞蕙花

羞蕙花

羞蕙花

羞蕙花

羞蕙花

羞蕙花

羞蕙花

羞蕙花

羞蕙花

羞蕙花



鬼臼圖

鄭樵通志

昆蟲草木略

鬼臼曰羞蕙曰馬目曰毒公曰九日曰天曰白解毒藥

如荷葉形似烏掌年長一莖莖枯則根為一白服食

家用之以九日相連者為佳亦名八角盤以其葉然

也

本草綱目

鬼臼釋名

陶弘景曰鬼臼根如射干白而味甘九日相連有毛

耆良故名

李時珍曰此物有毒而如鴆殺故名馬目毒公版
醫經故有身自生葉如雞如蟹故得生蟲生則
舊田故有鏡草連子等語各縣東坡前苗生云稱
田草俗呼爲鹿鏡即本草鬼臼也歲生一白如黃精
根而甚堅韌可以辟瘴宋祁劍南方物贊云基天花樹
地處瘴疔乃依生樹花被葉自隱俗名羞天子改爲
羞萊花即其草耳也贊云冒葉而茂莖修葉大廣
莖作花葉上其白以自蔽故有毒差別有基天草
與此不同卽海芋也

集解

別錄曰鬼曰生九具山谷及冤句二月八月采根
陶弘景曰鬼曰生山谷中八月采陰乾似射干米輩
又似鈎吻有兩種出錢塘近道者味甘上有叢毛最
勝出食稻稈與者大而味苦無叢毛力劣今馬目等
公狀如黃精根其曰盧氏馬服而柔潤今方家多用
鬼曰而少用毒公不知此邪復乖越如此

蘇恭曰鬼曰生深山巖石之陰葉如芭麻重樓蒼生一莖壹蠟一葉亦有兩歧者年長一莖壹枝則爲一日假令生來二十年則有二十日壹蠟九日耶根肉皮餐並似射干今俗用多是射干而江南別送一物非真者今荊州富陽縣峽州遠安縣襄州荊山縣山中並貢之亦極難得

蘇頌曰今江寧府舒舒商杭襄峽州荊門軍亦有之並如蘇恭所說花生莖間赤色三月開後結實又一說鬼臼生深山陰地葉六出或五出如鴈掌草端一葉如繖旦時東向及暮則西傾蓋隨日出沒也花

紅紫如荔枝正在萼下常爲葉所蔽未嘗見日一年生莖枯則爲一曰及八九月則八九日突然一半白生而一曰臨歲陳新相易也俗名害母草今年龜毛頭草亦然新苗生則舊苗死前年之白爛矣而本草注謂今似射干今射干體狀雖相似然日形淺薄與鬼曰大異鬼曰如八九點兩星則比相疊而色澤正如射干者當使人求苗來之市中不復有也

李時曰：鬼曰俄奴，天南星相學多狀妖世人龜龜。小童曰：南星，一名鬼曰珠，爲時撰黃山人龜龜云：唐虞魏晉，其時鬼名各異，天即鬼曰也。成生曰：蒲一，一葉則可爲葉，今方家乃以鬼爲葉，爲鬼曰蒲一。又曰：柳極細，名鬼曰小荷形，如鳥掌之也。葉草，其根似爲一曰亦名八角，聲門其葉年之久，此說則非，今人所謂獨脚蓮也。又名山荷葉，偶俗呼旱荷葉，八角饒南方處，深山陰密處有之，北方雖間見，土屋山有一二莖，葉上莖生葉心而中，實一葉，其葉間如初生小荷葉者，其根似葉，作瓜，李香，開花在葉下，亦有無花者，其根似假木葉，紫而厚，嫩葉未根制三黃沙，未或三其葉八角者，更甚，若荷曰惡草，然使生土田間，則害他物草，早布餘種，亦有分別開，近以近日，毒公與鬼曰白重二物殊爲一類。物有一種也，又唐蒲孤治外，居陂原，今付車有一種也，根葉皆似南星，亦草，端生葉，一種葉凡七種，一種葉作數層葉，上葉背皆至而細毛，下附草間，一花狀如鈴，倒側半。

青白色黃藥中空結黃子風吹不動無風自搖可制砂汞按此卽鬼白之一種也其說形狀甚明

無有毒

大田政司

2000年10月

五、

今日

之木曰叢

主治

日殺蟲

大殺日錄

膚瞽不

四、

三、

平珍白丁

聲明

古方

古今福州

風疾

附方

中炮

大馬路

不列颠群岛

每服

神名

上中人寒

廿一日

大明曰此即大戟花也川澤中有莖梗小花黃色葉似嫩葉五月采之

蘇頌曰今廣州鼎州明州及近道皆有之

李時珍曰別錄謂以竹管注漆是大戟苗日華子又

言是大戟花其根可食然大戟苗洩人不可為藥今

者土宿本草及寶鑑論諸書並云澤漆是貓兒眼草

一名綠葉綠花一名五鳳草江湖原澤半陸多有

之春生苗一尺分枝成叢葉如馬齒見錄葉如

苜蓿葉葉面而黃綠似貓眼故名貓兒眼葉根凡

五葉中分中抽小莖五枝每枝開細花青綠花復有

小葉承之齊整如一故又名五鳳草綠葉綠花根

莖有白汁黏人其根已色有硬骨或以此為大戟苗

者誤也五月采汁糞雄黃伏鍾乳搗草砂搗此則澤

漆是貓兒眼草非大戟苗也今方家用治水蠱癰

氣有效久與神農本文相合自漢人李別錄誤以為

大戟苗故諸家變之南用者生毒

莖葉氣味

苦微寒無毒

別錄曰辛

大明曰冷有小毒

徐之才曰小豆為之使惡薯蕷

主治

本經曰皮膚熱大腹水氣四肢面目浮腫丈夫陰氣

不足

別錄曰利大小腸明目輕身

蘇恭曰主蠱毒

大明曰止瘰癧消瘰癧

發明

李時珍曰澤漆利水功類大戟故人見其莖有白汁

遂誤以為大戟然大戟根苗皆有毒洩人而澤漆根

硬不可用苗亦無毒可作菜食而利水大除氣甚不

相得也

附方

肺欬上氣脈沈者澤漆湯主之澤漆二斤以東流水

五十盞取一斗五升去滓入半夏半升紫參白朮生

薑各五兩甘草黃各八分桂心各三兩煎取五升每

服五合日三服

心下伏殺大如杯不得食者澤漆四兩大黃半斤熬

三兩湯飲九升子大每服一丸日三服

十腫水氣澤漆十斤夏月取嫩葉入水一斗碾汁

約一斗於銀鍋內慢火熬如稀糖入瓶內收每日空

心溫酒調下一匙以愈為度

水氣蠱毒生瘰癧眼翳草藥乾為末棗肉丸彈子大

每服一丸白湯化下日一服覺腹中暖小便利為度

腳氣赤腫行步艱難眼瞤星黃翳腫蜂蟻等分

每用一兩水五盞煎三盞服之

牙痛疼痛貓兒眼將草一握燒爛湯泡取汁衝漱吐

男婦痔瘡貓兒眼將草一二細井水一桶五月五日

午時鍋內熬至一桶去滓澤漆再熬至一銀瓶收每

以葱椒槐枝煎湯洗淨乃搽此膏數大愈

瘰癧有蟲瘰癧兒眼將草曬乾為末香油調搽之

澤瀉部考

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉



本草綱目

王孫經名

吳普曰楚名王孫齊名長孫又名海靈吳名曰功草又名曼延

李時珍曰紫參一名牡蒙木部合歡一名黃昏皆與此名同物異

集解

別錄曰王孫生海西川谷及汝南城郭垣下吳普曰蔓延赤文繁延相當

陶弘景曰今方家皆呼為黃昏云牡蒙市人少識者蘇恭曰按陳延之小品方述太叔牡蒙一名王孫徐之才並對有牡蒙無王孫此則一物明矣牡蒙葉似及已而人根長尺許皮肉皆紫也

陳藏器曰早藕生太行山中狀如藕李時珍曰王孫葉生類而似葦河重葉投神農吳普本草紫參一名牡蒙陶弘景亦曰今方家呼紫參為牡蒙其王孫無牡蒙之名而陶氏於王孫下乃云

又名牡蒙且無形狀蘇恭始以紫參牡蒙為二物謂紫參葉似羊蹄王孫葉似及已但古方所用牡蒙皆為紫參後人所用牡蒙乃王孫非紫參也不可

辨唐元宗時醫民妻上言終南山有早藕餌之延年狀顧給密取作湯餅郡大臣石曉衡將軍甘宇

減曰早藕者牡蒙也方家久不用撫易名以神之神謂其牡蒙乃王孫也蓋紫參止治血證積聚諸病而

王孫主五臟邪氣痛癢百病之文自可推也蘇恭引小品方牡蒙所主之證乃紫參非王孫故今按附

紫參之下

紫參之下

紫參之下

根氣味

苦平無毒

吳普曰神農嘗公苦無毒黃帝甘陳藏器曰早藕甘平無毒

主治

本經曰五臟邪氣寒濕痺四肢疼痛酸軟令痛別錄曰療百病益氣陳藏器曰早藕主長生不饑黑毛髮

王孫部經事唐書裴旻傳旻宋州人自言通仙人不死術隱居不出聞元末太常卿韋瓘召名山訪隱旻還白旻已數百歲召至東都令集賢院因言服春藤使白髮還復則長生可致旻生太湖最良於南往往有之不及也帝遣使者至太湖多取以賜中朝老臣因詔天下使自求之宰相裴羅卿奉勅上千萬歲壽帝悅御

花等樓臺臺臣出候百餘偏賜之權撫銀青光祿大夫從中和先生撫又言終南山有早藕餌之延年狀

初為粉帝作湯餅賜大臣石曉衡將軍甘宇減能銘藥石曰常春者千歲藥也早藕牡蒙也方家久不用

撫易名以神之神謂其牡蒙乃王孫也蓋紫參止治血證積聚諸病而

王孫主五臟邪氣痛癢百病之文自可推也蘇恭引小品方牡蒙所主之證乃紫參非王孫故今按附

紫參之下

紫參之下

紫參之下

紫參之下

紫參之下

王孫部雜錄

續博物志王孫一名黃孫一名黃昏孫思邈有黃昏散注云黃昏木或曰合歡合歡夜合花陳無已云探囊一試黃昏湯草部木部黃昏為一物部葉曰守宮

機書曰蟲合而夜舒布也江東有木與此相反俗因名合昏古今注云合歡似梧桐枝葉互相結風來解使人不忘結康贈之於舍前

游宮罷開夜山贈一蘇公詩末云如大醫王治者戶外燈已解中尚燈探囊一試黃昏湯一洗十年新學

賜任子酒注云按國經本草曰合歡夜合也一名合昏早由異行方胃中甲錯是為肺癰黃昏湯治之取

夜合皮掌大一枚水煮服之其說最為來合無義沙隨先生云晚年因問本草王孫葉似平無毒主五臟

邪氣吳名曰功草葉名王孫齊名長孫一名黃孫一名黃昏生海西川谷蓋指當時藥學為五臟邪氣耳

取義精深如此

郎部部考

經名

覆

烏把

郎部部考

郎部部考

郎部部考

郎部部考

郎部部考

郎部部考

郎部部考

郎部部考

郎部部考

烏把

郎部部考

郎部部考

郎部部考

郎部部考

郎部部考

郎部部考

郎部部考

郎部部考

郎部部考

郎龍圖



將雅

釋草

樓 烏階

一名烏階郭云即烏杞也子連相著狀如杞齒可以染草
一名烏階郭云即烏杞也子連相著狀如杞齒可以染草

本草綱目

狼把釋名

李時珍曰此即陳藏器本草郎郎草也閩人呼爲
郎郎則狼把當作郎郎乃通又方士言此草即鼠尾
草功用亦近之但無的據耳

集解

陳藏器曰狼把草生山道旁與秋穗子並可染草
又曰郎郎草生山澤間高二四尺葉作馬齒如鬼針
苗鬼針即鬼奴也其葉有梗如奴腳狀

掌烏錫曰狼把草出近道古方未見者惟陳藏器
言之而不詳文宗皇帝御書記其上瘡血痢甚爲精
至謹用書於本草綱目外續編首

氣味

苦平無毒

主治

陳藏器曰黑人髮令人不老

又曰郎郎草主赤白久痢小兒大腹痞滿丹毒瘰癧

取根莖煮汁服

圖經曰狼把草主丈夫血痢不瘥婦人根治瘰癧年疳

痢取草二兩搗破取汁一小升納白麝半雞子許和

勻空腹頓服極速者不過二服或收苗陰乾搗末蜜

水半盞服一方寸匕

李時珍曰可染蠶髮治瘰癧瘰癧天陰即瘰癧出黃水

者搗木搽之


佛甲部彙考

釋名

佛甲草 不刺經

佛指甲 李時珍

佛甲圖



本草綱目

佛甲草集解

蘇頌曰佛甲草生鄧州多附石向陽而生似馬齒兒
而細小且長有花黃色不結實四季皆有

李時珍曰二月生苗成叢高二四寸莖葉細葉不澤

如馬齒兒尖長而小夏開黃花經霜則枯人多拔於

石山瓦礫上呼爲佛指甲救荒本草言高二三尺葉

甚大者乃景大非此也

氣味

甘寒微毒

主治

蘇頌曰湯火灼瘡研貼之

仙人草集解

釋名

仙人草 俗名

仙人草圖



本草綱目

仙人草集解

陳藏器曰生階庭間高二三寸葉細有馬齒似懸石草北地不生

主治

陳藏器曰小兒酢醬頭小而硬者煮湯浴并搗傳丹毒入腹者必危可飲冷藥及用此洗之又按汁滴目明日去翳

仙人部集文

仙人草贊

宋謝惠連

余之中獨有仙人草焉春頤其苗夏秀其英秋有其實冬無彫色可謂四時而不改者既嘉其名而又其質凌華作冰庶以堪述云

圖有嘉草名曰仙人燈煜煜然其綠珠頤對芙蓉苗秀和春奇爾靈寶乃植中林

鎖陽部集考

釋名

鎖陽 補藥

鎖陽圖



本草綱目

鎖陽集解

李時珍曰鎖陽出肅州按開九成輟耕錄云鎖陽生雜田地野馬或與蛇龍交遺精入地久之發起如笋上冒下儉婦甲櫛比筋脈連結藥類男婦即內從男之類或謂里之淫婦就而合之一得陰氣助孕恐長土人掘取洗滌去皮薄切曬乾以充藥皆功力百倍於從容也時珍疑此已有種類如肉袋容列當亦未必盡是遺精所生也

氣味

甘溫無毒

主治

朱震亨曰大補陰氣益精血利大便虛人大便燥結者喫之可代從容黃湯強壯不燥結者勿用
李時珍曰酒燉膏筋治痿痹

鎖陽部雜錄

琴辛雜錄觀野地有野馬鹿蛇龍合所遺精於地遇春時則勃然如笋出地中大者如蒲兒頭笋上豎下儉其形不異亦有婦甲筋脈其名曰鎖陽即所謂肉從容之類也或謂輟耕婦人之淫者亦從而好合之其物得陰氣則怒而長土人收之以薄刀去皮毛洗潔令淨日乾之為藥其力百倍於肉從容其價亦百倍於常品也玉樞云亦當得其少許

一西華譚甘州多取肉從容增圖形甚不雅草上

生

拳參部備考

釋名

拳參
系圖經

拳參圖



本草綱目

拳參集解

蘇頌曰生溫州田野葉如干蹄根似海蝦蟹色土人

五月采之

主治

蘇頌曰為末湯服腫氣

欽定古今圖書集成博物彙編草木典

第一百二十七卷目錄

附子部彙考

附子圖

張振博推

本草綱目

附子部藝文一

附子贊

彰明附子記

附子部藝文二

越州開山附子圖

附子部紀事

附子部雜錄

側子部彙考

本草綱目

附子部彙考

草木典第一百二十七卷

附子部彙考

釋名

使君

附子

滿地子

木鼈子

桑海

白附子

天雄

虎掌

附子圖

張振博推

釋草

發越英毒附子也一歲為則子一歲為烏蒙二歲為

附子四歲為烏頭五歲為大雄

本草綱目

附子釋名

李時珍曰初種為烏頭象烏之頭也附烏頭而生者

為附子如子附母也烏頭如芋魁附子如芋子蓋一

物也別有旱烏頭白附子故俗呼此為黑附子川烏

頭以別之諸家不今烏頭有川草兩種皆混雜註解

今悉正之

集解

別錄曰附子生犍為山谷及廣漢冬月采為附子春

月采為烏頭

陶弘景曰烏頭與附子同根附子八月采八角者良

烏頭四月采春時莖初生有頭顯如烏鵲之頭故謂

之烏頭有兩歧其勢狀如牛角者名烏喙取汁煎為

射簡天雄似附子細而長乃至三寸側子即附子



烏頭之大者連是同根而本經附子出犍為天雄出

少室烏頭出明陵分生二處當各有所宜也今則無

別矣

蘇恭曰天雄附子烏頭並以蜀道綿州龍州者佳俱

以八月采造饒處雖有造得者力弱都不相似江南

來者全不堪用

大明曰天雄大而長少角刺而實附子大而短有角

平穩而實烏喙似天雄烏頭大於附子側子小於烏

頭連聚生者名為虎掌並是天雄一商子母之類氣

力乃有殊等節宿根與嫩者爾

雷敫曰烏頭少有莖苗身長而烏黑少有旁尖烏喙

皮上著色有尖頭大者孕八九個周開底陷黑如烏

鐵天雄身全殘無尖頭他四面有附子孕十一個皮

黃色側子只是附子旁有小顆如鼠核者木鼈子是

雌附烏雄側中毗患者不入藥用

韓保昇曰正者為烏頭兩岐者為烏喙細長二四寸

者為天雄根旁如芋散生者為附子旁連生者為側

子五物同出而異名苗高二尺許葉似忍冬內及艾

窠宗曉曰五者皆一物但依人小長短以象而名之

耳

蘇頌曰五者今並出蜀七都是一種所產其種出於

龍州冬至前將陸田耕五七遍以糞糞之然後

布種逐月耘至天年八月後方成其苗高三四尺

葉作四裂葉如艾其花紫莖若朽木實細小如桑

葇荑黑色本只種附子一物至成熟後乃有四物以

長二三寸者為大雄刺側附子旁尖烏喙側子附子

爲附子以八角者爲上揚州彭明縣多母之惟赤水一縣者最佳然未時與本草不同按本草冬采爲附子春采爲烏頭博物志言附子烏頭人雖一物也春采於冬采之各異而藥志云吳春附子也一年爲附子二年爲烏頭三年爲附子四年爲烏頭五年爲附子一年種之便有此五物豈今人稱種之法用力倍多故爾繁乎

李時珍曰烏頭有兩種出彰明者即附子之母今人謂之川烏頭是也春采生於子故曰春采爲烏頭冬則生於子已成故曰冬采爲附子其天雄烏頭皆子皆足生子多者因葉命名若生子少及獨頭者即無此數物也其者江左山南等處者乃本經所謂烏頭今人謂之草烏頭者是也故曰其汁煎爲粥陶陶以飲不切烏頭有一以附子之烏頭註射藹之烏頭遂致諸家疑惑而害教之說尤不近理宋人楊天惠著附子記其悉今據其書讀之可不辨而明矣其說云揚州乃故廣漢地廣輿八條附子出附子彰明鎮鄉一十惟赤水麻木昌明會昌四鄉產附子而赤水爲多每歲以上由藥耕作電取種於乾安號州裏歸木門焉

皆小種一而子三則師角少者爲上而特生則特大附子之形以踴至二師角少者爲上有特多乳者次之形不正而傷缺風乾者爲下木言附子八角者爲其角爲附子之說甚悉矣附子之邑以花白者爲上鐵色者次之青綠者爲下天雄烏頭天雄者以豐實爲佳者爲烏頭編製則子則附人以乞夜火不足數也謹按此說所載編製則附子所謂木籠子大明所謂謂虎者也其角子即烏頭也天雄即天雄之類醫方亦無此名功用當相同爾

修治

韓保昇曰附子烏頭天雄制子烏頭未得以生熟湯浸半日勿令氣氣出以灰炭之數易使乾文法以水粥及糟粕等淹之並不及前法
蘇頌曰五物收時一處透曬其法先於六月內造大小麝糶木米前半月用大麥煮成粥以麝造醃候熟去糟其醃不用太酸酸則以水解之將附子去根繫於新置內淹七日日曬一遍務出以綠歸鹽之令生白灰乃向慢風日中曬之百十日以透乾爲度若猛日則皺而皮不附肉
李時珍曰按附子記云此物最多不能常熟或種美而苗不茂或苗秀而根不充或已種而腐或已曝而擊若有神物陰爲之者故閩人常瞻於神目爲藥效其法用醋醃安密室中淹曬半月乃發出曬乾方出曬時其大有如拳者已足觀不強提故及一兩者極難得土人云但得半兩以以上者良蜀人與者少惟秦陝間酒人宜之然秦人織出其下者閩新獲得其中者其品則皆貴人得之美

開引景曰凡用附子烏頭天雄宜熱火微炮令拆出過舊雜避附生用之俗方每用附子須甘草人參生薑相配者正制其毒故也

雷敩曰凡使烏頭文火中炮令皺拆壁破用若附子須微平有九角如鐵色一箇重一兩者即是

用全勿用雖木火只以柳木炭火中炮令皺拆以刀刮去上孕子并去底火燄破於屋下地土掘一土坑安之一宿取出焙乾用若陰制者生去皮底薄切以東流水并黑豆洗五日夜煮出口中藥用米麝香凡烏附天雄須用童子小便浸透煮過以殺其毒并助下行之力入鹽少許尤好或以小便浸二七日候去壞者以竹刀每便切作四片并水淘淨逐日換水再浸七日曬乾用

氣味

李時珍曰附子生用則發散熟用則峻補生用者須如陰制之法去皮納入藥熟用者以外水浸過炮令發拆去皮并煮熱切片再炒令內外俱黃去火毒入藥又法每一箇用甘草二錢鹽水煮汁童便各半煮同煮數出火毒一夜用之則毒去也
辛溫有大毒
別錄曰甘大熱
吳普曰神農辛岐伯雷公甘有毒李當之若大溫有大毒
張元素曰大辛大熱氣厚味薄可升可降陽中之陰浮中沉無所不至爲諸經引之藥
王好古曰入手少陰三焦命門之劑其性走而不守非若乾薑正而不行

趙嗣昌曰熟附能藥黃發中有補仲景藥黃劑子胡
辛湯麻黃附子甘草湯是也生附配乾薑補中有發
仲景乾薑附子湯通脈四逆湯是也

戴九建曰附子無乾薑不熱得甘草則性緩得桂則
補命門

李時珍曰附子得生薑則能發散以熱攻熱又導虛熱
下之以除中病

谷之才曰地膽爲之使惡蜈蚣畏防風中豆甘草人
參黃者

李時珍曰畏某鳥烏非章懷岳角忌敗汁得蜀椒食
鹽下逆命門

主治

本經曰風寒欬逆邪氣寒濕膝痛拘攣膝痛不能行
步破癰發背瘰癧金瘡

別錄曰腰冷風寒脚氣冷痺心腹冷痛霍亂轉筋
下痢赤白瀉中虛脫胎骨又胎前爲百藥長

張九素曰溫煖脾胃除濕溫腎寒補下焦之陽虛
李杲曰陰虛沉寒二陽氣逆濕淫脫痛胃寒吐動

治經閉補虛散寒

王好古曰腎脈爲病脊冷而厥

李時珍曰治二陰傷寒陰毒瘡中寒中風痰厥氣
厥卒結胸小兒驚風風濕麻痺風濕脚氣頭風腎

厥頭痛瘧疾久痢泄瀉寒濕氣喘耳治聾
胃弱癰瘡不飲久瀉冷瘡合熱瘡寒耳治聾

張元素曰諸風風痺身不遂除寒冷濕瘡風
癰去心下敗痞寒復痛

李杲曰除寒濕行經散風邪破積冷毒
王好古曰補命門不足肝風虛
李時珍曰助陽退陰功同附子而稍緩

發明

寇宗奭曰補虛藥須用附子風寒即多用大桂大略
如此其烏頭烏喙附子則取其肉而用之

李時珍曰按王氏寬原方云附子性辛溫溫經逐寒
用烏頭性輕溫溫經去風若寒未即附子風痰

即用烏頭一云凡人中風不可先用風藥及烏頭
若先用風藥後用烏頭力直也又凡因烏附藥虛實

令服者然因藥用也蓋陰寒在下虛陽上浮治之以
寒則陰氣益甚而病增治之以熱則陰格而不納熱

藥令飲下墜之後冷體微熱然便發汗氣鬱鬱愈
不達其性而致大益此反治之妙也昔張仲景治寒

箱內結用蜜酒烏頭近效方治喉痺用連棗附子含
之藥汁丹湯治肺氣用烏頭皂子並熱酒藥用也

李東垣治烏頭散寒除陰毒瘡陽傷寒面赤目赤煩渴
引飲服六七錢至八錢之劑散用黃附湯加人參投

半斤服之得汗而愈此則神聖之妙也

吳叔曰附子乃陰毒藥凡傷寒得受二陰及中寒
夾陰傷身大熱而厥者必用之或厥冷腹痛脈沈

細其脈轉者發熱者有汗用之有逆陰回陽之力起
死回生之功近世陰證之藥往往疑其不敢用附子

直待陰極陽竭而用之已遲矣且來陰傷寒內外皆
陰陽氣弱矣必須急用人參健陽以益其原佐以附

子溫吾散寒捨此不用將何以救之
劉元素曰俗方治麻痺多用烏附其氣暴能衝開道

路救氣愈麻及藥氣盡而正氣行則麻病愈矣
張元素曰附子以白朮爲佐乃除寒濕之聖藥濕寒
宜少加之引經又益火之原以消除陰邪則使清有節

烏附是也

唐懷壯曰附子喜燥壯之質有新開奪將之氣能引補
氣藥行十二經以追復散失之元陽引補血藥入血

分以滋養不足之真陰引發散藥開陳理以驅逐在
表之風寒引溫藥榮達下焦以祛陰在裏之冷濕

朱震亨曰氣虛無甚者宜少用以壯陽以行參耆肥人
多濕亦宜少加烏附行經仲景八味丸用爲少陰補

導後世因以附子爲補藥誤矣附子走而不守取其
健胃走下之性以行地黃之濡可致達兩肩頭天雄

皆氣壯形像可爲下部藥之佐無人表其害人之禍
相習用爲治風之藥及補藥殺人多矣

王履曰仲景八味丸爲陰火不足者設仲景六味
地黃丸爲陰虛者設附子乃補陽之藥非爲行瀉也

王好古曰烏附非身涼而四肢厥者不可借用服附
子以補火必妨瀉水

李時珍曰烏附毒藥非危病不用而補藥中少加引
導其功甚捷有人饒服錢氏即發燥不燥而昔人補

劑用爲常藥豈古今運氣不同耶耶府都昌王體瘦
而冷無他病日以附子煎湯飲之增其氣此散

斬州無張百戶平生服此散服其附子至八十餘歲康
健常來張醫師診視知好飲酒也每日煎乾薑熟

附湯吞破瓦金液丹百粒乃能健啖否則倦弱不能
支壽至九十他人服一粒即爲害若此數人皆其藏

弊惡藥之偏服之有甚無害不可以常理概論也又

瑯琊錄曰滑臺縣王槐泉氏喉附子如喉手果此則地氣使然

烏頭附子失主治

李時珍曰烏頭服五分吐風痰痛

發明

李時珍曰烏頭附子亦取其銳氣直達病所無他表也保幼大全云小兒慢脾驚風四肢厥逆用附子尖一箇破黃蘗大一箇糊附子七箇末薑汁糊丸黃米大每服十九丸飲下亦治久瀉足風凡用烏頭不可執為性熱毒其手足冷者概則用湯甚則用丸重者用膏候手足暖陽氣固即為佳也按此方乃和劑局方碧霞丹變法也非並慢脾風不可概用故初虞世有金虎君謠之戒

附方

少陰傷寒初得二三日脈微細但欲寐小便色白者麻黃附子甘草湯微發其汗麻黃去節二兩甘草炙二兩附子炮去皮一朮水七升先煮麻黃去沫納二朮煮取三升分作三服取微汗傷寒論
少陰發熱少陰病始得反發熱脈沈者麻黃附子細辛湯發其汗麻黃去節二兩附子炮去皮一朮細辛三兩水一斗先煮麻黃去沫乃納二朮同煮三升分一服傷寒論
少陰下利少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒其人面赤或腹痛或乾嘔或煩或利止脈不出者通脈四逆湯用大附子一箇去皮生破八片甘草炙二兩乾薑三兩水一斗煮一升分溫再服其脈即出者愈面赤加葱九葉腹滿加

芍藥二兩參如生薑二兩明礬加桔梗一兩利止脈不出如人參二兩

陰痰惡寒傷寒已發汗不解反惡寒者虛也芍藥甘草附子湯補之芍藥三兩甘草炙二兩附子炮去皮一朮水五升煮取一升五合分服

傷寒發熱傷寒下後又發其汗盡日煩躁不得眠夜而安靜不眠不清無表証脈沈微身無大熱者乾薑附子湯溫之乾薑一兩生附子二枚去皮破作八片水三升煮取一升頓服

陰盛格陽傷寒陰盛格陽其人必欲熱而不飲水脈沈手足厥逆者是此証也當重散用大附子一枚燒

存性為末蜜水調服溫散寒氣然後熱氣上行而汗出乃愈

熱病吐下及下利身冷脈微欲絕不止者附子炮一枚去皮破作八片入鹽一錢水一升煎半升溫服

陰虛傷寒發熱先口欲飲水房後受寒少腹疼痛頭疼腰重手足厥逆脈息沈細或作呃逆並宜退陰散用烏頭炮裂等分切炒炒熟為散每服一錢水一盞鹽

一撮煎取半盞溫服得汗解本方王女敦治陰毒心腹滿痛惡寒厥用烏頭去皮破冷水浸七日切

曬紙裹收之遇有患此者取烏末一錢人鹽八分水一盞煎八分服下陰毒傷寒面黃四肢厥逆腹痛身冷一切冷氣大附子二枚炮裂去皮破為末每服二錢薑汁半盞冷酒半盞溫服見汗下如火暖為度續

傳信方治陰毒傷寒煩躁渴急者用半兩重附子

一箇生破作四片生薑一大塊作三片糯米一撮以水一升煎六合溫服臥臥或汗出或不出候心定則以水解散之類解之不得與冷水如渴更煎湯服應

用多效

中風痰厥昏不知人目瞤斜痺痺虛之人患瘧疾寒者生二枚飲用生用烏頭生附子並去皮破各半兩生附子一兩生木香二錢五分每服五錢生薑十

片水一盞煎一盞溫服

中風氣厥痰瘧昏不知人八脈沈伏生附子去皮生南星去皮生木香半兩每服四錢黃芩九片水一盞煎七分溫服

中風偏痺無法湯用生附子一箇去皮破先洗烏藥各一兩每服四錢生薑三片水一盞煎七分服

半身不遂遂令轉住用附子一兩以無灰酒一升浸

七日隔日飲一合

風痺癱瘓手足攣曳口眼喎斜語言蹇澀步履不正宜神驗烏龍丹主之川烏頭去皮磨五兩船各五兩

為末入龍腦麝香五分新水為丸如彈子大每服一丸先以生薑汁研化研化酒調服一日二服至五七丸

便覺手攣移得步十九可擲頭也

風寒濕痺麻木不仁或手足不達生用烏頭末每以香白朮一盞入末四錢煎得所下薑汁一匙

蜜二大匙空腹服之或入酒內服一錢生傳云風濕未病謂大也脾主四肢風淫客肝則侵脾而四肢

病也此湯極有力子每授人良驗

諸虛有風外受寒濕身如在空中生附子生天南星

各二錢生薑十片水一盞半慢火煎服于曾病此膏傳張子發授此方二服愈

口眼喎斜生風頭面各等分爲末每用一字噴入鼻內取涕吐盡立效無比名通關散

口辛寒瘧疾神丹並用附子末吹入喉中幾許口產後中風身如角弓反張口噤不語川烏頭五兩劉堪厚大豆半升同炒半熟以酒三升微鍋內蒸攪以絹濾取酒微溫服一小匙取汗若口不開過開攪之末效加烏雞養一合炒納酒中服以經度

諸風血風烏頭丸治諸風痿緩言諸風痿緩身麻痛皮膚瘙癢及婦人血風頭痛目眩腸風腹痛下血不止者服之尤效有痛風痺痛隨領不收者服六七服即奏也川烏頭炮去皮臍一兩制芥穗二兩爲末醋拌丸梧子大溫酒浸熟水每服二十九

婦人血風虛冷月候不勻或手脚心煩熱或頭面汗腫頭暈用烏頭一片清油四兩鹽四兩燉內同熬令裂如桑甚甚爲度去皮臍五兩脂四兩爲末搗勻蒸餅丸如梧子大空心溫酒鹽湯下一十九亦治丈

大風疾生用烏頭去皮二錢五分五蓋脂半兩烏末焙心血丸梧子大每湯化服丸

小兒慢驚搐搦逆寒厥用烏頭生去皮臍一兩全蠟十筒去尾分作三服水一盞薑七片煎服

小兒項癭乃肝野虛風邪變入用附子去皮臍大南星各二錢烏末薑汁調貼貼天柱骨內服青丸

小兒顛陷烏頭附子並生去皮臍一錢雄黃八分

爲水梔根湯和作餅貼陷處

癰癤痔瘡桃乳治手足麻痺或癱瘓疼痛腰膝痠痛或打撲損傷悶痛不可忍生用烏末去皮五重脂各四兩煎盡蠟五兩清油爲末滴細丸梧子大每服七九至十粒鹽湯下忌茶此藥常服其效如神

風癱脫痛膏痛不行川烏頭炮去皮以大豆同炒至汗出爲度去豆焙乾全蠟五分焙爲末酥餅終細丸綠豆大每溫酒下七九日一服

腰脚冷痺疼痛用風川烏頭二箇生去皮臍爲散醋調酒上貼之須度

大風諸癰疽諸般大風附子半兩者一枚炮酒酒之春冬五夏秋二日每服一合以導爲度

腳氣腫脹久不瘳者蒸附子一箇生去皮臍爲散生薑汁調和膏塗之乾乾再洗腫消爲度

十指疼痛麻木不仁生附子去皮臍木香各等分生薑五片水煎溫服

搜風順氣烏丸用川烏頭二十箇香附子半斤鹽汁淹一宿炒焙爲末酒糊丸梧子大每溫酒下十丸

風濕頭痛外感風寒用臘月烏頭一升炒令黃木之以指夾盡乾半酒中連日溫酒下

子一枚炮去皮爲末以生薑一兩大黑豆一合炒熟同酒一盞煎七分調兩末一錢溫服

十年頭風不愈者用大川烏頭生去皮四兩南星炮一兩每服二錢酒下

一箇水一盞每服二錢酒下

連騎者生烏頭一錢白芷四錢爲末茶服一字仍以末搗鼻有人用之得效

風寒頭痛十便良方治風寒客于頭中清淨項筋硬臂中寒痠嘔吐清水用大附子或大川烏頭二枚去皮蒸過川芎麝生薑各一兩焙研以茶湯調服一錢或剉片每用五錢水煎服三四日一服或加防風一兩三因方必效散治風寒流注偏正頭痛年久不愈最有神效附子一箇生切四片以生薑汁一盞浸炙再洗再炙汁盡乃止高良薑等分爲末每服一錢鹽茶清酒下忌熱物少時

頭風痛散快頭中風多汗惡風當先風一日則痛甚用大附子一箇炮食鹽等分爲末以方寸七摩爛上久藥力行或以油調稀亦可一日三次

年久頭痛川烏頭天南星等分爲末薑汁調塗太陽穴

頭風骨勞難忍川烏頭末燒研盡內溫茶泡服之

疫厥頭痛如破感氣上衝痰壅昏腦附子三分等墨四錢冷水調服方寸七當吐即愈

腎厥頭痛指南方用大附子一箇炮熟去皮生薑半兩水一升半煎分三服

虛頭痛如破破者即刺刺大川烏頭去皮微炮全蠟

以糯米炒過去米等分爲末甘根汁九絲豆大每海
荷茶下十五九一服

氣喘肺弱氣虛上舉偏正頭痛不可忍考大附子一
枚去皮煎研末蔥汁麝香九絲豆大每服十九茶清

下 惜慈濟堂藥方蠟附丸云氣虛頭痛此方最
合造化之神附子助陽扶虛鍾乳補陽獨厚全蠟取

其饒速逐逐取其通氣湯使用根以達下竅以引心
使虛氣下歸對證用之無不立效大附子一枚細心

入小鐵去毒五枚在內以餘附末同鍾乳粉錢半
白麝半許水作和劑包煨熟去皮研末蔥湯和丸

梧子大每服鹽湯下五十九
腎氣上攻頭項不能轉轉附丸用大熟附子一枚

爲末每用二錢以飯二十粒用白新蟻搗椒口水一
盞半薑七片煎七分去椒入鹽空心點服微氣下達

以引通氣歸經也方書
鼻淵腦生附子末蔥湯和如泥掌浦泉穴方書

耳鳴不止無害夜者烏頭燒作灰葛蒲等分爲末綿
裹塞之日再用取效方書

耳卒聾附子醋浸割尖插之或更於上灸二十七壯
耳聾

耳聾耳鳴血生附子爲末蔥湯和灌耳中對耳
擊癰癰塞附子去皮炮合折以葱塗炙之令蜜入

含之勿嚥汁已成者即藥出未成者即消散方書
入患口瘡生附子爲末醋調貼足心男左女右日

再換之方書
風濕牙痛昔時方用附子一兩燒灰枯棗一分爲末

搗之又方川烏頭用附子生研麝香丸小豆大每
指之

綿色九吸之 割藥方用炮附子末納孔中乃止
根基赤轉變痛不得開連汗不止割附子赤皮末如

聲沙大者背中以定爲度方書
一切冷氣氣虛虛足過身疾痛益元氣強方固精益

融合八痛川烏頭一斤用九升大甕鉢子盛以蠶
子小便浸之日連日淨令盡出排去硬者不用餘以

竹刀切作片新浸水淘去乃浸之日日換水自
足取乾爲末酒煮麝香丸經五升大甕十丸空心鹽

湯下少酌飲之方書
升諸藥氣則立流附子一大箇分作二服水二

盞煎一盞入空酒中溫服方書
中寒昏困薑附湯治諸虛中寒昏不知人及諸般冷

痛霍亂轉筋一切虛寒之病生附子一兩去皮磨乾
薑炮一兩每服一錢小鍾煎鍾溫服方書

心腹冷痛冷熱氣不和山子用烏頭等分生研爲
末酒煎丸梧子大每服十九丸生薑湯下小腸氣痛

加妙尚香酒下十九方書
心痛氣痛諸氣鬱而後用附子降溫熱烏頭破

寒響烏頭爲尾子所引其性急速不留胃中也川烏
頭山子各一錢爲末煎湯水入薑汁一匙調下方書

寒厥心痛及小腸膀胱痛不可止者神妙一粒升用
熟附子去皮薑全橘紅各一兩爲末醋調糊丸如散

散入水砂水本附服一丸男子酒下女人醋湯下
方書

寒前腹痛邊膝手足厥冷日下出脈弦者緊用大烏
頭煎之爲大烏頭五枚去水三升煮取一升去滓

藥飲一升煎令水氣盡強人服七合病人服五合不
瘳明日更服方書

寒前身痛腹痛手足逆冷不仁或身痛不能屈伸烏
頭桂枝湯主之烏頭一味以蜜二斤煎減半入桂枝

湯五合解之得一二升服一合不知再服又不知加
至五合其知者如醉得吐爲中病也方書

寒前引脇肋心腹皆痛諸藥不效者大烏頭五枚去
角四破以白蜜一斤煎令透取蠟爲末別以蜜煎和

丸梧子大每服一十丸冷酒湯下水除方書
寒前滑瀉腹痛腸鳴白汗厥逆熱附子去皮磨細胡

索炒各一兩生木香半兩每服四錢水二盞薑七片
煎七分溫服方書

小腸泄痢合卒散治寒前腹痛小腸氣膀胱氣經腎
諸痛等難忍汗出厥逆大附子炒去皮磨一枚山

尾子炒焦四兩每用三錢水一盞酒半盞煎七分入
鹽一抄溫服方書

宜明方治陰疝小腹痛如絞痛各二
兩鹽花三分爲末藥肉和丸梧子大每服三十九空

心溫酒下 夷堅志云特疾祖大夫病心胃一漏數
發瀉已二十一年苦寒痛行則便傷形神憔悴

元陽虛冷經絡方用附子炮去皮磨爲末以水二盞
入藥一錢鹽薑薑同煎取一盞空心服去積令腹

下元肥臍益氣酒食無碍 梅師方二虎丸補元陽
下元肥臍益氣酒食無碍

梅師方二虎丸補元陽
下元肥臍益氣酒食無碍

下元肥臍益氣酒食無碍
梅師方二虎丸補元陽

梅師方二虎丸補元陽
下元肥臍益氣酒食無碍

下元肥臍益氣酒食無碍
梅師方二虎丸補元陽

梅師方二虎丸補元陽
下元肥臍益氣酒食無碍

下元肥臍益氣酒食無碍
梅師方二虎丸補元陽

梅師方二虎丸補元陽
下元肥臍益氣酒食無碍

下元肥臍益氣酒食無碍
梅師方二虎丸補元陽

梅師方二虎丸補元陽
下元肥臍益氣酒食無碍

下元肥臍益氣酒食無碍
梅師方二虎丸補元陽

梅師方二虎丸補元陽
下元肥臍益氣酒食無碍

下元肥臍益氣酒食無碍
梅師方二虎丸補元陽

梅師方二虎丸補元陽
下元肥臍益氣酒食無碍

下元肥臍益氣酒食無碍
梅師方二虎丸補元陽

梅師方二虎丸補元陽
下元肥臍益氣酒食無碍

下元肥臍益氣酒食無碍
梅師方二虎丸補元陽

梅師方二虎丸補元陽
下元肥臍益氣酒食無碍

下元肥臍益氣酒食無碍
梅師方二虎丸補元陽

梅師方二虎丸補元陽
下元肥臍益氣酒食無碍

下元肥臍益氣酒食無碍
梅師方二虎丸補元陽

梅師方二虎丸補元陽
下元肥臍益氣酒食無碍

達飲食壯筋骨用烏頭附子合四兩醃醃浸二宿切
作片子搗一小坑炭火燒赤以醋三升同藥入坑
內用盆合之，取出去沙土入青鹽四兩同炒赤
黃色為末醋打糊糊丸如梧子大空心冷酒下十五
丸婦人亦宜

胃冷有痰喘喉痛吐生附子半夏各二錢薑十片水
一盞煎七分空心溫服一方並炮熟加木香五分

久冷反胃納略方用大附子一箇生薑一箇片細同
煮研如麴糊每米飲化服一錢 衛生家寶方用薑
汁打糊和附子末為丸大黃為衣每溫水服十九

斗門方用長大附子一箇坐於磚上四面著火漸逼
以生薑自然汁泔之依前再逼再泔約薑汁盡半盞
乃止研末每服一錢粟米飲下不過三服瘕或可以搭

腰子切片炙熟煎食 方便兼用大附子一箇切下
頭子刻一錢安丁香四九箇在內仍合定鐵扎入
砂鍋內以薑汁浸過又火熬乾為末每桃少許薑水

心紙吃日十數大忌毒物生冷
脾寒寒疾濟生方云五臟氣虛陰陽相替發為痔瘡
寒多熱少或但寒不熱宜七葉湯主之附子一枚炮

七次鹽湯浸七次去皮磨分作二服水一盞生薑七
片桑七枚煎七分露一宿發日空心溫服水久再進

一服王璠云一還方云氣衰宜附子風疾宜烏頭各
用烏頭則寒多者火炮七次熱多者湯炮七次去皮

焙乾如土法用烏頭性熱多則熟散也 又果附
湯用熟附子去皮草果仁各一錢半水一盞薑七片

湯一枚煎七分發日早溫服 附後方鹽薑汁醋

和附子治於背

寒熱瘧疾附子一枚五錢者病殺人參丹砂各一
錢馬水燉丸梧子大每服二十丸未發前連進三

服中痛則吐或身腫寒未中病來日再服連進三
瘧疾寒熱牛膝藥研末來頭端身瘧瘧疾或汗多引

飲或白利煩煩宜斷湯主之附子一枚四破每
以一片水一盞生薑十片煎七分溫服李待制云此

方極妙草藥云藥毒以附子為最急死回生之藥也
死醫調補熱藥也用生附子一味治之多愈得非

以熱攻熱而發散邪邪手最起死回生之藥也
小便虛閉兩尺脈沉欲飲用小水不效者乃虛寒

也附子一箇炮去皮燉鹽水浸良久逐滴一兩每服
四錢水一盞生薑心七葉煎服即愈

腫疾喘滿大人小兒男婦因積得取積而腫再
作小便不利者再用利藥性寒而小便愈不通矣醫

者到此多束手至中焦下焦氣不升降為寒痞隔故
水腫而不通腫腹沈溺則小便自通喘滿自愈用

生附子一箇去皮磨切片生薑十片入沈香一錢磨
水同煎食前令飲附子餅三五十枚亦無害小兒每

服三錢水煎服
附子湯神效大附子五枚去皮四破以赤小豆升麻
附子於中燉火煮盡去豆焙研末以薑汁仁粉打糊

丸梧子大每服十丸煎湯下
除水腫瘰癧頭一升桑白皮五升水五升煮一升去
滓銅器盛之重湯煎至可丸九小豆大每服三五丸
取小便利為佳忌服酥麪食肉 又方大附子重

便浸三日夜逐日換尿以布擦去皮膚如泥酒糊和

丸小豆大每服三十九粒煎流氣飲送下
大腸冷痛附子一枚炮去皮取中心如藥大為末二

錢家水空心服之
老人虛泄不禁熟附子一兩赤石脂一兩為末醋糊

丸梧子大末飲下五十九粒
冷氣刺泄生用烏頭一箇水吞半兩為末醋糊丸梧

子大每陳皮湯下二十九粒
羸寒脾泄及老人中氣不足久泄不止肉豆豉二兩

煨熟大附子去皮磨一兩五錢為末粥丸梧子大每
服八九粒連肉煎湯下 十便良方治脾胃虛冷大

腸滑泄米穀不化之方用大附子十兩連皮取出每
二升於石器內以水煮一日常令水過兩指取出每

嚼切作三片再同煮半日割去皮切乾為末別以蠟
肉和丸梧子大每空心吞飲服三四十丸

小兒吐泄注下小兒白朮丸用熟附子五錢白石
脂煨熟骨燒各一錢半為末醋糊丸黍米大每米

飲量見大小服
霍亂吐泄不止附子重七錢者炮去皮磨為末每服

四錢水一盞鹽半錢煮一盞溫服立止
熟研丸梧子大每服五丸煎湯下

久痢赤白痢聖藥丸用川烏頭一箇炭火燒燼取出
地上薑薑良久研末消化蠟丸如大麻子大每服三
九赤痢黃連甘草黑豆煎湯放冷下白痢甘草黑
豆煎湯放冷下如及肚痛以水吞下連空心服之忌
熱物及麪食

久痢休息落附子半兩研末雞子白二枚湯和丸杵
下痢久瀉湯藥未效出作兩服未飲下
下痢久瀉沈陰寒者退陰散主之陳自明云一人
痢此不止服此兩服而愈方見前陰毒傷寒下
下血虛寒日久痢冷者熟附子去皮枯白礬一兩爲
末每服三錢米飲下又方熟附子一枚去皮生薑
三錢五分水煎服或加黑豆一百粒
陽虛感血生地黃一斤湯汁入酒少許以熟附子一
兩半去皮糖切片入汁內石礬黃成膏取附片焙乾
入山藥三兩研末以黃和湯凡倍于大每空心米飲
下三九甘葛察判妻若此疾百藥皆試得此而愈
屢驗效
漫數白濁熱附子爲末每服三錢薑三片水一盞煎
六分溫服
虛火背熱虛火上衝胃熱如火多者附子末津調
塗涌泉
經水不調血凝冷痛此方平易捷徑熟附子去皮當
歸等分每服三錢水煎服
斷產下胎生附子爲末浮酒和塗右足心胎下去之
折繩損傷卓氏實用大附子四枚生切以猪脂一斤
三年香醋同漬二宿取脂煎之上下日摩傳之
方
留顏脂毒川烏頭炒黃藥炒各一兩爲末唾調塗之
繼頭乾則以米泔酒之
繼疽久漏瘡口冷膿水不絕內無惡肉大附子以水
浸透切作大片厚二分安瘡口上以艾灸之隔數日

灸突至五七次仍服內托藥自然肉長潰爛未
作餅子亦可
瘰癧疔肉如眼不效諸藥不效此法妙極附子制如
餅子入以唾貼貼上用艾火灸之附子焦復唾滋再
灸令熱氣衝內即愈
瘰癧疔肉突馬頭五枚蜜醋三升漬三日洗之日夜三
四度
丁瘡癰腫和附子末塗之乾再上
久生瘡癰附子生切以水煎洗貼之
手足凍裂附子去皮爲末以水調塗之良
足趾性寒兩足心白腫上生黑豆瘡硬如釘懸骨生
碎孔膿流出身發寒顫惟思飲酒此是肝腎冷熱相
容用炮川烏頭末傳之服于湯
風厥癰癰凡中風痰厥癰癰風痰癰癰上瘰癧癰
急生癰癰癰癰癰癰癰癰癰癰癰癰癰癰癰癰癰癰
各七千個石錢研九度飛過十兩爲末熟附子炙子
大每用一丸薄研汁下連化下更服還酒半合須臾
吐出痰涎爲妙小兒驚風初起白個驚等分
勝風癰口生川烏火二錢全足燥乾半條酒浸炙磨
香少許爲末以少許吹鼻傳癰方以薄荷湯灌一字
本舌腫脹川烏火二錢全足燥乾半條酒浸炙磨
牙痛癰癰癰癰癰癰癰癰癰癰癰癰癰癰癰癰癰
奔豚肌作痛或癰癰癰癰癰癰癰癰癰癰癰癰癰
諸已豆七枚去皮湯爲末粒細九倍于大朱砂麝香
爲末每服二九等心帶酒或冷鹽湯下三兩日一服

不可成
劉甲成癰連年不愈川烏頭尖黃藥等分爲末洗了
貼之以愈爲度
老幼口瘡馬頭尖一箇天南星一箇研末薑汁和塗
足心男左女右不過二三次即愈
白附子集解
別錄曰白附子生蜀郡三月采
陶弘景曰此物久絕無復真者
蘇恭曰本出高麗今出涼州以西蜀郡不復有生砂
積下濕地獨黃芩尾草細葉同生於穗間根形
似天雄
李珣曰徐表南州異物記云丹東海新羅國及遼東
苗與附子相似
李珣曰根正如草烏頭之小者長寸許乾者號文
有節
氣味
辛甘大溫有小毒
陳保昇曰甘溫
大明曰無毒
李珣曰小毒入藥炮用
李杲曰純陽引藥勢上行
主治
別錄曰心痛血痹面上疳疔行藥勢
大明曰中風失氣一切冷風氣面疳瘰癧
李珣曰諸風冷氣足弱無力疥癬瘡陰下濕瘡頭
面瘰癧入面脂用
王好古曰補肝風虛

