

# 欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百二十五



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

普濟方卷一百二十五

周王朱橚撰

傷寒門

訣

下太陽脉病証治法

三十九証

震甲

胸之病項且強其形亦如至瘕狀邪結胸中俯仰難

隔胸九子陰懷怕

震乙

頭疼發熱惡寒時表未解而反下之痞鞭心胸成硬痛  
陷胸湯用亦相宜

震丙

結胸傷寒六七日脈緊而沉心下堅熱實按之如石硬  
陷胸湯劑更宜煎

震丁

傷寒熱結十餘日水在胸中脇下淤頭汗微微心有熱

陷胸湯下悉能除

震戊

汗出復下大便難渴而舌燥又無眠日晡潮熱從心下  
少腹堅來五六天痛滿連臍不可近氣虛腹內更相煎  
陷胸湯劑須臾進餌下能教重病痊

震已

脉滑而浮熱尚淺按之心下痛還同除非小陷胸湯主  
此證名為小結胸

震庚

宜汗反將冷水噴却之其熱腹中傳內上粟起或煩渴  
文蛤五苓散可煎熱先在表旋歸裏裏實寒邪痞結胸  
痛鞭心中無熱證陷胸三物有奇功外無熱時斂入裏  
陷胸治之猶未止白散飲調與服之結消熱下病即已

震辛

太少之陽併病時頭眩項強亦無期心胸痞結非宜汗  
當刺大椎肝肺俞

震壬

婦人中風七八日發熱表邪還惡寒經水適來傳裏候  
脉遲脇滿礙胸間身涼譫語結胸狀邪熱應知血室干  
當刺期門泄肝氣更宜消息瀉之安

震癸

寒熱中風發有時經期遠斷竟違期熱入血室渾如瘧  
可與柴胡湯主之

離甲

七日發熱微惡寒却教肢節更疼煩雖疑心下猶存結  
加桂柴胡和解安

離乙

汗下曾經五六日小便不利渴煩時寒熱往來胸脇滿  
柴胡乾薑與桂枝

離丙

頭汗惡寒為在表心胸鞭滿裏傳推明醫好辨陰陽證  
識得柴胡表裏宜

離丁

嘔而發熱小柴胡安下還防熱結無心下滿時成硬痛  
陷胸湯劑與之甦

離戊

蒸蒸發熱辨陰陽不與柴胡可較量但是滿而不痛者  
宜煎半夏瀉心湯

離己

熱熱汗出作有時心中痞滿更如斯乾嘔短氣表方解

十棗湯煎治裏宜

離庚

痞拘心下按之濡脉在關浮熱反虛實熱虛邪須辨識  
大黃黃連瀉心除

離辛

心下痞時復惡寒應從內熱表虛看瀉心湯中加附子  
因陽攻痞自能安

離壬

下之成痞瀉心湯不解還教渴飲漿口燥煩加漉不利  
五苓之藥効非常

離癸

汗解之後胃不和心胸痞穎噫難磨腹中下利雷鳴響  
益胃瀉心薑療痞

兌甲

誤下之人利數行水穀不化腹中鳴滿胸痞穎加乾嘔  
胃弱心煩痞轉增下之益甚非為熱胃中穎是氣虛膨

正宜甘草瀉心療內補陰虛表亦清

兌乙

心下痞時利不止理中復與證還添石脂餘糧湯最妙  
後利須從小便泰

兌丙

汗吐下後猶不解噫氣不除心下堅痞硬而虛和胃氣  
旋復代赭石湯煎

兌丁

下後不可桂枝湯汗出而喘亦同方麻杏甘膏偏主療  
除邪有法用之良

兌戊

外證未除數下之熱而遂利裏虛為痞鞭表裏俱不解  
桂枝人參湯最宜

兌己

汗下惡寒痞膈間桂枝解表最宜先大黃攻痞黃連佐  
加入瀉心湯內安

允庚

汗出傷寒熱勿瘳心中痞鞭裏當求嘔而下利猶魚吐  
須用柴胡大者投

允辛

項頭不痛脈微浮氣上攻心痞鞭憂當吐胸寒宜小蒂  
能除喘息利咽喉病人脇下素有痞連在臍傍痛引腹  
腹痛因引入陰筋此名臟結邪相觸

允壬

吐下之時表裏煩惡風燥熱口中乾數升水飲猶然渴  
白虎加參療可安

兌癸

傷寒大熱若無多口燥心煩渴奈何背上惡寒猶有表  
人參白虎自當和

坎甲

脉浮發熱身無汗麻黃湯療頗能除渴而欲飲無他證  
白虎五苓亦可祛

坎乙

太少陽傳項強時心中痞鞭自難舒慎無妄下詳其證

當刺大椎肝肺俞

坎丙

太陽少陽來合病自利黃芩湯主之嘔者黃芩加半夏

生薑湯下治偏宜

坎丁

傷寒有熱在胸中腹痛都緣邪氣攻嘔吐黃連湯可用

陰陽升降始能通

坎戊

傷寒八九日來深風濕頭煩痛怎禁體重不能自轉側  
桂枝附子飲宜斟

坎已

大便艱時小便利滲津發汗兩非宜桂枝附子湯除桂  
更加白朮效尤奇

坎庚

風濕相搏骨節煩屈伸掣痛苦艱酸甘草附子湯煎下  
固衛風邪即便寬

坎辛

傷寒之脉浮而滑表熱邪傳在裏寒白虎湯煎除內外  
益氣散熱自能安

坎壬

傷寒脉結代而還悸動心中不自寬真氣內虛邪更甚  
炙甘草劑便平安