

欽定四庫全書

子部

巢氏諸病源候總論卷二十八至



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

大定四年八月

巢氏諸病源候論卷五

五
隋 巢元方 撰

蟲毒病諸候上凡九論

蟲毒候

蟲毒有數種皆是感受之毒

人有一物獨在者

民謂之為蟲食為人所患禍患禍於他

大定四年八月

巢氏諸病源候總論

則蠱主吉利所以不羈之徒而畜事之又有飛蠱去來
無由漸狀如鬼氣者得之卒重凡中蠱病多趨於死以
其毒害勢甚故云蠱毒著蠱毒面色青黃者是蛇蠱其
脉洪壯病發之時腹內熱悶胃脇支滿舌本脹強不喜
言語身體恒痛又心腹似如蟲行顏色赤脣口乾燥經
年不治肝鬲爛而死其面色赤黃者是蜴蜥蠱其脉浮
滑而短病發之時腰背微滿手脚脣口悉皆習習而喉
脉急舌上生瘡二百日不治噉人心肝盡亂下膿血羸

瘦顏色枯黑而死其面色青白又云其脉沉濡病發時
咽喉塞不欲聞人語腹內鳴喚或下或上天陰雨轉劇
皮內如蟲行手脚煩熱嗜醋食欬唾膿血顏色乍白乍
青腹內脹滿狀如蝦蟆若成蟲吐出成科斗形是蝦蟆
蠱經年不治噉人脾胃盡脣口裂而死其脉緩而散者
病發之時身體乍冷乍熱手脚煩痛無時節吐逆小便
赤黃腹內悶胃痛顏色多青毒或吐出似蜚蠊有足翅
有蜚蠊蠱經年不治噉人血脉枯盡而死欲知是蠱與

非當令病人唾水內沉者是蠱浮者非蠱

又云旦起取井花水未食前當令病人唾水內唾如柱
脚直下沉者是蠱毒沉散不至下者草毒又云含大豆
若是蠱豆脹皮脫若非蠱豆不爛脫又云以鵠皮置病
人卧下勿令病人知若病劇者是蠱也又云取新生雞
子煮熟去皮留黃白令完全日晚口含以齒微微隱之
勿令破作兩炊時夜吐一丸上著霜露內旦看大青是
蠱毒也昔有人食新變鯉魚中毒病心腹痛心下鞞發

熱煩冤欲得水洗沃身體搖動如魚得水狀有人診云
是蠱其家云野間相承無此毒不作蠱治遂死其湯熨
針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云兩手著頭相叉坐地緩舒兩脚以兩
手從外抱膝中痛低頭入兩膝間兩手交叉頭十二通
愈蠱毒及三刀毒腰中大氣

又云常度日月星辰清淨以雞鳴安身卧嗽口三咽之
調五藏殺蠱蟲令人長生治心腹痛

又云治百病邪蠱當正偃卧閉目閉氣內視丹田以鼻徐徐內氣令腹極滿徐徐以口吐之勿令有聲令入多出少以微為故存視五藏各如其形色又存胃中令解明潔白如素為之倦極汗出乃止以粉粉身摩捋形體汗不出而倦者亦可止明日復為之又當存作大雷電隆晃走入腹中為之不止病自除

蠱吐血候

蠱是合聚蟲蛇之類以器皿盛之任其相噉食餘一存

者名為蠱能害人食人府藏其狀心切痛如被物齧或
鞞面目青黃病變無常是先傷於鬲上則吐血也不即
治之食藏府盡則死

蠱下血候

蠱是合聚蟲蛇之類以器皿盛之令其自相食噉餘留
一存者為蠱能變化為毒害人有事之以毒害多因飲
食內行之人中之者心腹懊痛煩毒不可忍食人五藏
下血瘀黑如爛雞肝

氏羌毒候

氏羌毒者猶是蠱毒之類於氏羌界域得之故名焉然其發病之狀猶如中蠱毒心腹刺痛食人五藏吐血利血故是蠱之類也

猫鬼候

猫鬼者云是老狸野物之精變為鬼域而依附於人畜事之猶如事蠱以毒害人其病狀心腹刺痛食人府藏吐血利血而死

野道候

野道者是無主之蠱也人有畜事蠱以毒害人為惡既積乃至死滅絕其蠱則無所依止浮游田野道路之間有犯害人者其病發猶是蠱之狀但以其於田野道路得之故以謂之野道

射工候

江南有射工毒蟲一名短狐一名蜮常在山澗水內此蟲口內有橫骨狀如角弓其蟲形正黑狀如肉蠻生齧

髮而有雌雄者口邊兩角角端有掇能屈伸冬月並在土內蟄其上氣蒸怵怵冬月有雪落其上不凝夏月在水內人行水上及以水洗浴或因大雨潦時仍逐水便流入人家或遇道上牛馬等跡內即停住其含沙射人影便病初得時或如傷寒或似中惡或口不能語或身體苦強或惡寒熱四支拘急頭痛骨痛屈伸張口欠歛或清朝小蘇晡夕則劇劇者不過三日則齒間有血出不即治殺人又云初始證候先寒熱惡冷欠歛筋急頭痛

目疼狀如傷寒亦如中尸便不能語朝旦小蘇晡夕輒劇寒熱悶亂是也始得三四日可治急者七日皆死緩者二七日遠不過三七日皆死其毒中人初未有瘡但惡風疹癩寒熱或如針刺及其成瘡初如豆粒黑子或如火燒或如蠅螬尿瘡皆肉內有穿空如大針孔也其射中人頭面尤急腰以上去人心近者多死中人腰以下者小寬不治亦死雖不死皆百日内乃可保瘥又云瘡有數種其一種中人瘡正黑如壓子狀或周徧悉赤

衣被犯之如有芒刺痛其一種作瘡久即穿陷或鎮寒
熱其一種如火炙人肉燥起作瘡此最急數日殺人其
一種突起如石癰狀俱能殺人但有遲速耳大都此病
多令人寒熱欠伸張口閉眼此蟲冬月蟄在土內人有
識之者取帶之溪邊行亦佳若得此病毒仍以為屑漸服
之夏月在水中者則不可用

沙蟲候

山內水間有沙蟲其蟲甚細不可見人入水浴及汲水

澡浴此蟲著身及陰雨日行草間亦著人便鑽入皮裏
其診法初得時皮上正赤如小豆黍粟以手摩赤上痛
如刺過三日之後令百節疼強痛寒熱赤上發瘡此蟲
漸入至骨則殺人人在山澗洗浴竟巾拭燂燂如芒毛
針刺熟看見處以竹簪挑拂去之已深者用針挑取蟲
子正如疥蟲著爪上映光劣見行動也挑不得灸上三
七壯則蟲死病除若止兩三不能為害多處不能盡挑
灸挑灸其上而猶覺昏昏是其已大深便應須依土俗

作方術拂出之并作諸藥湯浴皆得一二升出都盡乃止此七日內宜瘥不爾則續有飛蟲來入攻噉心藏便死飛蟲白色如韭葉大長四五寸初著腹脇腫痛如刺即破雞擒之盡出食雞或得三四數過與取盡乃止兼取麝香犀角護其內作此治可瘥勿謂小小不速治則殺人彼土呼此病為呼渣

吳沙作渣讀如鳥音長尾渣渣音也

言此蟲能

招呼沙蟲入人體內人行有得沙蟲還至即以火自灸

燎令徧則此蟲自墮地也

水毒候

自三吳已東及南諸山郡山縣有山谷溪源處有水毒

病春秋輒得一名中水一名中溪一名中灑

蘇駭反

一名

水中病亦名溪溫令人中溪以其病與射工診候相似

通呼溪病其實有異有瘡是射工無瘡是溪溫初得惡

寒頭微痛目匡疼心內煩懊四支振煥腰背骨節皆強

兩膝疼或噲噲熱但欲睡旦醒暮劇手足指逆冷至肘

膝二三日則腹生蟲食下部肛內有瘡不痒不痛令人