

欽定古今圖書集成博物彙編草木典

第一百五十四卷目錄

黃環部彙考

黃環圖

本草綱目 青環

黃環部彙錄

麻黃部彙考

本草綱目 麻黃

麻黃部彙考

麻黃圖

段成式酉陽雜俎 麻黃

本草綱目 麻黃 附黃花子

麻黃部紀事

麻黃部彙考

麻黃圖

本草綱目 麻黃

麻黃部彙考

麻黃圖

草木典第一百五十四卷

黃環部彙考

黃環圖

本草綱目 青環

黃環部彙錄

麻黃部彙考

麻黃部彙考

麻黃部彙考

麻黃部彙考

麻黃部彙考

麻黃部彙考

麻黃部彙考

麻黃部彙考

黃環圖



本草綱目

黃環釋名

李時珍曰此物葉黃而開故名黃環如雞華呼曰環之義亦亮焉類故名就葛政乃恒是名其葉似之故

曰環故于

集解

別錄曰黃環生蜀郡山谷二月采根陰乾

吳普曰蜀黃環一名生蜀二月生苗正赤高一尺葉

黃圓端大經曰葉有汁黃曰五月實圓三月采根黃

色從理如車輪解

陶弘景曰似防己亦作車輪解解毒都賦云青珠黃

環即此或云是六戰化定非矣用其稀市人誤有識

者

又曰黃環子出交廣形扁扁似錢以雞水浸水中須

無大小皆浮水面乾

蘇恭曰黃環惟襄陽大有餘處連有亦稀巴而人謂

之就為今關庭亦種之作藥生大者葉徑六寸根

亦易類向云似防己者近之服葛根誤食之吐瀉不

止上環解之此黃環也今太常收對南來者乃雞

屎根非黃環也其花紫色其子名環故于角生似

是黃交廣遠入太常者正是黃環子也花實與葛同

時

李時珍曰吳普所說其詳而書宋本草不收何也范

子計然云黃環出魏郡以黃色者為善

黃環氣味

苦平有毒

吳普曰神農黃帝有母桐君扁鵲苦

黃環曰大寒有小毒

徐之才曰黃尾為之使惡伏者防己乾黃

主治

本經曰蠱毒鬼狂鬼魅邪氣在臟中除欬逆寒熱

號環曰治一氣急及百邪

李時珍曰治瘧嗽清水腫利小便

振蹠子氣味

苦寒有小毒

主治

別錄曰惡毒蠱毒殺蟲魚

陶弘景曰苦酒摩塗疥效

附方

水腫黃環根曬乾每服五錢水煎服小便利為效

方

方

方

方

方

方

方

方

方

欽定古今圖書集成博物彙編草木典

第一百五十四卷目錄

黃環部彙考

黃環圖

本草綱目

黃環部彙考

黃環部彙考

本草綱目

黃環部彙考

黃環圖

段成式酉陽雜俎

本草綱目

黃環部彙考

黃環部彙考

黃環圖

本草綱目

黃環圖

黃環部彙考

草木典第一百五十四卷

黃環部彙考

黃環圖

黃環部彙考

黃環部彙考

黃環部彙考

黃環部彙考

黃環部彙考

黃環部彙考

黃環部彙考

黃環部彙考

黃環部彙考

黃環圖



本草綱目

黃環部彙考

李時珍曰此物葉黃而開故名黃環如雞掌呼曰環

之義亦亮易類故名就葛政乃根是名其葉似之故

曰環故于

集解

別錄曰黃環生蜀郡山谷二月采根陰乾

吳普曰蜀黃環一名生蜀二月生苗正赤高一尺葉

黃圓端大經曰葉有汁黃曰五月實圓三月采根黃

色從理如車輪解

陶弘景曰似防己亦作車輪解蜀都賦云青珠黃

環即此或云是大戟化定非矣用其稀市人誤有識

者

又曰根生子出交廣形扁扁似錫以難水浸水中角

無大小皆浮水面乾

蘇恭曰黃環惟襄陽大有餘處連有亦稀巴而人謂

之就為今關庭亦種之作藥生大者葉徑六寸根

亦易類而云似防己者近之服葛根誤食之吐而不

博物彙編草木典第一百五十四卷黃環部

止上藥解之此黃環也今太常收對南來者乃雞

屎根根黃環也其花紫色其子名環故于角生似

是黃交廣遠入太常者正是黃環子也花實與葛同

時

李時珍曰吳普所說其詳而書宋本草不收何也范

子計然云黃環出魏郡以黃色者為善

黃環氣味

苦平有毒

吳普曰神農黃帝有毒桐君扁鵲苦

甄權曰大寒有小毒

徐之才曰黃尾為之使惡伏各防已乾黃

主治

本經曰蠱毒鬼狂鬼魅邪氣在臟中除欬逆寒熱

甄權曰治一氣急及百邪

李時珍曰治瘧嗽清水腫利小便

根踐子氣味

苦寒有小毒

主治

別錄曰惡毒蠱毒疥癬魚

陶弘景曰苦酒摩塗疥效

附方

水腫黃環根曬乾每服五錢水煎服小便利為效

方

方

方

方

方

方

方

方

黃環部雜錄

補筆謂黃環即今之朱砂也枝下皆有葉如槐其花
穗懸紫如葛花可作茶食火不熱亦有小毒京師
人家園圃中作大架待之謂少紫葉花者是也黃如
皇黃蜀都賦所謂青珠黃環者黃環即此藥之根也
古今皆種以爲庭樹之玩今人折其莖於槐幹上接
之偶爲槐槐其根入藥用能可人

麻黃部考

釋名

麻黃 藥名

沙黃 藥名

鹽缺

本草綱目

麻黃釋名

李珣曰按郭義恭廣志云出岳鄂等州諸山崖樹名
海藤花有藥散落石上獲人救之謂之沙黃就樹采
者經沙黃之氣黃今人說爲銅黃銅黃與沙黃也此與
石黃米之無異書家及丹竈家時用之

李時珍曰今書家所用麻黃皆經煎煉成者誤之麻
人按周達觀風土記云固有黃葉乃樹衛壽人以刀
斫樹枝滴下次年收多似與郭氏說微不同不知即
一物否也

氣味

酸道有毒

主治

李珣曰對牙莊蘭點之便落

麻黃部考

釋名

麻黃 藥名

卑相 藥名

狗骨 藥名

雲花子 藥名

麻黃圖



龍沙 藥名

卑鹽 藥名

中黃師士 藥名

段成式酉記雜錄

麻黃

麻黃黃環開花小而黃葉生子如蝦蟇子可食至
冬枯死如草及春却青

本草綱目

麻黃釋名

李時珍曰諸名殊不可解或云其味麻其色黃未審
然否張揖廣雅云龍沙麻黃也狗骨麻黃根也不知
何以分別如此

集解

別錄曰麻黃生晉地及河東宜城家草院說今青
陶弘景口今出雷州彰城梁陽中者爲勝色去而
多沫中亦有不好

蘇恭曰鄆州鹿臺及關中沙苑河旁沙洲上最多同
州沙苑亦多具青徐者亦不復用

小而黃葉生子如蝦蟇子可食
蘇頌曰今近汴京多有之以藥陽中牛者爲勝春生
苗至夏五月則長及一尺以末梢上有黃花結實如
百合瓣而小似皂莢子味甜微有麻黃氣外皮紅
裏仁子黑根紫赤俗說有雌雄二種雄者於二月
四月內開花六月結子雄者無花不結子至立秋後
收並陰乾

李時珍曰其根皮色黃赤長者近尺

草修治

陶弘景曰用之折去節根水煮十餘沸以竹片掠去
上沫令人煩煩能止汗故也

寒氣味

苦溫有毒

別錄曰微溫

吳普曰神農雷公皆無毒扁鵲酸李當之平

張華曰甘平

張元素曰甘平味溫若而甘辛氣味俱溫輕清而浮陽

也升也辛去陰之藥入足太陽經走手少陰陽明

李時珍曰麻黃苦辛而辛性熱而輕滑微寒洪云

半有麻黃之地冬不積雪為泄內陽也故通用則洩

真氣觀此則性熱可知矣服麻黃自汗不止者以冷

水浸頭髮仍用撲法即止凡服麻黃須避風一日

不爾病復作也凡用須佐以黃芩則無表邪之患

徐之才曰厚朴白微為之使惡干夷石膏

莖主治

本經曰中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去邪熱氣止

欬逆上氣除寒熱發為堅積聚

別錄曰五藏邪氣發急風驚痛手足痠疾止好睡通

痹理經脈清邪惡氣消赤黑斑毒不可多服令人虛

既種曰治身上一毒風癩瘡皮肉不仁主壯熱濕投山

嵐瘴氣

大明曰通九竅調血脈開毛孔皮膚

張元素曰去骨中寒中風邪

李時珍曰散赤白腫痛木脚風腫逐後血滯

發明

陶弘景曰麻黃藥發解第一藥

蘇頌曰張仲景治傷寒有麻黃湯及葛根湯大小青

龍湯皆用麻黃治諸瘧上氣有射干麻黃湯厚朴麻

黃湯節大方也

李杲曰輕可去實麻黃葛根之屬是也六淫有餘之

邪客於陽分皮毛之間腠理閉拒營衛氣血不行故

謂之實二藥輕清成象故可去之麻黃微苦其形中

空陰中之陽入足太陽發水之經其經背下行本

家而又受外寒故宜發汗去皮毛分寒邪以泄水

實者過發則汗多亡陽成飲食勞倦及雜病自汗未

虛之證用之則脫人元氣不可不察

王好古曰麻黃治衛氣之藥桂枝治衛虛之藥二物

雖為太陽證藥其實衛氣也心主營為血脈主衛

為氣故麻黃為平去陰肺之劑桂枝為平少陰心之

劑傷寒傷風而欲飲用麻黃桂枝即湯液之源也

李時珍曰麻黃乃肺經藥故治肺病多用之張仲

景治傷寒無汗用麻黃有汗用桂枝歷代明醫解舞

片隨文傳會未有究其精微者時珍常釋思之似有

一得與昔人所解不同云津液為汗汗即血也若營

則為血在衛則為汗大寒發營血內滯不能外通

於衛衛氣閉固津液不行故無汗發熱而憎寒大風

傷衛衛氣外泄不能內護於營營氣虛弱津液不固

故有汗發熱而惡風惡寒之邪皆由皮毛而入皮

毛者肺之合也肺主衛氣包羅一身大之象也是證

雖屬乎太陽而肺實受邪邪氣其證時寒而赤佛鬱

嗽有痰喘而胃滿諸證者非肺病乎蓋皮毛外引則

邪熱內攻而肺氣鬱故用麻黃甘草同桂枝引引

營分之邪達之肌表佐以杏仁潤肺而利氣汗後無

大熱而喘者加以石膏寒熱入者夏至後加石膏

知母皆是泄肺火之藥是則麻黃湯雖太陽發汗

劑實為發散肺經大鬱之藥也應理不密則津液外

泄而肺氣自虛虛則補其母故用桂枝同甘草外散

風邪以救表內伐肝木以防肺泄以芍藥泄木而固

脾源東所以補西也使用以藥義行理之津液而和營

衛也下後微喘者加厚朴杏仁以助肺氣也汗後脈

沈逆者加入參以益肺氣也夫和知黃芩為湯者所

以瀉肺熱也皆是肺肺之藥是則桂枝雖太陽解肌

經劑實為理肺救肺之藥也此千古未發之秘旨愚

因表而出之又少陰病發熱脈沉有麻黃附子細辛

湯麻黃附子甘草湯少陰與太陽為表裏乃通胸膈

所謂熟附配麻黃補中有發也一錦衣夏月飲酒達

旦病水泄數日不止水數直出服分利清導升提諸

藥則反劇時珍診之脈浮而緩大腸下野復發身血

此因肉食食冷茶太過滯抑陽氣在下水盛土衰

本問所謂久風成癰泄也法當升之揚之遂以小續

命湯投之一服而愈昔仲景治傷寒六七日大下後

脈沈遲手足厥逆微喘利不利膿血泄利不止者用

麻黃湯平其肝肺寒升發之即斯理也神而明之此

類是矣

根節氣味

甘平無毒

根節主治

陶弘景曰止汗夏月難粉撲之

發明

甄權曰麻黃根節止汗以故竹屑作末同撲之又牡

蠣粉栗粉升麻黃根等分為末生絹袋盛貯煎汗出

即撲手摩之

李時珍曰：麻黃發之氣，雖不能聚而根節止汗效如神。特發之妙，不可測度。如此自汗有風濕傷風，溫氣虛血虛，雖虛陰虛，皆發熱，中風陽氣虛，諸虛皆可隨證加用之。當歸六黃湯加麻黃根治盜汗尤捷，蓋其能行周身肌表，故能引諸氣外至衛分而固裏也。本草但知撲之之法，而不知服餌之功，尤良也。

附方

天行熱病初起一二日者，麻黃一大兩，去節以水四升，煮去沫取一升，去滓煮米一匙，及穀為稀粥，先以湯浴後乃食，厚覆取汗即愈。方廣

方廣

傷寒等濕，麻黃一斤，去節，杏仁四升，去皮，熬大黃一斤，十二兩，先以水五石，四升，煮黃於東向，寬釜中，三宿，投納木蜜，桑葉，覆土二石，去青，納杏仁同煮，至六七斗，絞去滓，置銅器中，更以蜜水三斗合煎，令得一十四升，煮成丸如彈子，大有病者，湯白湯五合，研一丸服之，汗出不愈，再服一丸，封藥勿令洩氣。千金

千金

傷寒黃疸，表熱者，麻黃酒湯主之。麻黃一把，去解鮮，炙酒五升，煮取半升，頓服，取小汗，春日用水煎。

千金

麻水黃腫，張仲景云：一身面目黃腫，其脈沈小，便不利，甘草麻黃湯主之。麻黃四兩，水五升，煮去沫，入甘草二兩，煮取二升，每服一升，重覆汗出，不汗再服，服風寒，千金云有患氣急，久不瘳，變成水病，從腰以上腫者，立此發其汗。水腫服此，腫少除，反服者為氣虛，服者為氣實，非。

水也，麻黃附子湯汗之，麻黃二兩，水七升，煮去沫，人甘草二兩，附子炮一枚，煮取一升，升每服八分，日三服，取汗止。方廣

方廣

風痺冷痛，麻黃去根五兩，桂心二兩，為末，酒一升，慢火熬如餡，每服一匙，熱酒下，下至汗出為度，避風。方廣

方廣

小兒慢脾風，因吐泄後而成，麻黃長五寸，十箇，去節，白木指面大一塊，蠟一箇，生薄荷葉包，煨為末，二歲以下一字，三歲以上五分，薄酒下。方廣

方廣

尸咽痛，辨諸聲不出，麻黃以青布裹，燒煙筒中，熏之，產後腹痛及血下不盡，麻黃去節為末，酒服方寸匕，一日三服，血下盡即止。方廣

方廣

心下悸，病牛夏，麻黃九兩，半隻，麻黃等分，木之煨蜜丸，小日大，每飲服三九日，三服。方廣

方廣

痘瘡倒靨，危者，黃日，即州麻黃，去節，牛兩，以蜜一匙，同炒良久，以水半升，煎數沸，去沫，再煎去二分之一，去滓，乘熱服之，避風，其瘡復出也。注用無灰酒煎，其效更速，神仙源，蘇工李用之，于病瘡瘡風，寒倒靨，已因用此一服，便出如神。方廣

方廣

中風諸病，麻黃一升，去根，以水和日，乙卯日取東流水三石，二十斗，以淨鑊盛，五斗，先煮五沸，去沫，壓旋添水，盡至五斗，漉去麻黃，定，漉去滓，取清，再熬至一斗，再澄，再漉，取汁，再熬，至升半為度，密封收之，一二年不妨，每服一二匙，熱湯化下，取汗，皆效，對愛，對提勿令著底，恐焦了，仍忌雜大，陸人見之，此劉守真秘方也。方廣

方廣

盜汗除汗，麻黃根，牡蠣粉為末，撲之。盜汗不止，麻黃根，白朮等分，為末，每服一錢，無灰酒下。外以麻黃根，故蒲扇為末，撲之。方廣

方廣

盜汗不止，麻黃根，牡蠣粉為末，撲之。

方廣

小兒盜汗，麻黃根三分，故蒲扇灰一分，為末，以乳服三分，日三服，仍以乾薑三分，同為末，二分，撲之。方廣

方廣

諸虛自汗，夜臥即其久，則枯，麻黃根各一兩，牡蠣末，出沒洗，乾過，為散，每服五錢，水一盞，小麥白粒煎服。方廣

方廣

虛汗，麻黃根，牡蠣粉等分，為末，飛羅，糊為丸，梧子大，每用酒湯下，白丸，以止為度。方廣

方廣

產後虛汗，黃耆當歸各一兩，麻黃根二兩，每服一兩，煎服。方廣

方廣

陰囊濕，腰骨勞，麻黃根，石硫黃各一兩，米粉一合，為木燭之。方廣

方廣

內外障翳，麻黃根一兩，當歸身一錢，同炒，黑色，入麝香少許，為末，傅鼻，鼻用此，南京相國寺吏史孩兒方也。方廣

方廣

附錄：李時珍曰：後方治馬疥，有雲花草云：秋知麻黃，即中實黃也。

方廣

麻黃部紀事

中牟縣志麻黃產龍脊山明朝入貢成化中知縣戴玉伐其根圍拱把長三尺遂不生育未始覓

麻黃部考

釋名

遠目
寶鼎香

黃黃
赤天佩

黃黃圖



本草綱目

麻黃集解

蘇恭曰麻黃根葉都似鬱金花春生於根與苗並出入夏花爛蓋子根有黃青二色其作之方法與鬱金同西戎人謂之迷其味辛少苦多功與鬱金同惟性生異耳

陳藏器曰麻黃其有是經種二年以上老實能生花根在根際如葶藶根節堅硬氣味辛辣種蘆處有之終是難得西番亦有未者葉鬱金葉相似如蘇恭所說即是蘆葉而非麻黃又言麻黃是蘆葉金是胡延知此則二物割別迥相連名總稱爲蘆則功狀當不殊而今鬱金味苦葉色赤生焉熟而黃黃味辛溫色黃遠味苦色青二物不同所用各別

大明曰海南生者即蓬萊近江南生者即爲麻黃蘇頌曰麻黃今江廣蜀川多有之葉青長一二尺許闊三四寸有針文如紅蕉葉而小花紅白色至中秋漸凋春末方生其花先生方生葉不結實根盤屈黃色類生薑而圓有節八月采根片暴乾蜀人以治氣厥及產後敗血攻心其驗費人生嗽云可以祛邪辟惡殺鬱金黃黃遠葉二物相近蘇恭不能分別乃爲一物陳藏器以色味分別三物又言麻黃是三年老實所生近年作節多種蘆葉往有蘆黃生實乃是老實市人買嗽云治氣爲最大方亦時用之又有麻黃亦是其類而自是一物

李時珍曰近時以扁如乾蘆形者爲片子蘆黃圓如蠟膜形者爲蠟肚蘆金並可浸水染色遠形雖似鬱金而不黃也

根氣味

辛苦大寒無毒

根主治

唐本草曰心腹結積痞疰下氣破血除風濕消癰腫功力烈於鬱金

大明曰治癰瘰癧塊瘰月經治撲損瘀血止暴風痛冷氣下食

蘇頌曰祛邪辟惡治氣厥產後敗血攻心

發明

李時珍曰麻黃鬱金遠葉三物形狀功用皆相近但鬱金入心治血而黃黃入脾兼治氣遠葉則入肝兼治氣中之血爲不同耳古方五淋湯用片子蘆黃治風寒濕氣手臂痛數原證要訣云片子蘆黃能入手臂治痛其兼理血中之氣可知

附方

心痛難忍黃黃一兩桂三兩爲末醋湯服一錢

胎氣腹痛啼哭吐乳大便色青狀若驚搐出冷汗黃黃一錢沒藥末香乳香二錢爲末蜜丸子大每服一丸

產後血痛有塊用黃黃桂心等分爲末酒服方寸匕

血下盡即愈

開書

南產

蘆黃葉青綠而紫有針文花白紅色根盤屈而黃類

豐圓而有節出邵武仙亭山

中華書局影印

欽定古今圖書集成博物彙編草木典

第一百五十五卷目錄

大黃部彙考

大黃圖

本草綱目大黃

大黃部藝文一

大黃贊

大黃部藝文二

大黃花

大黃部紀事

大黃部雜錄

宋宋祁

宋范成大

草木典第一百五十五卷

大黃部彙考

釋名

大黃本經

將軍綱目

廣如綱目

黃良本經

火象綱目

無聲虎綱目

大黃圖



本草綱目

大黃釋名

陶弘景曰大黃其色也將軍之號當取其戰快也
李杲曰推陳致新如戰定禍亂以致太平所以有將軍之號

集解

別錄曰大黃生河西山谷及隴西二月八月采根火乾
吳普曰生蜀郡北郭或隴西二月生黃赤其葉四

四相當莖高三尺許三月花黃五月實黑八月采根
根有黃汁切片陰乾

陶弘景曰今未益州北部汶山及西山者雖非河西
隴西好者猶作紫地錦色味甚苦澀色至濃黑西川
陰乾者勝北部曰乾亦有火乾者皮小焦不如而耐
陸堅久此藥至勁利粗者便不中服
蘇恭曰葉子草並似羊蹄但草高六七尺而根味酸
藥生叢葉粗長而厚根紅者亦似羊蹄大者乃如
盤長二尺其性溫潤而易蛙瘰火乾乃佳作時燒石

博物彙編草木典第一百五十五卷大黃部

使燕微寸截置石上燻之一日微燥以蘗者服乾今

出右州涼州西羌蜀地者皆佳而片以北者漸稠氣

力不及蜀中者陶言蜀地不及隴西漢矣

陳造器曰凡用當分別之若取和及深沉能攻病者

可用蜀中似牛舌片紫塊者若取瀉瀉快推陳去

熱者當取河西銀文者

蘇頌曰今蜀川河東陝西州郡皆有之以蜀川錫文

者佳其大秦雍來者謂之土蕃大黃正月內生青葉

似寬麻大者如扇根如羊大者如盤長一二尺其細

根如牛旁小者亦如羊四月開黃花亦有青紅似紫

春花者莖青紫色形如竹二月八月采根去黑皮切作

橫片火乾蜀大黃乃作紫片如牛舌形謂之牛舌大

黃一者功用相等江淮出者曰土大黃二月開花結

細實

李時珍曰宋祁益州方物圖言蜀大山中多有之亦

草大葉根巨若盤葉市以大者為枕紫地錦文也今

人以莊浪出者為最壯浪即古澤原隴西地與別錄

相合

正誤

蘇頌曰鼎州出一種羊蹄大黃治疥癬其效初生苗

葉莖年長大即葉似箭而根失四四月內抽條出穗

五七莖相合花葉同色結實如蕎麥而輕小五月熟

即黃色呼為金蕎麥三月采苗五月實陰乾九月

采根破之亦有綿文亦呼為土大黃

李時珍曰蘇說即老羊蹄根也因其似大黃故謂之

羊蹄大黃實非一類又一種酸模乃山大黃也狀似

本條

根修治

雷蛇曰凡使細切以文如木旋旋緊重者切片蒸之從已至未曬乾又瀝水蒸之從未至亥如此凡七太陽乾即瀝水再蒸一伏時其大黃必如烏膏樣乃曬乾用陳蘇器曰凡用有蒸有熟不得一藥用之陳承曰大黃未時皆以火石礬乾貨實更無生者用之亦不須更多也或蒸或煮

氣味

苦寒無毒

別錄曰大寒

吳普曰神農雷公皆有毒扁鵲苦無毒李杲曰大寒張元素曰味苦氣寒氣味俱厚沈而降陰也用之須酒浸燥熱者寒因熱用酒浸入太陽經酒洗入陽明經炒經不用酒

李杲曰大黃苦峻下走用之於下必生用若邪氣在上非瀉不必用酒引上至高之分驅熱而下如物在高雖必射以取之也若用生者則通至高之邪熱是以愈後或目赤或喉痺或頭腫或腸上熱疾生也

李時珍曰凡病在氣分及胃寒血虛并痘瘰瘵後重勿難用其性苦寒能傷元氣耗陰血故也徐之曰大黃為之使無所異

甄權曰忌冷水乾漆

主治

本經曰下瘀血閉寒熱破癥瘕積聚宿食宿滿

蘇頌曰性陳致新通利水穀調中化食安和五臟

別錄曰平胃下氣除痰實腸間結熱心腹脹滿女子

藥血閉脹小腹痛諸老血諸結

甄權曰通女子經候利大補利大小腸結熱腫毒小

兒寒熱時疾煩熱燥

大明曰通宣一切氣調血脈利關節並壅滯水氣溫

瘰瘵

張元素曰瀉諸實熱不通除下焦濕熱消宿食瀉心

下痞滿

李時珍曰下痢赤白暴急腹痛小便淋瀝實熱燥結

潮熱諸瘧黃疸諸火瘡

發明

徐之才曰得芍藥黃芩甘草蠲痺字扶脊療驚志惡心

下悸氣得消石紫石英桃仁瘧女子血閉

寇宗奭曰發背瘡治心氣不足吐血動血瀉心湯用

大黃黃本黃連或曰心氣既不足而不用補心湯更

用瀉心何也答曰若心氣獨不足則當不吐動也此

乃邪熱因不和而客之故令吐衄以苦澀其熱以苦

補其心蓋一舉而兩得之有是證者用之無不效惟

在量其虛實而已

朱震亨曰大黃苦寒泄泄仲景用之瀉心湯者正因

少陰經不足不經之陽亢甚無輔以致陰血妄行飛

越故用大黃瀉去亢甚之火使之平和則血歸經而

自安夫心之陰氣不足非一日矣肺與肝俱各受大

而病作故黃芩救肺黃連救肝肺者陰之主肝者心

之母血之合也肝肺之天既退則陰血復其舊矣寇

氏不明說而云邪熱客之何以用仲景之進而而倍

後人也

李時珍曰大黃乃足太陽手足厥陰五經

血分之藥凡病在五經血分者皆用之若左關分用

之是謂謀伐無過矣瀉心湯治心氣不足吐血動血

者乃真心之氣不足而手厥陰心包絡足厥陰肝足

太陽脾足陽明胃之邪火有餘也雖曰瀉心實瀉四

經血中之伏火也又仲景治心下痞滿按之軟者用

大黃黃連瀉心湯主之此亦瀉脾胃之濕熱非瀉心

也病發於陰而反下之則作痞滿乃寒傷營血邪氣

乘虛結於上焦胃之上脘在於心故曰瀉心實瀉脾

也者問云太陽所致為痞滿又云瀉氣在上則生腹

脹是矣病發於陽而反下之則成結胃乃熱邪陷入

血分亦在上脘分野仲景大陷胃湯丸皆用大黃亦

瀉脾胃血分之邪而降其瀉氣也若結胃在氣分則

只用小陷胃湯痞滿在氣分則用半夏瀉心湯矣成

無己註釋每藥論亦不知分別此義

成無己曰瀉心湯所以苦泄之大黃之苦以瀉滌滌

熱下燥而泄胃強

蘇頌曰本草稱大黃性陳致新其效最神故古方下

積瀉多用之張仲景治傷寒用處尤多古人用毒藥

攻病必隨人之虛實寒熱而處置非一切輕用也藥

武帝因發熱欲服大黃城郭曰大黃乃是快藥至

尊年高不可輕用帝弗從後發至委頓梁元帝常有

心腹疾諸醫咸謂宜用大黃可漸宜通便曰脈洪而

實此有宿積非用大黃無藥理帝從之遂愈以此言

之本醫用一毒藥而攻寒病其便中便調此方神奇

甚若誤則不可言藥之失可不戒哉

紫氣珠

酸寒無毒

主治 白濁下疳風濕

附方

吐血鮮血治心氣不足吐血鮮血者湯心湯主之太

黃二兩黃連黃芩各一兩水三升煮一升熱服取利

黃連黃芩

吐血鮮血治心氣不足吐血鮮血者湯心湯主之太

黃二兩黃連黃芩各一兩水三升煮一升熱服取利

黃連黃芩

吐血鮮血治心氣不足吐血鮮血者湯心湯主之太

黃二兩黃連黃芩各一兩水三升煮一升熱服取利

黃連黃芩

吐血鮮血治心氣不足吐血鮮血者湯心湯主之太

黃二兩黃連黃芩各一兩水三升煮一升熱服取利

黃連黃芩

吐血鮮血治心氣不足吐血鮮血者湯心湯主之太

黃二兩黃連黃芩各一兩水三升煮一升熱服取利

黃連黃芩

吐血鮮血治心氣不足吐血鮮血者湯心湯主之太

黃二兩黃連黃芩各一兩水三升煮一升熱服取利

黃連黃芩

吐血鮮血治心氣不足吐血鮮血者湯心湯主之太

黃二兩黃連黃芩各一兩水三升煮一升熱服取利

黃連黃芩

吐血鮮血治心氣不足吐血鮮血者湯心湯主之太

黃二兩黃連黃芩各一兩水三升煮一升熱服取利

黃連黃芩

吐血鮮血治心氣不足吐血鮮血者湯心湯主之太

黃二兩黃連黃芩各一兩水三升煮一升熱服取利

黃連黃芩

滾珠丸治癰疽白病惟水湯前產後不可服用大

黃酒浸蒸熟切曬八兩生黃芩八兩沈香半兩青礬

石二兩以煅硝二兩同入砂礬同濟殺紅研末二兩

右各取末以水和丸梧子大常服一二九小病五

六十九緩病七八九急病一百二十九溫水吞下

即臥勿動候藥達上焦發熱時日先下糖相水下痰

涎未下再服王隱君說合四十餘斤悉痰數劑也

無極丸治婦人經血不調赤白帶下崩漏不止腸風

下血五淋甚後積癰瘰癧腹痛男子五勞七傷小兒

骨蒸潮熱等證其效甚速宜六日食合之用錫又

黃一斤分作四分一分用重原一盤食鹽二錢浸一

日切曬一分用酒原一盤浸一日切曬再以巴豆仁

三十五粒同炒豆黃去豆不用一分用紅花四兩泡

水一盤浸一日切曬一分用黃芩四兩入淡醋一盤

同浸一日去歸切曬為末燒黃芩梧子大每服五十

九空心溫酒下取下惡物為驗未下再服此武當高

士孫思邈方也

三物備急丸治心腹諸疾卒暴百病用大黃巴豆乾

薑各一兩芩歸各一兩千杵九小豆大每服三九

凡中苦寒心腹脹滿痛如錐刀氣急口噤停尸卒

死者以燒水或酒灌之或灌之未如便服三九腹中

鳴轉當下便愈若口已閉者折齒灌之入喉即應

此乃仲景方司安姜改為散用不及九也

腹中痞塊大黃十兩為散醋三升攪兩匙和煎丸梧

子大每服三九生薑湯下吐利為度

腹中痞塊風化石末半斤瓦器炒極熱研令入大

腹中痞塊風化石末半斤瓦器炒極熱研令入大

腹中痞塊風化石末半斤瓦器炒極熱研令入大

腹中痞塊風化石末半斤瓦器炒極熱研令入大

腹中痞塊風化石末半斤瓦器炒極熱研令入大

腹中痞塊風化石末半斤瓦器炒極熱研令入大

腹中痞塊風化石末半斤瓦器炒極熱研令入大

腹中痞塊風化石末半斤瓦器炒極熱研令入大

黃末一兩炒熟入桂心末半兩略炒下米醋攪成膏

攤布貼之 又方大黃二兩科硝一兩為末以大蒜

同搗膏和貼之或加何魏一兩九妙

久患積聚一便不利上搶心腹脹滿食大黃白芍

各二兩為末丸梧子大每湯下四十九日三以知

為度

脾瘕瘕積不拘大小兒鍾文大黃三兩為末醋一

盞炒鍋內文武火熬成膏乾瓦上日曬夜露三日再

研用熱土礪黃一兩形如琥珀者宮粉一兩同研勻

十歲以下小兒半錢大人一錢半米飲下忌一切生

冷固肉只食口粥半月如一服不愈半月之後再服

若不足口不知如服

小兒無辜因癰癰或癰乾黃發或乍痢乍瘰諸狀

多者大黃煎主之太黃九兩鍾文新實者若微朽即

不中用削去皮搗篩為散以好米醋三升和置瓦盤

中於大鐵內浮湯上炭火燒黃後至成膏丸九乃貯

器中三歲兒一服七九梧子大日再服以下出青赤

膿為度若不上下下稍稍加九若下多又須減之

症重者七八劑方盡根大人亦可用之此藥惟下宿

膿不令兒利也須禁食毒物乳母亦禁之 一加大香

一兩半

小兒患熱大黃煎黃發各一兩為末燒盡丸麻子

大每服五九至十丸蜜湯下加黃連名三黃丸

骨蒸熱結漸漸黃連大黃四分以童子小便五六合

煎取四合去滓空腹分服一服如人行五里再服

方

方

方

方

方

方

方

方

赤白痢淋好大黃末每服六分以譚子一箇破頂

入藥燒好熟熱心食之不遇三服愈方

相火解結大黃末一兩半生頭末半兩每服三錢有

疾冷者酒服無疾冷五心煩驚湯服能利

諸痢初起大黃煨熟當歸各二三錢壯人各一兩水

煎服取利或加檳榔方

熱痢裏急大黃一兩浸酒半日煎服取利方

忽遇痢起不能語言逆流吐逆牙齒動搖氣出轉大

絕而復蘇名傷寒併熱霍亂人參大黃各半兩水二

盞煎一盞熱服可安方

食已即吐胃中有火也大黃一兩甘草二錢半水一

升煮半升溫服方

婦人血毒作痛大黃一兩酒一升煮十沸頓服取利

產後血塊大黃末一兩煎醋半升煮膏九梧子大每

服五九溫醋化下良久當下方

乾血氣痛綿文大黃酒浸曬乾四兩為末好醋一升

煮成膏丸大黃酒浸化一丸服大便利二行

紅潤目下乃調經仙藥也或加香附方

婦人嫁小戶腹痛也大黃一兩酒一升煮一沸頓

服方

男子偏墜作痛大黃末和醋塗之乾則易方

濕熱眩逆不可當者酒炒大黃為末茶清服二錢急

則治其標也方

小兒驚熱常欲閉目大黃一分水三合浸一夜一歲

胃火牙痛口含冰水口以紙墊離大黃末隨左右

嚼鼻立止方

紫金散治熱熱積聚一切牙痛去口氣大有奇效好

大黃瓶內燒存性為末早晚刷牙漱去都下一家專

貨此藥兩膏常以數千圓之其門知市也方

風濕牙痛服常出血腫至崩潰口鼻極效大黃末出

浸軟生地黃各旋切一片含貼上一夜即愈大愈

再貼此說恐忽引風方

口瘡生瘡大黃枯粉等分為末擦之吐涎方

鼻中生瘡生大黃杏仁磨勻豬脂和塗又方生大

黃黃連各一錢麝香少許為末生油調搽方

仙牙毒發古膠出口方見仙牙下

傷指熱血四方雞鳴散治從高墮下石石壓傷及

一切傷損瘀凝積痛不可忍以此藥推撲致新大

黃酒蒸一兩杏仁去皮二十一粒細研酒一盞煮至六

分雞鳴時服至晚取下瘀血即愈和酒方治跌壓

瘀血在內服酒大黃當歸等分炒研每服四錢溫酒

服取下瘀物方

打撲傷瘀瘀血凝注或作調熱者大黃末蜜汁調塗

一夜即愈瘡一夜聚者白也方

杖瘡癰腫大黃末醋調塗之蜜亦可調方

金瘡癰腫大便不閉大黃末等分為末當先食

水下十九日三服方

湯火傷灼壯大黃末酒塗之痛止方

形面去痛不可忍是火毒也大黃粉稍各半兩為末

水服取利即愈方

燙瘡癰腫大黃末塗之方

火丹赤腫遍身者大黃粉水頻刷之方

腫毒初起大黃五倍子黃雄等分為末新汲水調塗

日四五次方

瘰癧癰熱作痛大黃末醋調塗之瘰即易不遇數易

即退奇驗神方也方

乳癰腫毒全黃散用川大黃粉草各一兩為末好酒

熬成膏收之以指攤貼瘡上微臥仍先以溫酒服一

匕空心溫酒下取出惡毒物如魚鱗狀未下再服即

取下如龍聚之蟲取盡乃服雄黃花蛇藥名趙天再

塗散方

大風癰腫大黃微一兩尾角刺一兩為末每服方寸

匕空心溫酒下取出惡毒物如魚鱗狀未下再服即

取下如龍聚之蟲取盡乃服雄黃花蛇藥名趙天再

塗散方

大黃部藝文一

大黃質

蜀大山中多有之尤為東方所貴苗根皆長盈一

尺本草言之尤詳藥市所見大者皆之為枕紫地

錦文書人以為產蜀者性厚沈深可以治病形

似牛舌紫嫩者善藥所生葉尚多如川之巴豆映

之根特之厚刺者數十葉

宋朱耶

宋朱耶

大黃部藝文二

大黃花

宋范成大

大羊高荷半畝陰玉英危巖綴瑞露誰知一葉蓮花
面中有將軍劍戟心

大黃部紀事

北史姚僧坦傳僧坦字法衡吳興武康人仕梁爲太
醫止梁武帝書因發熱服大黃僧坦曰大黃快藥至
尊年高不宜輕用帝弗從遂至危篤太清元年轉鎮
西湘東王府中記室參軍僧坦少好文史爲學者所
稱及梁簡文帝位僧坦兼中書舍人梁元帝平侯景
召僧坦赴荊州改授晉安王府諮議梁元帝嘗有心
腹病諸醫皆請用平藥僧坦曰脈洪實宜用大黃元
帝從之連湯飲果下宿食因而疾愈時初鑄錢一當
十乃賜十萬貫實百萬也

宋史劉敞傳敞字晦伯梁清人咸淳九年試吏部尚
書嘗中書舍人十年丁母憂明年江上漕師丞相陳
宜中擁王入海以兵誅敞其政及譴浮以疾卒初
陳宜中夢人告之曰今年天災流行人死且半服大
黃者生繼而投藥大作服者果得不死及敞病宜中
令服之終莫能救

元史耶律楚材傳楚材事金爲左右司員外郎太祖
定燕聞其名召見之丙戌冬從下薊武諸將爭取子

女金鼎楚材獨收遺書及大黃藥材既而士卒病疫

得大黃輒愈

罪李錄葛可久姑蘇人治方脈術與丹溪朱彥修齊
名嘗炒大黃過焦湯藥去不用其毒如此又藥以生
辰摧神嗣元習武藝一日見是葛開藥弓可久挽之
而殺歸而下血遂命其子原大黃因兩飲之其子惡
多私滅其牛不下問故其子以實對可久曰少耳亦
無傷也我命來年當死今則未也再服一兩愈明年
果卒

大黃部雜錄

水經注魏土地記曰代城東五十里石剎刺山山上
有住大黃也

欽定古今圖書集成博物彙編草木典

第一百五十六卷目錄

青桐部彙考

青桐部

青桐部彙文

草決明

蒼耳部彙考

蒼耳部

胡蒼耳圖

胡蒼耳圖

胡蒼耳圖

胡蒼耳圖

胡蒼耳圖

胡蒼耳圖

胡蒼耳圖

胡蒼耳圖

胡蒼耳圖

胡蒼耳圖

胡蒼耳圖

胡蒼耳圖

胡蒼耳圖

胡蒼耳圖

胡蒼耳圖

胡蒼耳圖

胡蒼耳圖

胡蒼耳圖

胡蒼耳圖

胡蒼耳圖

胡蒼耳圖

胡蒼耳圖

胡蒼耳圖

胡蒼耳圖

欽定古今圖書集成博物彙編草木典

東坡雜記

本草綱目

赤桐部彙考

赤桐部彙文

赤桐部彙錄

丹參圖

丹參圖

丹參圖

丹參圖

丹參圖

丹參圖

丹參圖

丹參圖

丹參圖

丹參圖

丹參圖

丹參圖

丹參圖

丹參圖

丹參圖

丹參圖

丹參圖

丹參圖

丹參圖

丹參圖

丹參圖

丹參圖

丹參圖

丹參圖

丹參圖

丹參圖

青桐圖

青桐圖

青桐圖

青桐圖

青桐圖

青桐圖

青桐圖

青桐圖

青桐圖

青桐圖

青桐圖

青桐圖

青桐圖

青桐圖

青桐圖

青桐圖

青桐圖

青桐圖

青桐圖

青桐圖

青桐圖

青桐圖

青桐圖

青桐圖

青桐圖

青桐圖

青桐圖

青桐圖

青桐圖

青桐圖

青桐圖

青桐圖



本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

李時珍曰青桐名義未詳胡麻葉亦名青桐此草又
多生於胡麻地中與之同名者以其相似而然則青
蒿亦名草蒿其功相似而名亦相何哉其子明曰
與決明子同功故有草決明之名其花葉似雞冠
苗似蔓故謂之雞冠草鄭樵通志言俗名牛尾蒿誤
矣

集解

別錄曰青桐生平谷道旁三月采草葉陰乾五月六
月采子

陶弘景曰處處有之似麥櫚花其子甚細別有草蒿
或作草葉主瘰癧相類形名又相似可疑而實兩種
也

蘇恭曰此草苗高尺餘葉細嫩花紫白色實作角子
黑而扁似兒兒實而大生下濕地四月五月采割義
人名爲兒兒草

郭頌曰今江淮州郡近道亦有之二月生青苗長三

四尺葉似柳而輕葉初黃青紅花六月七月內生

花上紅下白子黑光而扁似黃根亦似蒿根而白

直下獨莖生根六月八月采子

李時珍曰青箱生田野間數苗似莧可食長則高三

四尺葉花實與雞冠花一樣無刺但雞冠花穗或

有大而扁或圓者此則稍間出花穗長四寸狀

如兔尾水紅色亦有黃白色者在穗中與雞冠子

及莧子一樣難辨蘇恭曰比絲角其美蓋烟言此花

者名陶珠而與便破器所說不同又有天蓬草亦此

類也并附於下

附錄陶朱術

蕭炳曰青箱一種花黃者名陶朱術青相似

陳藏器曰桃朱術生園中細如芥花莢子作角似鏡

向旁散之則子自發五月五日乃收子帶之令婦人

爲夫所愛

附錄天蓬草

李時珍曰按上宿鼻君本草云狀如雞冠花葉亦如

之折之有液如乳生江湖間南陂池間五月取汁可

制雄雞煮煉煉炒

附錄思實子

雷斅曰思實子風楊子二件俱似青箱子只是味不

同思實子味苦而之有瀉

雷斅曰凡用先燒鐵杵臼乃搗用之

氣味

本經曰邪氣皮膚中熱風濕身癢殺三蟲

別錄曰惡毒疥癬痔瘡下部諸瘡

蘇恭曰搗汁服大瘡瘰癧

大明曰止金瘡血

子氣味

苦微寒無毒

說樞曰苦平

主治

本經曰治口苦

大明曰治五臟邪氣益腦髓鎮肝明目堅筋骨去

風寒濕痹

甄權曰治肝臟熱毒瘰癧赤障青盲翳障惡瘡疥瘡

發明

蕭炳曰連服有青箱子丸

寇宗奭曰青箱子經中不言治眼惟藥性論曰華子

始言治肝明目今人多用治眼珠與經意不相當

李時珍曰青箱子治眼與決明子莧苢同功本經雖

不言治眼而云一名草決明主目青則其明目之

功可知矣目者肝之竅目者足厥陰經之證古

方除熱亦多用之青箱子之爲厥陰藥又可知矣况

用之治目往往有驗尤可徵據蘇恭云初平中有青

牛先生當服青箱子九年自餘歲如五十者

附方

鼻血不止眩冒欲死青箱子汁三合灌入鼻中鼻利

青箱部藝文

草決明

惟茲決明有石有草石也體剛草也包好聚落秋好

幽人所憐雨中百草爛死階下決明色鮮

明聖本峻

蒼耳部彙考

釋名

卷耳

蒼耳

常棣

常思

蒼耳

蒼耳

蒼耳

蒼耳

蒼耳

蒼耳

蒼耳

蒼耳

蒼耳

蒼耳

蒼耳

蒼耳

蒼耳

蒼耳

蒼耳

蒼耳

蒼耳

蒼耳

蒼耳

蒼耳

蒼耳

蒼耳

蒼耳

蒼耳

蒼耳

蒼耳

蒼耳

蒼耳

蒼耳

蒼耳

蒼耳

蒼耳

蒼耳

蒼耳

蒼耳

蒼耳

蒼耳

蒼耳圖



胡蒼耳圖



詩經

周南卷耳

采采卷耳不盈頃筐

卷耳耳耳釋草文郭璞曰廣雅云采耳亦云胡
泉江東呼常菜或曰蒼耳形似鼠耳叢生似盤
瓊疏云葉青白色似胡菜白華細莖蔓生可煮
爲茹滑而少味四月中生子如婦人耳中環今
或謂之耳瑣幽州人謂之爵耳是也本草卷耳
卽今之蒼耳今人藥中多用之

爾雅

釋草

耳茶耳

廣雅云象耳也亦云胡象江東呼爲常或云
咎耳形似鼠耳叢生如蟹螯耳名耳耳郭
廣雅云象耳也亦云胡象江東呼爲常或曰咎
耳形似鼠耳叢生如蟹螯詩周南云采芣耳陸機
疏云葉青白色似胡荽曰華細葉叢生可驚爲菊
漚音乃音疎音四月中生子如婦人耳瑤幽州謂之音
耳是也

毛詩陸疏廣要

馬南卷上

采采卷耳

[illegible]

中華書局影印

曰實矣。今曰毛卷耳何也？是詩也非詩也。是物而不滿焉則以志在彼不在此也。問者曰：后詩人借此以爲后妃之心，其故曰：說詩者不以文害詞，不以詞害志；以意逆志，是爲得之。爾雅與云：卷耳菜名也。爾雅謂之碩菜。杜預引胡堂曰：呼爲常葉菜。言已似胡菜，而細辛可羹食，如蒿豈少味？又謂之當思菜。胡人皆食之，又以其實覆麴作黃米糕。因氏月令曰：伏後，壬子爲麴。至七月七日，乾之，覆以胡菜。故古人毛之卷耳之詩，后妃志欲備主人飲食，故臣下之勤勞先能多異說。蓋毛采卷耳賦之謎者，准由十種醫師座女位隨向象樞經飛翔詩：叔仲曰尚主也。某君於某日某地是官者，至全職服也。特師庶女役之微者，周禮職不可考或成以前朝祖之官有之。其實如蒼耳面赤色上多刺好者，人亦令人避聞之者耳。一名蓬蘽藤，以供小兒，所謂養人入蜀稱著羊毛蜀人種之。曰羊耳來也，而隱居乃云：中國無此。曰從外國運羊毛中來，惟此物似胡稱來，是胡物，但國風爾雅所載則其來已久，而羊耳來之名僅出後代，則此名恐自洛人蜀者傳之。

按平旦云：卷耳，一名蓬蘽藤，云蓬蘽藤以鼠室兮。蓬蘽藤以鼠室耳耳，又或因蓬蘽藤施羊耳即蓬蘽郭氏以爲菑筲引離騷九章中洲之蕭艾卽蓬筲持遺不芟莠耳。王叔阜序彭澤注：二物又接詩

云卷耳實雅云蒼耳廣雅云臭耳皆以實得各第
陸氏曰曼生郭氏云蒼生必借以郭氏爲正
東坡雜錄

蒼耳錄

藥至賤而爲世要用未有若蒼耳者他藥雖賤或地
有不產惟此藥不問南北夏山澤片肉泥土沙石
但有地則產其花葉根實皆可食之則如藥治病
無毒生熟九散無過不可愈食愈善乃使人身體
肌如王長生藥也主瘡風癰腫殺毒瘡不可勝
言尤治癰金瘡一名羊負來詩謂之卷耳燕謂之臭
耳俗謂之道人頭海南無藥性此藥生食下毒客之
幸也已卯二月望日書
林洪山家清供

道賢菜

蒼耳葉耳也江東名常菜幽州名簪耳形如鳳耳陸
瓌云葉青白色似胡荽白華細莖蔓生米嫩葉洗
掉以薑鹽若酒拌爲茹可療風杜詩云蒼耳可療風
童兒且時摘詩之卷耳首章云嗟我懷人直彼周行
酒醴婦人之職臣下勤勞君必勞之因未此而賦感
念及酒醴之用此見古者后妃欲以進賢之通風其
上張氏進賢菜詩曰園圃誠難與國防談陸徒爾爾
高麗魏魯欲解無庸復充耳元因避之酒樂其子可華
米炒爲糕故古詩有碧酒濁蒼耳飯之句云
徐光祿錄取全書

蒼耳考

本草名象耳俗名道人頭又名喝起草一名胡象一
各地草一名龜一名常思一名羊負來詩謂之卷耳

爾雅謂之蒼耳生安陸川谷及大安田野實熟時采
之葉青曰頭枯則葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉
而多刺其實味甘性溫藥味苦辛性微寒有小毒
又云無毒

救微

採嫩苗葉燻熟水浸去苦味淘淨油鹽調食
妙微黃楊去皮磨爲粉作燒餅食亦可或煎子熬
油點燈

胡蒼耳考

又名回蒼耳生田野中葉似皂莢葉微長大又似
蜀江南葉而小頗殘花微淡綠葉有綠粉結實如蒼
耳實但長而味微苦

救微

採嫩苗葉燻熟水浸去苦味淘淨油鹽調食
治病

治病

今人傳說治諸般瘡抹藥用好酒熬暖消腫
本草綱目

象耳考

蘇頌曰詩人謂之卷耳爾雅謂之蒼耳廣雅謂之象
耳皆以實得名也陸瓌詩云其實正如婦人耳瑣
今或謂之耳瑣耳瑣康成謂是白胡來幽州人呼爲
爵耳博物志云洛中有女人驅手入蜀胡象耳多刺粘
綴羊毛遂至中國故名手負來俗呼爲道人頭
陶弘景曰借人首實之謂之常思來以葉覆葉作黃
衣者方用甚稀
李時珍曰其葉形如象耳又如如故有象耳及野茄

諸名其味清和藥放各地藥與地膚同各詩人思夫
試寒耳之草故名常思來張揖廣雅作常菜亦通

集解

爾雅曰象耳生安陸川谷及大安田野實熟時采
蘇頌曰今處處有之陸氏詩疏云其葉青白似胡荽
白華細莖蔓生可食爲茹滑而少味四月月中生子正
如婦人耳瑣郭璞云形如鼠耳蒼生如盤今之所有
皆類此但不作蔓生
李時珍曰按周惠王殺兒本草云蒼耳葉青白類稻
糊葉葉軟間結實比桑葚短小而多刺嫩苗燻熟水
浸淘淨食可放微其子炒去皮研爲粉可作燒餅食
亦可熬油點燈

實修治

大明曰人藥炒熟去刺用或酒拌蒸過用
氣味

甘溫有小毒

別錄曰苦

甄權曰甘無毒

蘇恭曰忌猪肉馬肉米泔害人

主治

陳藏器曰風頭寒痛風濕周痹四肢拘攣痛惡肉死
肌腫痛久服益氣
甄權曰治肝熱眼目
大明曰治一切風氣填髓暖腰脚治瘰癧瘡疥及瘰
癧
李時珍曰炒香浸酒服去風補益
葉葉修治

雷震曰凡采得去心取黃精以竹刀細切拌之蒸從已亥時出去黃精除乾用

並藥氣味

苦辛微寒有小毒

蘇恭曰忌豬肉馬肉未泔灰燼砂

並藥主治

別錄曰漢書

孟詵曰中風傷寒頭痛

蘇恭曰大風癰瘡頭風濕毒在骨髓腰膝風毒夏

月采曝為末水服一二日冬月酒服或為丸每服二

三十九日三服滿百日病出如癰疥或汗出或破敗

甲錯皮起皮落則肌如凝脂令人省瘡除諸毒殺

蟲辟濕驅風服谷耳日聰明輕身強志

陳藏器曰授葉安舌下出涎去日黃好睡熾灰和臘

猪脂封丁腫出根煮酒服主狂大咬毒

發明

李時珍曰蒼耳葉久服去風能行效最速猪肉及風

邪犯之則遍身發出赤丹也按蘇沈良方三葉耳根

苗葉實合生寒陰乾燒灰酒淋取濃汁泥連兩煎煉

之灰汁和即能取傷中熱灰湯塗之一日夜不罷

火乃旋得乾乾旋收之每日早晚酒服一錢補燥

去風辟邪尤治皮膚風令人膚革清淨每湯沐入少

許其佳宜州學自從漢服此十餘年至七八十紅潤

體健忘倒地不知人事方云婦人血風攻腹或施問

以酒服一錢其功甚效此物甚毒地頂門連腦蓋即

蒼耳也

花主治

李時珍曰白爛頭瘡

附方

久瘡不癒蒼耳子或根莖亦可焙研末酒調九指十

大每酒添三十九日二服生者搗汁服亦可

大腹水腫小便不利蒼耳子灰草歷末等分每服二

錢水下二服

風濕癱瘓一切風氣蒼耳子三兩炒為末以水一升

半煎取七合去滓滓

牙齒痛腫蒼耳子五升水一斗煮取五升熱含之令

即吐去吐後復含不遇一劑瘳葉亦可或入鹽少

許

鼻淵涕唾蒼耳子即煉梅草子炒研為末每白湯點

服一二錢

眼目昏暗蒼耳實一升為末白米半升作粥日食之

嗜酒不已難中蒼耳子七枚藥及投酒中飲即不嗜

萬應膏治一切癰疽疔毒無頭惡毒腫毒疔毒一切

風痒癩疥疥瘡疥癩癰五月五日米耳根葉數

担洗淨曬乾細切以火鍋五口入水煮爛以篩濾去

粗滓布再通復入淨鍋武火煎深文火熬稠攪成

膏以新綿貯封每以數貼即愈平床即敷牙上熨瘡

敷舌上或喉化二三次即效每日用酒服一匙極有

效

一切風毒并殺三蟲癰瘡能通食若病胃脹滿心悶

發熱即宜服之五月五日午時附地取耳葉洗

暴渴下篩每服方寸匕酒或漿水下日一夜三若覺

吐逆則以漿丸服準計方寸數也風輕者日二服

若身體作寒或麻豆出此為風毒出也可以針刺瀉

去黃汁乃止七月九月亦可採用

一切風氣蒼耳嫩葉一石切和麥葉五升作塊於蒿

艾中覆一千日成餅取末一斗炊作飯香冷服於餅

三升飯之封二七日成熱每空心服服神驗封此酒

可兩重布不得令密密則出忌馬肉猪肉

諸風頭通蒼耳葉嫩葉為末每服一錢酒調下日三

服若吐則以漿丸九指十人每服一錢酒調下日三

服若吐則以漿丸九指十人每服一錢酒調下日三

服若吐則以漿丸九指十人每服一錢酒調下日三

服若吐則以漿丸九指十人每服一錢酒調下日三

服若吐則以漿丸九指十人每服一錢酒調下日三

服若吐則以漿丸九指十人每服一錢酒調下日三

服若吐則以漿丸九指十人每服一錢酒調下日三

服若吐則以漿丸九指十人每服一錢酒調下日三

服若吐則以漿丸九指十人每服一錢酒調下日三

服若吐則以漿丸九指十人每服一錢酒調下日三

服若吐則以漿丸九指十人每服一錢酒調下日三

服若吐則以漿丸九指十人每服一錢酒調下日三

服若吐則以漿丸九指十人每服一錢酒調下日三

服若吐則以漿丸九指十人每服一錢酒調下日三

服若吐則以漿丸九指十人每服一錢酒調下日三

服若吐則以漿丸九指十人每服一錢酒調下日三

服若吐則以漿丸九指十人每服一錢酒調下日三