

国外市售成药介绍

《8》

皮肤科用药及其他药物



北京市医药情报所

82/12

国外市售成药介绍〈8〉

北京市医药情报所 编译
北京市药材公司印刷所 印

1982年12月 (本书共八册)

CALMURID

【中文名】(干皮利)

【剂 型】乳膏

【生产厂】Pharmacia

【成 分】尿素 10%，乳酸 5%，甜菜硷 4.3%。

【适应症】皮肤干燥和皮肤角化过度症状，尤其是普通鳞癣和伴性性鳞癣；特应性湿症中用作辅助治疗。

【用 法】每日 2 次于患处涂一厚层。擦去前使保留 3—5 分钟便于药物透入。

【包 装】50g m (4.00)。

目 录

皮肤科用药(续前册)

- 8. 角质层分离剂 1
- 9. 皮肤保护剂 3—6
- 10. 抗组胺药 7—10
- 11. 镇痛及消炎药 11—18
- 12. 止痒剂及其他皮肤用药 19—32

其他类药物

- 1. 局部及全身麻醉药 33—48
- 2. 诊断用药及测试制剂 49—68
- 3. 癌症化疗药剂 69—96
- 4. 解毒剂和免疫制剂 97—135
- 5. 静注溶液 137—162
- 6. 杂类药物 163—199
- 总索引 201—250
- 《国外市售成药介绍》工作人员名单 251

皮 肤 保 护 剂

東 州 綱 要

CLOCREAM

【中文名】(乐皮乳)

【剂 型】乳膏

【生产厂】Upjohn

【成 分】二甲基硅油 2.5%，维生素 A·D·

【适应症】干裂性皮肤，肥皂皮炎。

【用 法】少量轻按擦入皮肤。

【包 装】50gm (3.30)。

RIKOSPRAY-BALSAM

【中文名】(利皮脂)

【剂 型】喷雾剂

【生产厂】Riker

【成 分】安息香 9%，苏合香脂 2.5%。

【适应症】局部保护剂，可用安息香酐治疗的症状都适用。

【禁忌症】明显感染部位禁用。不能吸入。

【用 法】需要时喷用。

【包 装】150gm (6.50)。

RIKOSPRAY-SILICONE

【中文名】(利皮酮)

【剂 型】喷雾剂

【生产厂】Riker

【成 分】二羟尿囊素铝0.5%，氯化1-十六烷基吡啶(西白林)0.02%，硅酮至100%。

【适应症】尿布疹，褥疮，皮肤刺激。

【用 法】需要时喷用。

【包 装】6呎(11.70)。

R·V·PAQUE

【中文名】(防晒油)

【剂 型】软膏

【生产厂】Paul B. Elder

【成 分】红凡士林，氧化锌，对甲氧基肉桂酸 2-乙氧基乙酯。

【适应症】完全遮断阳光(防晒)。

【用 法】在需要完全遮断阳光的部位均匀地涂上一薄层，若认为不需进一步保护时，可用肥皂和水轻易地洗除。

【包 装】1/2呎(6.00)，1¹/₄呎(7.30)。

R V P

【中文名】(防晒膏)

【剂 型】软膏

【生产厂】Paul B. Elder

【成 分】红凡士林，对羟基苯甲酸酯

【适应症】屏蔽阳光。

【用 法】局部涂用防晒伤。

【包 装】2两(5.90)。

SIOPEL

【中文名】(湿恶避)

【剂 型】乳膏

【生产厂】ICI

【成 分】二甲基硅油 10%，溴化十四烷基三甲基铵(溴烷铵)0.3%。

【适应症】一种驱水的，以硅酮和防腐剂作屏障的乳膏；用于职业性皮肤病，在失禁病情中防止由体液引起的表皮脱落，以及防止褥疮。

【禁忌症】切勿在急性炎症性或渗湿性的皮肤上，或在皮肤清除污染的刺激物之前使用该药。

【用 法】在整个部位敷用少量并擦入皮肤。若需继续保护，则在头 3—4 天中每日敷用 3—5 次，然后每日 1—2 次。

【包 装】50g m (1.80)。

SPECTRABAN

【中文名】(晒伤避)

【剂 型】液体

【生产厂】Stiefel

【成 分】对-N, N—二甲基氨基苯甲酸异戊酯
2.5%

【适应症】避免日光性角化病和晒伤。

【用 法】敷用于暴露在日照下的部位。延长暴晒时可重复使用。

【包 装】65 ml (3.80)。

ANTHISAN

【中文名】(安息散)

【剂 型】乳膏

【生产厂】May & Baker

【成 分】新安替根 2%

【适应症】局部使用的速效抗组胺剂。

【用 法】按说明使用。

【包 装】25g m (1.70), 450g m (15.30)。

BENADRYL

【中文名】苯海拉明

【剂 型】乳膏

【生产厂】Parke Davis

【成 分】苯海拉明 2%

【适应症】过敏性湿疹，特应性皮炎，荨麻疹。

【用 法】按说明使用。

【包 装】25g m (1.40)。

CALADRYL

【中文名】(克痒力)

【剂 型】乳膏, 洗剂

【生产厂】Parke Davis

【成 分】炉甘石, 苯海拉明 1%, 樟脑和酒精 2%。

【适应症】缓解由日晒、痱子、荨麻疹、虫咬、轻度毒葛刺激以及其它局部刺激引起的搔痒。

【用 法】只作外用。每日局部敷用 3—4 次。

【包 装】乳膏: 1.5 两 (2.40)。

洗剂: 6 两 (2.50), 125 ml (2.30)。

CALCISTIN

【中文名】(克疹定)

【剂 型】软膏

【生产厂】Boehringer Mannheim

【成 分】葡糖酸钙 3.37%, N-苯基-N-2-吡咯烷基-1'-乙基苄胺盐酸盐(吡咯二胺) 2%。

【适应症】渗湿性过敏性湿疹和晒伤。

【禁忌症】有大面积皮肤疾病的婴儿和幼儿慎用。

【用 法】需要时敷用。

【包 装】25g m。

PARADRYL

【中文名】(痒疹敌)

【剂 型】软膏

【生产厂】Ferrosan

【成 分】溴化 β -一二苯基甲氧基乙基三甲铵 2g m/
100g m

【适应症】贝斯尼埃氏痒疹，神经性皮炎，湿疹，荨麻疹，虫咬。

【用 法】遵医嘱。

【包 装】20g m。

PHENERGAN

【中文名】非那根乳膏

【剂 型】乳膏

【生产厂】May & Baker

【成 分】异丙嗪 2%，1,3-双(4-脒基-2-溴苯氧基)丙烷(双溴丙脒) 0.15%。

【适应症】过敏性疾病。

【用 法】于患处敷一薄层，用 2—3 天。

【包 装】25g m (1.90)。

SYSTRAL

【中文名】氯甲苯醇胺乳膏

【剂 型】乳膏

【生产厂】Astra-Werke

【成 分】氯甲苯醇胺 1.5%

【适应症】过敏性搔痒性皮肤病(荨麻疹, 湿疹)。一级烧伤, 晒伤, 虫咬, 冻疮。

【用 法】需要时敷用。

【包 装】20g m, 400g m。

ALGIPAN

【中文名】(抑痛平)

【剂 型】香脂

【生产厂】Wyeth

【成 分】烟酸甲酯 1%，水杨酸乙二酯 5%，组胺二盐酸盐 0.1%，辣椒素 0.1%。

【适应症】纤维织炎，肌肉痛，腰痛，神经炎，神经痛，坐骨神经痛。

【用 法】足量敷于患处，轻轻按摩直至全部透入。

【包 装】40g m (0.90)。

ANALGESIC

【中文名】(止痛香脂)

【剂 型】香脂

【生产厂】Parke Davis

【成 分】水杨酸甲酯，薄荷醇，玉树油，桉油精。

【适应症】疼痛症状，特别是神经痛或风湿痛。

【用 法】需要时只在未破碎的皮肤上用。

【包 装】1两 (2.30)。

BUTADILAT

【中文名】(平炎痛)

【剂 型】乳膏

【生产厂】Medinova

【成 分】保泰松 5%，烟酸苄酯 1.25%。

【适应症】风湿性肌炎和其它肌病，劳损，挫伤，脱位，神经痛，类风湿性关节炎，腰痛，斜颈，外周循环障碍，腱鞘炎。

【用 法】按摩入有病部位。

【注 意】避免接触粘膜。

【包 装】30g m (1.90)

CAPSOLIN

【中文名】(克痛灵)

【剂 型】软膏

【生产厂】Parke Davis

【成 分】辣椒油树脂，樟脑，松节油，玉树油。

【适应症】缓解与神经痛、神经炎、关节痛、风湿病、腰痛、坐骨神经痛、扭伤等并发的痛感，或用于其它需用抗刺激剂的症状。

【禁忌症】应避免与粘膜或炎症皮肤接触。

【用 法】只用于未破损的皮肤。轻轻按擦。

【包 装】1/4 啊 (2.30)。

COUNTERPAIN

【中文名】(敌痛膏)

【剂 型】乳膏

【生产厂】Squibb

【成 分】水杨酸甲酯，丁香油酚，薄荷醇。

【适应症】肌痛和关节痛。

【禁忌症】若关节痛依然存在十天以上或出现皮肤红肿则即停药。破损或受刺激的皮肤上切勿使用。应避免触及眼睛或粘膜。

【用 法】用量随意。彻底按擦。日用1—3次。

【包 装】1 俩(1.70)。

DROXARYL

【中文名】(炎息力)

【剂 型】乳膏

【生产厂】Continental Pharma

【成 分】2-对丁氧苯基乙酰氧肟酸(丁苯乙肟)

【适应症】外阴炎，乳腺病，浅表静脉炎和静脉周炎，痔，肛门搔痒，睑炎，眼睑湿疹。

【禁忌症】对本药过敏者禁用。

【用 法】每日敷用2—3次。

【包 装】20g m (3.00)。