

620

# 中医验方集锦

内部刊物 注意保存

第一輯

开封市卫生局編

1959年4月印

## 前 言

我國医学有数千年的历史，有豐富的内容和宝贵的临床經驗，党中央对卫生部党组报告批示中說：“中國医药是我國人民幾千年来同疾病作斗争的經驗總結。它包含着中國人民同疾病作斗争的豐富經驗和理論知識，它是一个偉大的宝庫必須繼續努力發掘，並加以提高。我們必須組織力量認真地学习、研究、加以整理。”以豐富現代医学科学，保障人民健康和國家社会主义建設，促進工農業生产更大更好更全面的躍進。

幾年來，我市卫生事業在党和政府的正确領導下，逐步深入的貫徹了党的中医政策，取得了一定成績，組織全市所有医药卫生人員学习了党的中医政策，对岐視，排斥中医的錯誤思想开展了批判，中医已經得到了工作上的适当安排，百分之九十以上中医参加了公立或联合医療机构，鼓厉中医帶徒弟，西医学习中医运动已开展了起來。在党的教育下，广大中医在思想觉悟上有很大提高，不仅積極参加了医療保健工作，而且重視了对祖國医学遺產的研究和整理，許多中医紛紛献出了多种秘方和驗方，这对繼承与發揚祖國医学遺產有重大帮助。对服务广大羣众起着巨大作用。

为研究整理祖國医学遺產，广泛地交流中医治療經驗，我們收集整理了部分中医秘方驗方和临床驗例等資料，現經初步审編成册，借以交流，共同提高，並便医療部門和医务卫生人員臨床参考。但由於我們在編排选輯上沒有經驗，錯誤之处，在所难免，尚望每个医药卫生工作者随时給予批評、指正，以便改進我們今後工作。

开封市卫生局

43956月

# 目 录

## 傳 染 病 科

對於流感、麻疹、猩紅熱防治經驗綜合材料.....	( 1 )
麻疹.....	( 3 )
瘧疾.....	( 5 )
肺結核.....	( 6 )
痢疾.....	( 7 )

## 內 科

血小板減少性紫斑症.....	( 11 )
風濕性心臟病.....	( 16 )
心臟病二尖瓣不全.....	( 16 )
支氣管炎.....	( 17 )
慢性支氣管喘息.....	( 17 )
久咳.....	( 18 )
悶氣咳嗽.....	( 18 )
慢性氣管炎.....	( 19 )
悶喘( 2 ).....	( 19 )
哮喘.....	( 20 )
悶喘.....	( 20 )
支氣管喘息.....	( 20 )
支氣管喘息.....	( 21 )
多年喘息.....	( 21 )

慢性气管炎	( 22 )
腹水(肝硬变)	( 22 )
肝硬变	( 23 )
气鼓( 2 )	( 24 )
肾炎( 2 )	( 24 )
肾脏炎	( 25 )
泄瀉	( 26 )
水鼓	( 26 )
消渴病	( 26 )
黄疸	( 27 )
梅核气	( 27 )
胃下垂	( 28 )
脾虚	( 29 )
胃热头痛衄血	( 29 )
结肠潰瘍(腰痛)	( 29 )
胃气痛	( 30 )
寒滯腹痛	( 30 )
久瀉	( 30 )
小便隆閉	( 31 )
大便下血	( 31 )
便血	( 32 )
大便下血	( 32 )
鼻血不止	( 32 )
尿血( 2 )	( 33 )
偏头痛	( 33 )
头晕头疼	( 34 )
腰痛	( 34 )
掉头風	( 35 )

脚後眼痛	( 35 )
脚后跟痛	( 36 )
腰脊骨痛	( 36 )
筋骨腿痛	( 36 )
腰腿痛	( 37 )
臂痛麻木不能握	( 37 )
振萎固精丸	( 38 )
梦遗滑精	( 38 )
續断丸	( 39 )
口歪眼斜	( 39 )
遺尿	( 41 )
小便頻数	( 41 )
肺萎	( 42 )
小腸疝气	( 42 )
疝气	( 43 )
尋麻疹	( 43 )
脱肛	( 44 )
蘭尾炎	( 44 )
腿抽筋	( 45 )
肺膿瘍	( 45 )
虛汗盜汗及遺精	( 46 )
風湿性關節炎	( 46 )
养陰舒肝膏	( 47 )
清熱至效散	( 47 )
清熱和胃丸	( 48 )
健胃散	( 48 )
“了哥王”治療風湿病	( 49 )
“雪里膏”对急性咽喉炎特效	( 49 )

腮腺炎	( 51 )
痞块脾腫大	( 52 )

## 神 經 科

神經衰弱	( 52 )
貧血性神經衰弱	( 53 )
癲狂病	( 53 )
失眠( 3 )	( 53—54 )
精神病( 2 )	( 54 )
羊癇風	( 55 )
吊棧風	( 55 )

## 婦 產 科

調經丸	( 55 )
調經方	( 56 )
妊娠惡阻	( 56 )
瘧病	( 57 )
產後風	( 57 )
經血淋漓	( 58 )
血崩	( 58 )
止血散	( 58 )
結核性子宮出血	( 59 )

# 小 儿 科

小儿麻痺	( 59 )
水 瀉	( 60 )
瀉 痢	( 60 )
再 生 丹	( 60 )
口 腔 炎	( 60 )
扁桃腺炎	( 61 )
久瀉脫肛	( 62 )
鵝 口 瘡	( 62 )
小儿惊風	( 62 )
急 惊 風	( 63 )
耳 底	( 63 )
小儿羊羔風	( 64 )

# 寄 生 虫

条 虫	( 64 )
回 虫	( 64 )
条 虫 病	( 65 )

# 正 骨 科

接筋秘方	( 65 )
接 骨 方(二)	( 66 )
接 骨 丹	( 66 )

## 外 科

三粉香治先天性梅毒.....	( 71 )
神經性皮炎.....	( 72 )
黃水瘡.....	( 72 )
鶴膝風.....	( 73 )
風癬.....	( 74 )
鷄 眼.....	( 74 )
中耳潰瘍.....	( 74 )
牛皮癬.....	( 75 )
鵝掌風.....	( 75 )
雀 斑.....	( 76 )
皮膚靈藥水.....	( 76 )
癰 毒( 2 ).....	( 77 )
燙 傷.....	( 77 )
濕 瘡.....	( 78 )
旋 耳 瘡.....	( 78 )
刀 傷 藥.....	( 79 )
慢性漏管.....	( 79 )

## 眼 科

內 障.....	( 79 )
白 翳.....	( 80 )
爛 眼.....	( 80 )



# 傳染病科

## 對於流感、麻疹、猩紅熱

### 防治經驗綜合材料

#### 流感：

預防：(1)銀翹解毒片每日早晚各服一片，(2)生白蘿蔔煮水飲之或生吃，(3)菜豆煮水或開水沖服，(4)生蔥胡五個白蘿蔔半個，白菜根一個(切片)(水煎服)。

#### 治療：

方藥：(1)葱豉湯(葱莖三寸三個，豆豉三錢)(水煎服)(2)蟬退錢半 卜荷七分 全蘇錢半 川貝三錢 杏仁浸炒錢半 芥穗一錢或二錢 甘草一錢(水煎服)

附加減法：身痛加川羌活一錢(不痛不用)腿酸困乏加川木瓜二錢(不困不用)咽中痛加馬勃一錢 大青葉二錢(不痛不用)高熱加菜豆皮二錢(非高熱不用)有汗加雙桑葉二錢(無汗不加)

方藥：菊、銀花各三錢 葦、茅根各二錢 連翹二錢 葛根二錢 甘草二錢 白薇二錢 青蒿二錢 元參二錢 桔梗三錢 芥穗一錢 桑、枝葉各三錢(水煎服)

方藥：廣藿香三錢 香佩蘭二錢 卜荷五分(水煎服)

方藥：葛根二錢 黃芩二錢(煎服微汗)

#### 針灸防治：

針治穴位：十宣放血、前心窩上下四橫指處，挑三針出血，每穴出三珠(去風寒，解溫毒)。

發生流感後：第一日，十宣放血，上星、太陽，合谷，足三里。

風府，大椎，風池。第二、三日，十宣放血，上星，頭維，太陽，風府，風池，大椎，合谷，曲池，中腕，陽輔。(以上俱瀉法)六、七日不愈，用針刺出血法，在前心窩上下四橫指處挑三針出血，每穴三珠。在後背處六、八胸椎上下左右各挑一針出血，每穴三珠，兩肩端各挑一針出血，每穴三珠，大椎穴出血三珠，天突穴出血三珠。

外治法：用蕎麥麵如鷄旦大，用醋和搓前後心，或用煤土如鷄旦大用醋和搓前後心。

麻疹：

預防：(1)方藥：紫草根五錢，每日煎水200C.C.，一日量，每人每日每次10C.C.(上量足夠20個小孩一次服流行時連服一週)。(2)方藥：茅根，葦根，三春柳，格巴草，各等分(水煎服)。(3)方藥：茅根三錢，莞荑五分水煎服之，小孩母親多服，外用生蔥白一棵，蜜少許同拌如泥搓全身汗之。(4)方藥：琥珀回生散五分，連服二至四次。

治療：(1)已出疹，用鮮莞荑半斤，煎滾放干酒二兩，再煎一滾搓前後心，主要脚、手心部位，疹出齊為妥。如合併肺炎，可酌用麻杏石甘湯。(2)方藥：葦茅根各二錢 葛根一錢 連翹錢半 二花一錢 浮萍八分 赤芍八分 蟬衣20個 杏仁一錢 甘草八分 桂枝三分 紫草五分 芥穗一錢 (水煎服)。(3)方藥：葦莖一錢(初用或足不出者用) 葦根一錢 川貝母一錢(能解寒熱) 全蘇一錢 杏仁一錢 炒枳殼六分(能透疹) 痰多加云苓二錢 瀉甚加山藥二錢 嗽甚加白前一錢 喉痛加牛蒡子二錢 手足腕踝腫者加牛蒡子二錢 知母錢半 頭痛者加芥穗錢半 宜避風。

針灸療法：(1)高熱抽搐時，左手12井穴，右手十宣穴，放血灸：天井穴，針內庭穴。

猩紅熱：

予防：(1)处方：王孟英青龙白虎湯：白蘿卜四兩 青果二兩(切煎飲水)。(2)葦茅根各二兩(鮮者更好)煎水一砂鍋當茶喝。多喝水。荸薺芽十個(煎水頻飲之)。(3)貫眾放水缸中。(4)二花，細生地，甘草，沖水服之。(5)琥珀回生散三分至一錢服之。

治療：(1)处方：清熱涼血：酌用麻杏石甘湯 犀角地黃湯。  
(2)牛蒡子四錢 白茅根五錢至八錢 連翹四錢 菘豆皮五錢 丹皮錢半 赤芍二錢 卜荷葉八分 川貝四錢 板蘭根三錢 銀花五錢 歸尾二錢 甘草二錢。

加減味：頭痛如劈者加生石膏八錢，大渴不止者加天花粉四錢  
神昏譫語者加牛黃安宮丸五分 隨藥沖下。

以上一劑(係二日量)每日服一次，二日服完或減半用即可。

(3)处方：干葛二錢 白芍二錢 牛蒡子錢半 玄參二錢 丹皮三錢 連翹三錢 大貝三錢 甘草一錢 大青葉三錢  
(熱退去干葛，重者加入中黃三錢)。(4)处方：二花二錢 連翹二錢 姜蚕一錢 元參錢半 甘草一錢 生地一錢 桔梗一錢 紫草八分 蟬衣20個 赤芍一錢 丹皮八分 葦茅根各二錢

針治猩紅熱：方穴：十二井穴，十宣穴，如手足抽搦加刺后谿，金門兩穴。

(開封市中醫坐談會整理)

## 麻 疹

主治：麻疹初期咳嗽，煩鬧。

方藥：連翹三錢 桔梗一錢 卜荷一錢 甘草五分 升麻五分 杏仁五分。

**用法：**水煎(宜輕煎)分三次服。

**療效：**一般服一劑，即可見效。療效達95%。

**驗例：**張東亮，男，三歲，門診號9537號。

1958年12月29日，麻疹初期咳嗽鼻塞發燒不思食，兩眼臉膜充血煩燥不安、服藥一劑，全身疹點透達，咳緩，精神安靜，食思好轉。

(開封市紅會門診部中醫室)

**主治：**麻疹透達困難。

**方藥：**蘇子仁(即大麻子仁)七七牙(即小薊芽)

**制法：**用量不論多少，共搗如泥。

**用法：**糊患者腳心和手心。

**療效：**用藥後，3—5分鐘麻疹即可透達全身。

(開封市南關區聯合醫院)

**主治：**麻疹合併肺炎，

**方藥：**抗喘散：礞砂五分 兒茶三分。

**配法：**共研細末。

**用法：**以上藥量：四次服，一日量。

**療效：**療效達98%。

**驗例：**患兒陳玉英，女，二歲，麻疹合併肺炎，病情嚴重，鼻攝(十)青紺(十)兩肺塵泛密緻水泡音，經抗生素與抗喘散合併治療後，五天痊癒。

(開封市職工醫院中醫科)

# 瘧疾

主治：瘧疾。

方藥：芫花八分 雞蛋一個。

制法：混合一處 用水炒熟。

服法：在發病前一小時食之。

療效：百發百中。

附註：兼患泄瀉病者，效不確。

(南關區聯合醫院)

主治：瘧疾。

方藥：胡椒，桃葉各七個。

制法：共搗為一塊，作為七個丸，硃砂為衣。

服法：發病前半小時，用白開水送下。

療效：100%。

(龍亭區聯合醫院)

主治：瘧母(痞塊、衄血、瘧疾後遺症)

方藥：牡蠣片 三稜片 柴胡片 以上藥各二片(新型劑中藥)

用法：食前一次服，每天兩次，可連服三星期。

療效：很好。

驗例：楊子氏，女，50歲，門診2191號，主要症狀：左上腹腫硬，胃部發疼，不敢多食，衄血，發熱，頭暈，四肢無力，服藥三天後，各症見輕，半月後，已不衄，胃痛止

腫硬全消，參加了田間勞動。

(市紅會門診部中醫室)

主治：瘰癧。

方穴：大推，陶道。

針法：病發前兩小時針之出血，撒點胡椒末，膠布貼。

療效：達100%

市衛協會中醫門診部

## 肺 結 核

主治：肺結核。

方藥：固金消核丸：

川貝兩 百合兩 蒸百部兩 白芨兩 冬蟲草兩

制法：共研細末，煉蜜為丸，如蛋黃大。

服法：每日三次。早、午飯後各服一丸，晚飯後服兩丸，連服三個月為一療程。

療效：治癒22例，療效90%以上。

驗例：王××、男28歲，小學教員，兩肺上葉浸潤性肺結核，進展期，痰中有結核菌，咳嗽、吐痰，胸痛、盜汗、失眠、經服上藥半月，各症狀消失，飲食、體重增加，三月後X光診斷，病灶顯著縮小，邊緣正齊好轉，痰中亦無結核菌發現。

市公費門診部中醫科

# 痢疾

**方藥：**大棗一枚(去核)白礬(如棗核大)

**制法：**將白礬裝入棗內、燒焦，研末、

**服法：**等分兩次二沖服

**療效：**90%以上。

**附註：**此藥適宜於脾虛下利証。

(市人民醫院中醫科)

**方藥：**蒼朮三錢 (米甘水浸、陳土炒焦)

川烏兩半(去皮面包煨透) 杏仁二兩(去皮尖及油)

生熟大黃各一兩(炒) 羌活二兩(炒) 甘艸兩(炒)

**制法：**共為細末

**服法：**每服四分，小兒酌減。

**禁忌：**孕婦忌服

**引藥：**赤痢用燈心引，白痢生薑引，赤白痢生薑燈心合引，如水瀉以米湯沖服。

**療效：**可達90%以上

(市人民醫院中醫科)

**方藥：**山楂肉四兩 紅糖(適量)二兩

**制法：**先將山楂肉炒熱，再入紅糖炒至半焦加水煎服。

**療效：**達90%以上

(市人民醫院中醫科)

方藥：焦山查 生山查 炒車前子 生車前子(各等分)

制法：为細末

用法：每服三錢、开水冲服。

(古楼区联合医院)

方藥：馬鞭草兩 炙槐花三錢 生熟山查各三錢

服法：水煎服

療效：100%

附註：舌苔厚膩、加蒼朮黃柏。

(联工医院中医科)  
馭

方藥：木香散： 广木香 白芍 厚朴 龍骨 当归  
干姜 (各等分) 姜棗引

制法：濃煎去渣入訶子粉(計按上藥量的三分之一)收羔待干後製成粉備用。

服法：成人每服一錢，三歲以上5—7分 1—2歲 1—5分

療效：95%以上

(龙亭区联合医院)

主治：紅白痢疾及阿米巴痢疾

方藥：椿根皮四兩(去粗皮) 菘豆芽(去头去尾)四兩  
紅糖四兩

制法：共搗为汁、用新白布(开水先溼)，將藥包好搾汁，各服。

服法：每日早晚各服一次每次服一酒盃。

療效：98%以上。

(龍亭区联合医院)



主治：赤痢（阿米巴）

方药：馬齿莧六錢 白槿花五錢

用法：水煎服

療效：90%以上。

（省淮河医院中医科）

主治：赤痢（阿米巴）

方药：椿根白皮四兩 川連二錢 广木香二錢

制法：为細末蜜丸、每丸兩錢。

用法：每日早晚各服一九

療效：95%以上。

（省淮河医院中医科）

主治：阿米巴及細菌性痢疾

方药：白头翁五錢

用法：水煎服

療效：在我院患者凌化祥、男、20歲，王德祥、男20，等十餘例均服此药迅速治癒。

（市职工医院中医科）

主治：赤痢（阿米巴）及一般頑固性痢疾

方药：鴉旦子二兩（去壳）

制法：將鴉旦子仁研为泥狀加入适量蜂蜜加~~水~~溶化~~成~~蒸~~干~~为丸，菘豆大，硃砂为衣。

服法：成人服15粒，小孩服二九一五丸，开水送下。

療效：98%以上。

（龍亭区联合医院）