

欽定四庫全書

子部

續名醫類案卷

四十九
五十



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

續名醫類案朱

齊治通

腫痛

錢塘魏之琇撰

足太陽經生癰堅硬

無力羌活黃柏各二

七分甘草蒼朮陳皮

五分酒二大盞水一大

盞煎至一盞去渣熱服空心以夾被蓋覆其癰使藥行罷去之一服愈

予族叔父平生多慮質弱神勞年近五十忽右膊外側臙上生結核身微寒熱而易怒食味頗厚脉之俱弦大浮數而重似澁曰此多慮而憂傷血時在初秋勿輕視之宜急補以防變症以人參一斤作膏下以竹瀝病者吝費招一外科以十宣五香散間與服旬日後一日大風拔木病者發熱神思不佳急召視之核

稍高大似有膿于中起一紅線延過肩後斜走遠背脊過入右脇下不痛覺肩背重而急迫食有嘔意脉同前但弦多耳作人參膏入芎朮生薑汁飲之用人參三斤瘡潰膿乾又與四物湯加參朮陳皮甘草半夏生薑百餘帖而安此等若在春令雖神仙不治也幸而在秋金之令不幸因時下暴風激起木中相火而致此自非參膏驟補何由得免

朱郎年四十餘惡寒發熱右腿內腠厥陰分生一腫毒

此是冷折熱在肺經血分與此方薑仁黃藥子赤芍
歸頭條芩各三錢青皮角刺桂枝各二錢甘草節一
錢分四帖煎取一盞入忍冬藤汁二蛤殼食前飲以
忍冬藤查傳腫上

呂孺人惡寒發熱腹上有小疽此血少有熱與此方白
朮川芎各三錢赤芍連翹各二錢半陳皮防風黃芩
各二錢木通錢半甘草五分分五帖煎服

鄭經歷性嗜酒與煎燂年五十餘忽春末夏初患額上

作痛涌出一角長短大小如雞距稍堅求治曰此非
膏粱所致而何宜斷厚味先解食毒針灸以開泄壅
滯未易治也此少陽經所過氣多血少者鄭以憚煩
召他醫以大黄朴硝腦子等冷藥罨之一夕豁開如
醬蚘徑三寸一二日後血自蚘中濺出高數尺而死
此冷藥外逼熱鬱不得發宜其發之暴如此也
陳自明外科精要云神仙截法治癰疽發背一切惡瘡
預服則毒氣不入內真麻油一斤銀石器內熬十數

沸候冷用酒兩碗入油五盞通口熱服一日用盡緩則數日服之吳安世云吾家三世用之無有不驗又聞獵者云凡中藥箭急飲麻油藥毒即消鄭學諭德甫屢用之甚驗

薛立齋治一男子患癰腫硬疼痛發熱煩躁飲冷脉沈實大便秘乃邪在臟也用內疎黃連湯疎通之以絕其源先投一劑候行一次勢退一二再進一劑諸症悉退乃用黃連消毒散四劑而消

一男子膿熟不潰欲針之補以托裡不信乃服攻毒藥反致惡心少食始悟而用針更以六君子湯加藿香當歸四劑少可再加以加味十全大補湯數劑而斂凡瘡膿熟不行針刺膿毒侵蝕輕者難療重者不治老弱之人或偏僻之處及緊要之所若一有膿宜急針之更以托裡庶幾無變

一男子患毒作痛服寒涼藥痛雖止而食愈少瘡亦不潰以六君子湯而食進再以托裡藥潰之而愈大抵

瘡疽之症寒熱虛實皆能作痛熱毒之痛者以寒涼之劑折之寒邪之痛者以溫熱之劑散之因風而痛者除其風因濕而痛者導其濕燥而痛者潤之塞而痛者通之虛而痛者補之實而痛者瀉之膿鬱而閉者開之惡肉侵蝕者去之陰陽不和者調之經絡閉澁者利之慎勿槩用寒涼之藥況血脉喜濕而惡寒若冷氣入裡血即凝滯反為難瘥矣

馮楚瞻治趙翁年七十二右頰腫硬連及頤項耳後一

片堅實不熱不痛已兩月餘諸治不效漸至口內出
膿牙噤不開飲食少進精神日衰脉則洪大而空知
血氣大虧陰寒所聚所謂石疽是也不得陽和何以
外解若內潰日久穿喉破頰不可療矣乃用猪脂擣
爛入肉桂細末葱頭食鹽杵勻厚敷患處敷藥可法以脂
膏治血肉同氣相應也葱能透竅鹽能軟堅桂能行
血油能浸潤皮膚內則空心生脉飲送八味丸食遠
以參芪歸芍苓朮薄桂銀花角刺之類使陽回則陰

寒自解血氣冲和自能逐毒三五日後水硬者熱軟
漫腫者高聳木者疼痛紫者紅活飲食日進血氣漸
長毒既外出久凝久瘀之血肉消者消膿者膿不再
旬而愈

張景岳治一儒者年近三旬素病耳發必潰膿至是益
甚自耳根下連頸項上連頭角耳前後莫不腫痛或
與散風降火一月後稠膿鮮血自耳迭出每二三日
必出鍾許而腫痛全不消枕不可近察其形色已大

不足而腫痛則若有餘脉之或急或緩弱此非實熱
可知遂先與六味湯二三劑元氣稍振繼與一陰煎
加牛蒡茯苓澤瀉倍加白茯苓為君服五十餘劑外
用降癰散晝夜敷治兩月而後愈蓋此症雖似潰瘍
有餘而實以肝腎不足上實下虛一奇症也

何奇之有

張通府耳後髮際患腫一塊無頭肉色不變按之微痛
彼以為痰結診其脉軟而時見數經云脉數不時見
則生瘡也非痰結仲景云微弱之脉主血氣俱虛形

精不足又云沉遲軟弱皆宜托裡遂以人參白朮黃
芪當歸川芎炙艸以托裡少加金銀花白芷桔梗以
消毒彼謂不然內飲降火化痰外貼涼藥覺寒徹腦
患處大熱頭愈重飲食愈少復請治以四君子湯加
藿香炮乾薑數劑飲食漸進膿成刺之更以十全大
補湯去桂及炙以豆豉餅又月餘而愈

胡生耳後寸餘發一毒名曰銳疽焮痛寒熱煩躁喜冷
此膽經蘊熱而然先用神仙活命飲一劑勢減二三

時值仲冬彼惑于藥有用寒遠寒之禁故不再服自
用十宣散托裡之藥勢漸熾耳內膿潰復請治視其
喉腫閉藥不能下而歿

一婦人年逾四十近環跳穴生一毒尺脉沉緊腿不能
伸經曰脾寒移于肝癰腫筋攣夫脾主肉肝主筋肉
溫則筋舒肉冷則筋急遂與乳香定痛丸治之少愈
更以助胃壯氣血藥二十餘劑而削

一婦人脩傷次指成膿不潰焮痛至手誤敷涼藥以致

通炊微嘔少食彼以為毒氣內攻診其脉沉細此痛傷胃氣而然也遂刺之服六君子湯加藿香當歸食進更服八珍湯加黃芪白芷桔梗月餘而愈一後生亦患此色黑不痛其指已死欲令斬去速服補劑恐黑上臂不治彼不信另服敗毒藥手竟黑遂不救一男子亦傷拇指色紫不痛服托裡藥及灸五十餘壯作痛潰膿而愈吳舉人幼女因凍傷兩足至春發潰指俱壞遂去之服以大補藥而愈藍上舍女患嵌

甲傷指年餘不愈日出膿數滴謂足大指乃肝脾二經發源之所宜灸患處使瘀肉去陽氣至瘡口自合否則不治彼忽之不早治後變勞症而歿蓋至陰之下血氣難到若女人患此又多因扎縛致血脉不通或被風邪所襲則無氣血榮養遂成死肉惟當壯其脾胃行其經絡生其血氣則愈其有成破傷風以致牙關緊急口眼喎邪者先以玉真散一二服然後投以通經生血之劑