

清代名醫醫案大全

(一)

陸淵雷校閱



正文書局印行

清代名醫醫案大全

陸淵雷校閱

(一)

馬元儀先生

馬元儀。蘇州人。所著有馬師津梁八卷。是編前有雍正壬子汪濂夫序。稱元儀受學於雲間李士材。西昌喻嘉言。二人皆國初人。則元儀著書。當在康熙初矣。見四庫提要。

清代名醫醫案大全總目錄

清

葉天士醫案

馬元儀醫案

薛生白醫案

尤在涇醫案

吳鞠通醫案

曹仁伯醫案

張千里醫案

王旭高醫案

趙海仙醫案

張仲華醫案

王九峯醫案

馬培之醫案

陳蓮舫醫案

曹滄洲醫案

張聿青醫案

金子久醫案

丁甘仁醫案

附錄

上海國醫學院醫案講義

現代藥物用量表

附藥性及
功能索引

清代名醫醫案大全

第一冊

目次

葉天士醫案

馬元儀醫案

薛生白醫案

馬元儀醫案目錄

傷寒	一
瘧疾	八
痢疾	九
欬嗽	四
喘急	三
痺痛拘攣	二
鬱勞隔塞	六
胎前	三
產後	三
經帶	六

馬元儀醫案

武進徐衡之編纂
嘉定姚若琴

皖南建德後學周學海評注

傷寒

傷寒六日。兩脈微弱。面垢遺尿。自汗譫語。身重不能轉側。此三陽合病。

也。汗下兩不可用。發汗則偏於陽而津液傷。攻下則偏於陰而真氣損。惟有

白虎一法。主解熱而不礙表裏。誠爲善法。但三陽病。脈當浮大。今微弱不起。

以邪熱抑遏。不得外達。非陽衰脈微之比。待清其壅。則脈自起耳。合難曰三陽明氣實。太陽氣虛。專用白虎。究未甚合。論脈有微。張石頑曰。先生爲石頑門人。其學出於東垣。綱讀此書。理治。論脈有微。張石頑曰。先生可救。雖主三陽合病。有化熱未化熱主之分。設以此熱治傷寒合病。不辨。所謂熱盛即治同溫病矣。

石膏 知母 甘草 粳米

年逾古稀。惡寒發熱。有如瘧狀。遷延月餘。神昏食少。舌胎黑刺。少腹腫痛。上連胸脅。診兩脈弦濇而結。尺中倍弱。此內傷重。外感輕。得之勞倦。且鬱病在肝脾二經也。勢則傷肝。鬱能傷脾。肝脾氣血兩傷。邪氣內結。治宜顧慮元氣。而兼治邪。此津液枯而絡有畜血。宜桂枝加紅花。再入甘涼生津。

人參

桂枝

黃連

肉桂

半夏

泡薑

桂枝

連半

血。

能為功。

服後。神氣清爽。但津液尚枯。虛熱內甚。進以滋燥清熱。

人參

黃連

生首烏

半麴

杏仁

枳實

甘蔗汁

蘆根汁

首烏

生者。

味極苦。

可用以剝肝。

絡之痰。除脅痛。胸滿。生津。非所長也。

發熱七日。神氣昏憤。語言譫妄。按其心胸間。痛不可近。診其脈。左三部虛濇。右關尺微弱無神。此脈不應證。中痛為實。脈微弱為虛。發熱譫語為陽。而脈虛濇為陰。證陽脈陰。證實脈虛。皆為難治。所謂枝葉未害而本實先撥也。當峻補元氣。以俟氣充而邪解。擬桂附理中湯。心胸間痛。是熱痰凝結。痰凝結。是熱痰凝結。是熱痰凝結。

者。亦合脈氣。諸病。故常謂痛脈屬氣。
多弦動。屬痰血。食滯者多瀼弱。

人參 炙草 乾薑 附子 白朮 肉桂
薑桂必脈細聚乃合。亦可。胸痛拒按。屬寒結者。

傷寒數日。面赤躁煩。手足搖擗起臥不安。口燥渴。大便結。診其脈。虛瀼兼結。夫瀼則傷陰。結則氣滯。得之憂思勞鬱。肺胃交傷。津液虧而虛邪結也。治須大劑滋解。

瓜蒌仁 枳殼 秦艽 杜蘇子 半夏 桔梗 杏仁 紫苑茸

傷寒十餘日。胸中滿結。譫語神昏。舌胎黑刺。診脈虛瀼無神。此積勞陰傷。以致邪氣內結。證頗危急。夫胎刺胸滿譫語。種種陽證。至切脈虛爲氣虛。瀼爲陰傷。脈病若出兩途。證陽脈陰。法在不治。生死關頭。用藥未易易也。

瓜蒌仁 桂枝 桔梗 杏仁 枳殼 蘇子 製半夏 淡乾薑
見證俱是津枯血乾。之象。治宜生津行瘀。

方中薑半未合。可改用蒲黃。
仲景瀉心法。乃與苓連並用。

發熱神昏譫語胸滿。舌胎黑刺面色枯瘁。時有喘咳。日晡益甚。此肝木

內鼓。心火上炎。肺金失養。而胃土無滋也。爲定開結滋燥法。

瓜蒌仁 枳殼 桃仁 蘇子 杏仁 半夏 麴蘆根

服後。倦臥片時。神氣頗清。右脈亦透。但濇象不減。重按少神。舌上胎刺。去而復生。雖有轉機。但津液元氣枯竭之極。所恐者。藥之假。不能濟其真水火也。轉用。

人參 生首烏 知母 生地 川連 蘆根

兩劑後。濇象漸減。胸滿頓釋。面色轉澤。眠睡頗安。但舌胎未盡去。中脘以下尙有滯悶。此上焦津液雖回。而中州運化失職也。

前方加 枳實 山查 一劑而中滿釋。轉用 人參 石斛 茯神 棗仁 歸身 白芍 橘紅

貝母 生地 炙草 麥冬 川連 用黃液之癰。而邪得外達。始見治溫熱。始見治溫熱。

服後。周身發疹。表間微熱。此餘邪盡從外達用。

荊芥 大力 乾葛 防風 杏仁 桔梗 前胡 蘇子 薄荷

諸症悉已用

人參 製首烏 白芍 茯苓 紫甲 丹皮 石斛 半麴 甘草

7 發熱半月。神昏錯語。面色青中帶黑。診其脈浮之虛。沉之濇。乃津液元氣兩虧之候。法宜補氣則陰火自斂。養陰則神氣自爽。

人參 熟首烏 枳殼 茯神 廣皮 半麴 桔梗 丹皮

二劑後加 白芍 歸身 川石斛

因偶患風寒。誤投麻黃。汗出不止。語音短怯。神氣不收。面色枯白。時有寒熱。診其脈微濇而虛。虛則氣少。濇則陰傷。此元氣津液兩傷之候也。蓋麻黃辛溫。爲發汗重劑。不當用而用之。不特劫其津液外亡。并元氣亦從之內脫。以胃中元氣。卽寄養於津液之中也。神失不收者。汗爲心之液。心者神之宅。汗多則并傷其臟。而神爲之不收矣。時有寒熱者。氣入而陽往乘陰。陰虛不勝。則熱。頃之氣出。而陰復乘陽。陽虛不勝。則寒。陰陽兩不足。則更實更虛。

而不循尺度也。今之治法，當陰陽兩補。

人參 茯苓 製首烏 炙草 廣皮 半麴 白芍 丹皮

發熱惡寒。口渴胸滿。身疼中痛。晝夜煩躁。診得兩脈虛濇。此積勞積鬱積虛之候。勞則虛其中。鬱則傷其上。虛則衰其下。由是風寒之邪乘虛內陷。乃生寒邪。邪氣既張。正氣愈虛。血不得榮。面色則黑。以陰氣素虧。則爲口渴煩躁。以中氣素虧。則爲胸滿中痛。晝夜不寧。夫邪因氣入者。非解鬱則風不出。邪因虛陷者。非補虛則邪不達。治法先滋其上。次和其中。次補其虛。轉機用法。斯爲善治。

法是疏表而裏氣自降。

三法次第。亦難板分。觀後方可知。胸滿已見。裏證中。

瓜蒌實 泡薑 枳殼 桂枝 桔梗 半夏 杏仁 蘇子 從小陷胸諸瀉

服後寒熱稍減。胸滿稍釋。而中痛未已。轉用

人參 桂枝 淡薑 川連 枳實 厚樸 半夏 炙草 以此治中痛。

服後諸症悉退。惟大便秘結不行。此勞鬱所傷。下中二焦之氣。漸次安和。而下焦積虧之陰未復也。

人參 秦艽 杏仁 製首烏 蘇子 廣皮 枳殼 半糖 方不是復下焦之陰。河也。

發熱惡寒。頭身俱痛。口中燥渴。時自譫語。兩脈洪數而滿。此是外感。而病勢轉危者。以五志過極。陰氣素虧。邪復乘之。重傷其陰。而火熱愈甚也。用解肌湯。

服一劑。惡寒得已。發熱未除。譫語轉增。神魂飛越。是陰虛陽亢。法當養肝之陰。

生地 知母 甘草 茯神 丹參 貝母 花粉

傷寒四五日。兩脈微虛。神氣昏亂。躁煩不寧。時欲得水。復置不飲。棄衣而走。勇力倍於平時。言語狂妄。不避親疎。知爲羣陰格陽。欲脫外顯假熱。內伏真寒也。人參理中湯。納下於上。當宜用人參。且此印機草乃理中。生手能

方訂之。無變化。○竊怪案多雷同。○

傷寒。下利。吐逆煩躁。手足厥冷。脈微欲絕。此腎中真陽素虧。外邪入之。內寒與外寒相合。由是陰氣上逆而爲吐。下逆而爲利。陽氣外越則煩躁。內鬱則肢寒也。仲景云。少陰病吐利煩躁。四逆者死。正以吐利並見。陰氣之上攻下徹已極。加以煩躁四逆。虛陽不能主事。其爲中州氣敗可知。軀殼之中。有陰氣。無陽氣。物其能長乎。不得已。用白通湯。仗通脈救陽之力。以冀挽回。若得脈微續。則生之機也。

葱白 乾薑 附子

頭痛發熱。口乾便秘。不得安臥。此邪風外熾。實熱內燔。表裏邪結之候。當上下分消其勢。表裏交治其邪。斯汗不傷表。下不傷裏。

○與治。○當甘寒清裏。○而表自通也。○

防風 荊芥 薄荷 大黃 芒硝 山梔 石膏 桔梗 滑石 黃芩 連翹 方有本領。○

即有本領。○

散也

發熱中痛。譫語神昏。右寸獨鼓。餘脈虛濡。此元氣積虧。津液枯槁。虛邪爲之內結。得之悒鬱勞倦所傷也。於此而補虛則熱不除。治邪則虛不任。庶幾先固根蒂。佐以治邪。可圖萬一。

人參 桂枝 黃連 乾薑 枳實 厚樸 半夏 炙草

服後神氣清爽。津液未回。當卽從事於陰。

人參 生首烏 川連 白朮 橘紅 半夏 梨肉汁 蔗漿 蘆根汁

發熱惡寒。口燥煩渴。胸滿中痛。兩脈虛微。此真陽大虧。虛邪入客。若無煩渴等症。但需溫藥。今陽病適當陰虛。治陽之中。不得不顧慮其陰。爲權衡於其際。而得一法。滋陰之燥。毋使擾陽。養陽之虛。不使賊陰。

瓜蒌仁 淡乾薑 桂枝 枳殼 半夏

服後口燥已煩渴解。此陰氣得滋之驗。可從事於陽。

人參 桂枝 淡薑 川連 肉桂 厚樸 炙草 枳實 方案均與前同。假此重覆。並存無謂。

寒熱數日。中痛嘔逆。胸滿身疼。左脈弦濇。右關尺虛微。此中氣虛寒陰道長而陽道消。是以胸中之陽。不化而爲滿。胃中之陽。不布而爲嘔。衛外之陽。不固而爲痛。夫陽微之處。卽陰盛之處。而陽微之故。則由於胃氣虛損而生發之令不行也。當行溫補之法。

人參 白朮 茯苓 炙草 肉桂 川連 附子

發熱喘急。頭痛下引胸脅。晝夜不安。面赤不渴。二便如常。左脈弦虛。右脈空大。此無形之感。挾有形之痰。表裏合邪。互結於胸脅之位也。口不渴者。外邪挾飲上逆。不待飲水自救也。二便調者。病在胸脅。猶未擾亂中州也。仲景治傷寒。表不解。心下有水氣。欬而微喘發熱不渴。小青龍湯主之。今倣此治。

傷寒六七日。譫語狂妄。不知人事。時自喘嗽。兩脈微弦。按之則濇。此邪