

張金匱要略論註卷十八

馮李徐

彬忠可甫著

釋用可父敬

瘡癰腸癰浸淫病脉證并治第十八

論一首
方六首
脉證三條

諸浮數脉應當發熱而反洒淅惡寒若有痛處當發其癰師曰諸癰腫欲知有膿無膿以手掩腫上熱者為有膿不熱者為無膿

註曰諸瘡癰之發初時有類外感然察其證則與



表脉相反故浮數本爲風熱之脉風熱卽應發熱而反洒淅惡寒且有痛處明是內有壅結之毒致衛氣爲內熱所搏不行于表而外反洒淅惡寒自當發散結氣則癰自若既有癰腫不熱則膿未成然則毒聚故以手掩腫處熱爲膿不熱無膿然不出方癰者壅也通其壅則愈故以一發字盡之肺癰之爲病其身甲錯復皮急按之濡如腫狀腹無積聚身無熱脉數此爲腸內有癰薏苡附子敗醬散王

王之

論瘡癰乃榮氣熱腑引表間病而爲
陽○癰乃腸胃之病似宜裏腹痛而不及外不知癰
乃○血○脉○間○病○腸○爲○陽○明○陽○明○主○一○身○肌○肉○故○必○其○
身○甲○錯○甲○錯○者○如○鱗○也○此金匱凡三言甲錯肺癰
曰○胸○中○甲○錯○肺○雖○主○周○身○之○氣○不○主○周○身○之○血○唯
胸○中○爲○肺○之○府○熱○過○于○榮○傷○其○血○脉○故○甲○錯○又○五
勞○有○乾○血○曰○肌○膚○甲○錯○蓋○乾○血○者○敗○血○也○敗○血○傷
血○况○乾○血○所○片○非○腸○則○胃○俱○屬○陽○明○故○亦○主○肌○膚

甲錯但勞病必先傷陰故多兩目黯黑腸癰之病
毒在腸腸屬陽明陽明主肌肉故其身甲錯腹爲
腸之府故腹皮急毒熱之氣上鼓也氣非有形故
按之濡然皮之急雖如腫狀而實無積聚也病不
在表故身無熱熱雖無而脉數癰爲血病脉主血
也故曰此爲腸癰薏苡寒能除熱兼下氣勝濕利
腸胃破毒腫故以爲君○取醬善排膿破血利結熱
毒氣故以爲臣○附子導熱行結故爲反佐

薏苡附子敗醬散方

薏苡仁

十分

附子

二分

敗醬

五分卽

苦菜

右三味杵爲末

方寸匕以水二升煎減半頓服

小便當下

腫癰者少腹腫痛按之卽痛如淋小便自調時時發

熱自汗出復惡寒其脉遲緊者膿未成可下之當有

血脉洪數者膿已成不可下也大黃牡丹皮湯主之

註曰腫癰者最苦在腫不此腸癰之腹皮急故卽

以腫名之少腹痞者內實而不濡也按之卽痛有

形之血爲病故也如淋者血分熱則不通快血分

形之血爲病故也如淋者血分熱則不通快血分

病而氣不病故小便仍自調然少腹雖主下焦而
不見膀胱與腎之證正內經所謂開闔不得寒氣
從之陷脉爲癰也但彼腸癰熱毒留腹中故身無
熱此獨時時發熱者乃陽經榮熱故潮熱自汗唯
熱結在下外熱內寒故復惡寒但脉遲緊是血未
盡敗脉未變熱故遲滯而緊歛知其膿未成可下
其毒氣毒氣已在血之近下者故常有血若脉洪
數則毒熱之氣滿不收是膿已成必須從皮肉
間拭去有形之敗濁不可內消故曰不可下大黃

下取殺熱毒
膿已成反不
可下正氣已
虛下之無益
也

牡丹湯乃下方也。牡丹桃仁瀉其血絡。大黃芒硝下其結熱。冬瓜子下氣散熱。善理陽明而復其正氣。然此方雖為下藥。實內消藥也。故稍有膿則從下去。無膿即下出血之已。被毒者而腫消矣。

黃牡丹湯方

大黃

四兩

牡丹

一兩

桃仁

五十

瓜子

半升即
冬瓜子

芒硝

三合

右五味以水六升。煮取一升。去滓。內芒硝再煎沸。頓服之。有膿當下。如無膿當下血。

問曰寸口脉浮微而澀法當亡血若汗出設不汗出者云何曰若身有瘡被刀斧所傷亡血故也

許曰此條乃詳應汗出而不汗出之故謂寸口爲陽浮似陽盛然微則爲陽微是浮乃火盛非陽盛也浮微而澀血虧陰熱陰熱則血爲火搏津爲熱脫故當亡血若汗出乃有見是脉而汗反不出故疑浮非因亡血觀其身有瘡痕知爲刀斧所傷則先已亡血也血奪者無汗故汗不出耳不出方者重在辨脉與汗不主論治也

病金瘡。不留行散主之。

註曰。此非上文傷久無汗之金瘡方。乃藥治金瘡方也。故曰。病金瘡。王不留行散主之。蓋王不留行。性苦平。能通利血脉。故反能止金瘡血。逐痛。薊。薤。亦通利氣血。尤善開痺。周身肌肉。肺主之。桑根白皮。最利肺氣。東南根。向陽。生氣尤全。以復肌肉之主氣。故以此三物甚多。爲君。甘草。解毒和榮。尤多。爲臣。椒。薑。以養其胸中之陽。厚朴。以疏其內結之氣。芩。芍。以清其陰分之熱。爲佐。若有風寒。此屬經

絡客邪桑皮止利肺氣不能逐外邪故勿取

王不留行散方

王不留行

十分八月

蒴藿細葉

十分七月

桑東南根

自皮十分三日採

甘草

十八分

黃芩

二分

川椒

三分除目及閉口去汙

厚朴

二分

乾薑

二分

芍藥

二分

右九味桑皮以上三味鑊

炙令灰過各別

作篩合治之爲散服方寸

匕小匙卽粉之大瘡但

張之產後亦可服如風寒

桑椹穰勿取之前三物

皆
陰乾百日

排膿散方

註曰雞子黃芍藥以和氣枳實合桔梗以通達

周身之氣則膿自行也人知枳實能下內氣豈知

合桔梗則能利周身之氣而排膿耶

枳實十六枚芍藥六分桔梗二分

右三味杵為散取雞子黃一枚以藥散與雞黃相

等揉和令相得飲和服之日一服

排膿湯方

或以桑皮赤芍為消毒之主謂周身之氣肺主之肺氣暢而毒自消可悟此二藥之意

註曰甘桔以開提肺氣。薑棗以和中上焦之榮衛。使內氣通利而膿不凝也。已上兩方乃為瘡癰不能散者。緊治之方。不獨為腸癰腫癰設也。

甘草

二兩

桔梗

三兩

生薑

一兩

大棗

十枚

右四味以水三升煮取一升溫服五合日再服

浸淫瘡從口流向四肢者可治從四肢流內身者不可治浸淫瘡黃連粉主之

方未見

註曰浸淫瘡者瘡之浸淫不已雖屬肌肉之病實隨臟腑為流轉者也故前仲景引為自臟入腑自

張仲景金匱要畧論註卷十九

樵李徐

彬忠可甫著

孫

善敬可父較

跌蹶手指臂腫轉筋狐疝蛇蟲病脉證治第十

九

論一首
方五首

脉證一條

師曰病跌蹶其人但能前不能卻刺腓入二寸此太陽經傷也

註曰人身陽明脉絡在前太陽脉絡在後故陽明氣旺無病則能前步太陽氣旺無病則能後移今

傾跌之後致蹶而不能如平人。能前步不能後却。必須刺臑腸入二寸者。蓋臑腸者太陽脉之所過。邪聚于太陽脉之合陽承筋間。故必刺而瀉之。謂傷止在太陽經也。然太陽經甚多。而必刺臑腸者。蓋臑腸卽小腿肚。本屬陽明。太陽脉過此。故刺之。使太陽與陽明之氣相通。則前後如意耳。

病人常以手指臂腫動。此人身

體瞶瞶者。藜蘆甘草

湯主之。方未見

註曰。人身四肢屬脾。然肌肉之氣統于陽明。但足

屬足陽明手屬手陽明若手指臂常腫動乃手陽
明有痰氣壅閉更身體瞢瞢是肌肉間陽明之氣
不運而肌肉腫動也藜蘆能吐風痰甘草能安中
氣故王全方未見故闕

轉筋之爲病其人臂脚直脉上下行微弦轉筋入腹
者難尿白散主之

註曰轉筋之病大槩是土不能安木至于臂脚直
則風淫于脾矣脉上下行微弦是有瘞之意仲景
云夫瘞家脉伏堅直上下又口脉伏而弦總是風

入之象此更轉筋入腹則是肝邪直攻脾臟此時
如賊犯王城無暇緩治故以雞屎白之下氣消積
捷于去風安脾者先靖其內亂而後徐圖安輯耳

雞屎白散方

雞屎白爲散取方寸七以水六合和溫服

陰狐疝氣者偏有小大時時上下蜘蛛散主之

註曰痛連少腹皆謂之疝古有心疝肝疝等名

此名狐疝者因其獨見于外腎偏有小大而又上

下不時故特名陰狐氣以狀其病之陰陽閃爍而

不定也。藥用蜘蛛散。蜘蛛。環有攻毒之能。而仙絲結。痛皆在少腹。故用為向導。而加桂枝。以伐腎邪。使陽道行。則陰氣自消也。

蜘蛛散方

蜘蛛 十四枚 熬焦

桂枝 半兩

右二味為散。取八分。一匕飲和服。日再服。蜜丸亦可。

問曰。病腹痛有蟲。其脉何以別之。師曰。腹中痛。其脈當沉若弦。反洪大。故有蛇蟲。