

痺 痿 驚 悸 恐 健 忘

不得臥 不能食 汗 黃疸

霍亂 嘔吐 噦

醫宗必讀



雲間李中梓士材父著

門人

莊昇初陽父
陸光起永白父
顧行雲路父
張大啟魯開父
蔣起鳳孟蘊父
李廷傑佐之父
范恒如九如父
徐化鰲神諸父

全黎

痺

行痺

痛痺

着痺

內經曰風寒溼三氣雜至合而為痺也

痺者閉也風寒溼三氣雜合則壅閉經絡血

不行則

其風氣勝者為行痺

風者善行而數變故為行痺

為痺也

寒氣勝者為痛痺

寒氣凝結陽氣不行故痛溼

是也

着痺肢體重着不移或為疼痛或為不仁溼

以冬

從上化病多發于肌肉俗名麻木是也

痺以春遇此者為筋痺以夏遇此者為脉痺以至

肌痺以秋遇此者為皮痺

凡風寒濕所為行痺痛痺所遇之時所客之處而命

痺痛痺著痺之外別有骨

痺筋痺脉痺肌痺皮痺也骨痺不已復感于邪內舍于

不已復感于邪內舍于肝脉痺不已復感于邪內舍于心

不已復感于邪內舍于脾皮痺不已復感于邪內舍于肺各以

其時重感于風寒溼也

舍者邪入而居之也時者氣王之時五藏各有所應也病久不去而復感于邪

氣必更深故內舍

肺痺者煩滿喘而嘔

肺在上焦其脉循胃口故為煩滿喘而嘔也

心痺者脉不通煩則心下鼓暴上氣而喘噤乾善噫厥氣上則

恐

心合脉而痺氣居之故脉不通心脉起于心中其支者上挾咽其直者却上肺故其病如此厥氣陰氣也心火衰則邪乘

之故神

肝痺者夜臥則驚多飲數小便上為引如懷

肝藏魂肝氣痺則驚

不安故夜臥則驚肝脉下者通陰器抵少復

腎痺者善脹尻以

腎脉入跟中上膈內出臍脾痺者四支解情發欬嘔汁上為大

寒脾主四支故為解情其脉屬脾絡胃上為挾咽氣痺腸痺者

數飲而出不得中氣喘爭時發殮泄陽者兼大小腸而言腸間

雖數飲而小便不得出小便不出則本未俱病胞痺者少腹膀胱

膀胱之內痛若沃以湯澀於小便上為清涕胞者膀胱之浮也膀胱氣閉故按之

內痛水閉則畜而為熱故若沃以湯澀于小便也膀胱之脉從顛入絡腦故上為清涕

愚按內經論痺四時之令皆能為邪五藏之氣各能受病六

之中風寒溼居其半即其口雜至曰合則知非偏受一

致痺又曰風勝為行痺寒勝為痛痺溼勝為著痺即甘

字則知但分邪有輕重未嘗非三氣雜合為病也

各有五藏之合初病在外久而不去則各因其合

在外者祛之猶易八藏者攻之實難治外者散邪爲

養正爲先治行痺者散風爲主禦寒利溼仍不可廢大

補血之劑蓋治風先治血血行風自滅也治痛痺者散寒爲

疎風燥溼仍不可缺大抵參以補火之劑非大辛大溫不能釋

其凝寒之害也治着痺者利溼爲主祛風解寒亦不可缺大抵

參以補脾補氣之劑蓋土強可以勝溼而氣足自無頑麻也提

其大綱約畧如此分條治法別列于左

筋痺卽風痺也游行不定上下左右隨其虛邪與血氣相搏聚

于關節或赤或腫筋脉弛縱古稱走注今名流火防風湯主之如意通聖散

桂心散沒藥散虎骨丸十生脉痺卽熱痺也藏府移熱復遇外

升麻湯

肌痺即着痺溼痺也留而不移汗多四肢緩弱皮膚不

仁精神昏塞名麻木

神效黃耆湯主之

皮痺者邪在皮膚癢癢風瘡

搔之不痛

宜疎風養血

骨痺即寒痺痛痺也痛苦切心四肢攣急關

節浮腫

五積散主之

腸痺者

五苓散加桑皮不通麥門冬

胞痺者

腎着湯腎瀝湯

五藏痺

五痺湯肝痺加棗仁柴胡心痺加遠志茯神麥門冬犀角脾痺加厚朴枳實砂仁神麴肺痺加半夏紫苑杏仁麻黃腎痺加獨

活宮桂杜仲牛膝黃耆草薢

脉侯

大而瀼為痺

脈急亦為痺

肺脉微為肺痺

心

微為心痺

右寸沉而遲瀼為皮痺

左寸結不流利

右關脉舉按皆無力而瀼為肉痺

左關弦緊而

力為筋痺

文學陸文湖兩足麻木自服活血之劑不效改服攻

不效經半載後兩手亦麻左脇下有尺許不知痛癢余

所謂著痺也六脉大而無力氣血皆損用神效黃耆湯加扶

白朮當歸地黃十劑後小有效更用十全大補五十餘劑始安

孝廉王春卿久患流火靡藥弗嘗病勢日迫商之余曰尚可療

否余曰經年之病且痛傷元氣非大補氣血不可春卿曰數月

前曾服參少許癰勢大作故不敢用余曰病有新久之不同今

大虛矣而日從事于散風清火清火則脾必散散風則肺必傷

言是甚力竟不能決遂致不起塩賈葉作舟遍體疼痛尻髀皆

言是甚力竟不能決遂致不起塩賈葉作舟遍體疼痛尻髀皆

防風湯

防風

當歸

酒洗

赤茯苓

去皮

杏仁

去皮尖

黃芩

秦艽

葛根

各二錢

羌活

八分

桂枝

甘草

各五分

水二鍾薑三片煎七分入好酒半鍾食遠服

如意通聖散

治走注疼痛

當歸

去蘆

陳皮

去白

麻黃

去節

甘草

炙

川芎

御米殼

去頂

丁香

各等分

右用慢火炒令黃色每服五錢水二鍾煎一鍾服

痛加虎骨乳香沒藥心痛加乳香良薑此治痺痛

桂心散

桂心

漏蘆

威靈仙

芎藭

當歸

去蘆

木香

白殭蠶

地龍

炒土各半

右為細末每服二錢溫酒下

沒藥散

治遍身百節走注疼痛

沒藥

二兩另研

虎骨

四兩醋炙

右為細末每服五錢酒下日再服

小烏犀丸

烏犀角

乾蝎

炒

白殭蠶

炒

地龍

去土

硃砂

水飛

天麻

煨

羌活

去蘆

芎藭

防風

去蘆

甘菊花

去蒂

蔓荊子

各兩

乾薑

炮

麝香

另研

半黃

各半兩另研

虎脰骨

去鱗

醋炙

付子

敗龜

每兩皮

白花蛇

酒浸

天南星

薑炙

肉桂

去皮

付子

每兩皮

木香

人參

去蘆

當歸

虎骨丸

虎骨

四兩 醋炙

五靈脂

醋淘 去沙

白殭蠶

炒

地龍

去土 炒

白膠香

另研

威靈仙

各一兩

川烏頭

二兩 炮

胡桃肉

二兩半 去衣研

為末酒糊丸梧子大每服十九空心酒下日二服

十生丹

天麻

防風

去蘆

羌活

去蘆

獨活

去蘆

川烏

草烏

去蘆

何首烏

當歸

去蘆

川芎

海桐皮

分俱生用

蜜丸每丸重一錢每服一丸茶湯磨服

一粒金丹

草烏頭

剉炒

五靈脂

各一兩

地龍

去土 炒

木鱉子

白膠脊

另研一兩

當歸

去蘆各一兩

麝香

另研一錢

右為細木糯米糊丸桐子大每服三丸溫酒下服

乳香應効丸

乳香

另研半兩

五靈脂

赤石脂

各一兩

草烏頭

一兩

沒藥

半炒

另研右為末醋糊丸雞豆大每服十五丸空心溫酒送下日服二

升麻湯

升麻

三錢

扶神

去皮木

人參

防風

犀角

鎊

麝香

半錢

羌活

各一錢

官桂

三分

水二鍾煎八

分入竹瀝半酒鍾服

神效黃耆湯

黃耆

二錢

人參

去蘆

白芍藥

炙甘草

各一錢

蔓荆子

陳皮

水二鍾煎

一鍾去渣臨卧服小更

人參益氣湯

治夏月麻木倦怠嗜汗

黃耆 八錢

人參

生甘草 各五錢

炙甘草 二錢

五味 百二十粒

升麻 二錢

柴胡 二錢

芍藥 三錢

每服半兩水二鍾煎一

鍾空心服服後眠穩于麻痺處按摩屈伸午前又一服

第二次藥

魚腥草

黃耆 八錢

紅花 五分

陳皮 一錢

澤瀉 五分

第三次服藥

黃耆 六錢

黃藥 一錢

陳皮 三錢

澤瀉

升麻 各二錢

白芍藥 五錢

甘草 四錢

五味子 一百粒

生黃芩 八錢

炙甘草

分四服煎服如前法秋去五味子冬去黃芩

此大

五積散

治感冒寒邪頭疼身痛寒痺六痛無問內傷生冷外感寒邪皆效

白芷

茯苓

半夏 湯洗七次

當歸

甘草炙

肉桂

芍藥

各三兩

枳殼

去穢炒

陳皮

去白各六兩

桔梗

去蘆十二兩

厚朴

去麁皮薑製

乾薑

各四兩

二十四兩

每服四錢水一鍾

薑三片葱白三根煎七分氣如吳茱萸黃調經催產用

五苓散

見泄瀉

腎着湯

見腰

腎瀝湯

麥門冬

去心

五加皮

犀角

各二錢半

杜仲

薑汁炒

去絲

桔梗

赤芍藥

煨

木通

各一錢

桑螵蛸

一個

水

一鍾

八羊腎少許煎八分食前服

五神湯

治玉藏痺

人參

茯苓

當歸

酒洗

白芍藥

煨

川芎

各一錢肝心腎三痺皆倍用之

五味子

十五粒

白朮

一錢

脾倍之

更緩細而不收諸名曰痿

經曰肺熱葉焦則皮毛虛弱急薄著則生痿躄也

肺痿者皮毛痿也蓋熱乘

肺金在內則為葉焦在外則為皮毛虛弱急薄若熱氣留著心不去人而及於筋脉骨肉則病生痿躄躄者是足弱不能行也心

氣熱則下脉厥而上上則下脉虛虛則生脉痿樞折挈脛縱而

不任地也

心痿者脉痿也心熱則火炎故三陰在下之脉亦皆厥逆而上上逆則下虛乃生脉痿者四肢關節之處

如樞紐之折而不能從也肝氣熱則膽泄口苦筋膜乾則筋急足脛縱緩而不能任地也

而攣發為筋痿

肝痿者筋痿也膽附于肝肝熱則膽泄故口苦筋膜受熱則血液乾故拘攣而為筋痿也

氣熱則胃乾而渴肌肉不仁發為肉痿

脾痿者肉痿也脾與胃以膜相連而開竅于

故脾熱則胃乾而渴脾主肌肉熱商于內則精氣耗傷故肌肉不仁發為肉痿

腎氣熱則腰脊

枯而髓減發為骨痿

腎痿者骨痿也腰者腎之府其主骨髓故腎熱則見証若

藏之長也為心之蓋也

此言五藏之痿皆因肺熱故為藏長覆于心上也故為

痿

亡所求不得則發肺鳴則肺熱葉焦

失亡不得而傷肺氣

吸有聲發為肺鳴金藏病則五藏因肺熱葉焦發為

失其清肅之化故熱而葉焦

行營衛為相傳以佈制五藏則一身皆治故五藏之痿皆

氣熱則五藏之陰皆不足此痿躄所以生于肺也五痿

名痿論痿者獨取陽明何也陽明者五藏六府之海主潤宗

宗筋主束骨而利機關也

陽明者胃也上納水穀化精微以資

宗筋宗筋者前陰所聚之筋也為諸筋之會凡腰

脊絡谷之筋皆屬于此故主束骨而利機關也

海也主滲灌絡谷陽明合于宗筋

衝脉為十二經之海故主滲

陰之經夾臍上行陽明脉亦夾臍旁

去中行二寸下行故皆會于宗筋

陰陽總宗筋之會會于氣

街而陽明為之長皆屬于帶脉而絡于督脉

宗筋聚于前陰前

明少陽及衝任督蹻九脉之所會也九者之中陽明為藏府之

海衝為經脉之海此一陰一陽總于其間故曰陰陽總宗筋之

會也會于氣街者氣街為陽明之正脉故陽明獨為之長帶脉

于帶脉支絡于督脉也

痿不用也。則陽明虛則血氣少不能潤養宗筋故弛縱宗筋縱

愚按痿者重疾也故內經疊出諸篇而前哲之集方論者或附

見于虛癆或附見于風溼大失經旨賴丹溪特表而出之惜乎

言之未備也經言病本雖五藏各有而獨重太陰肺經經言治

法雖諸經各調而獨重陽明胃經此其說何居乎肺金體燥居

上而主氣化以行令于一身畏火者也五藏之熱火薰蒸則金

被尅而肺熱葉焦故致疾有五藏之殊而手太陰之地未有不

傷者也胃土體溼居中而受水穀以灌漑于四肢畏木者

經之受邪失正則水無制而傷其所勝故治法有五

足陽明之地未有或遺者也夫既曰肺傷則治之

而岐伯獨取陽明又何也靈樞所謂真氣所受於

而充身陽明虛則五藏無所稟不能行血氣濡筋骨

百體中隨其不得受水穀處不用而為痿不獨取陽明

哉丹溪所以云瀉南方則肺金清而東方不實何胃傷之有

北方則心火降而西方不虛何肺熱之有斯言當矣若胃虛減

食者當以芳香辛溫之劑治之若拘于瀉南之說則胃愈傷矣

藿香養胃湯誠能本此施治其于痿也思過半矣至于七情六淫挾

有多端臨病製方非筆舌所能罄耳

治法 心氣熱則脉痿

鐵粉銀箔黃連苦參龍膽草石蜜牛黃

犀角 肝氣熱則筋痿

龍齒秦龜白蘚皮牡川皮地骨皮雷丸

脾氣熱則肉痿

鮮地黃天門冬百合紫葳白蒺藜杜仲草

脾氣熱則肉痿

鮮地黃天門冬百合紫葳白蒺藜杜仲草