

醫宗必讀

下卷

會成堂詳校醫經必讀卷之七

皇目三才才才才

門人包時化象蕃父參
姪孫李廷芳蘅伯父訂

水腫脹滿

黃帝曰脉之應於寸口如何而脹岐伯曰其脉大堅以濇者脹

也邪盛則大和實則堅濇者氣血虛而不流利也洪大之脉陰氣必衰

為臟陽為腑脉病在陽則脹在腑夫脹者皆在於臟腑之外排

臟腑而郭胸脇脹皮膚故命曰脹胸腹者臟腑之郭也臆中者

心主之宮城也胃者太倉也咽喉小腸者傳送也咽喉傳送者

腸傳送者胃之五竅者胃且門戶也胃氣之所行也是為五竅

問蒼門也且陽里也周禮五家為比五比為閭蓋二十五家也

廉泉玉英者津液之道也二穴俱在脉故五臟六腑者各有畔

界其病各有形狀營氣循脉衛氣逆為脉脹清者為營營行脉中其氣精專未即

致脹濁者為衛衛行脉外其氣慄疾行于分肉之間故必由衛氣之逆而後病及于營則為脉脹衛氣並脉循

分為膚脹衛氣逆而並于脉腹循心脹者煩心短氣卧不安肺

脹者虛滿而喘欬肝脹者脇下滿而痛引小腹脾脹者善噦四

肢煩惋官美惋悶亂也體重不能勝衣卧不安腎脹者腹滿引背央央

然腰髀痛此五臟之脹也胃脹者腹滿胃脘痛鼻聞焦臭妨于食大便

難大腸脹者腸鳴而痛濯濯冬日重感于寒則飧泄不化小腸

脹者少腹脹音脹引腰而痛膀胱脹者少腹滿而氣癰三焦脹

者氣滿于皮膚中輕輕然而不堅膽脹者脇下痛脹口中苦善

太息此六腑之脹也濯濯腸鳴水聲也厥氣在下營衛留止寒

氣逆上真邪相攻兩氣相搏乃合為脹也厥逆之氣自下而上

攻而合為脹也

黃帝曰水與膚脹鼓脹腸覃石瘕石水何以別之岐伯曰水如

起也目窠上微腫如新卧起之狀目下為窠微腫其頸脈動時

效裏水邪乘之故頸脈動水之標在肺故下頸陰皮間寒是

脰腫腫腹乃大其水已成矣以手按其腹隨手而起如裹水之

狀此其候也腫之候也○膚脹者寒氣客於皮膚之間鬱發然

不堅腹大身盡腫皮厚整擊鼓聲也寒氣客于皮膚之間陽氣

故不堅氣無所不至故腹大身盡腫按其腹省而不起腹色不

變此其候也寒氣在膚腠之門按散則不能猝聚故省而不起

腹隨手而起者以其皮厚故腹色不變也○按此上兩條以接其

手而起者亦有宿而不起者未可以起與不起為的辨但當

察皮厚色蒼或一身盡腫或自上而下者多屬氣○鼓脹者腹

脹身皆大大與膚脹等也色蒼黃腹筋起此其候也心腹脹滿

旦食則不能暮食中空無物腹皮細急其象如鼓故名鼓脹其

狀與上文膚脹無異但腹有筋起為別○膚脹屬肺鼓脹屬脾

○腸覃者寒氣客於腸外與衛氣相搏氣不得榮因有所繫癖

而內著惡氣乃起瘕肉乃生覃延布而深也寒氣與衛氣相搏

故癖積起其始生也大如雞卵稍以益大至其成如懷子之狀

久者離歲按之則堅推之則移月事以時下此其候也離歲越歲也寒

邪客于腸外不在胞中故無妨于月事○石瘕生于胞中寒氣

也其非血病可知蓋由汁沫所而生也客于子門子門閉塞氣不得通惡血當瀉不瀉

益大狀如懷子月事不以時下皆生于女子可導而下血凝敗之血也

子門閉塞則血留止其堅如石故曰石瘕可以導血之劑下之也

帝曰其有不從毫毛生病生于內五臟陽以竭也津液充郭其魄獨

居孤精于內氣耗于外形不可與衣相保此四極急而動中是

氣拒于內而形施于外治之奈何氣為陽陽竭則不能通調水

氣而魄藏焉無氣則魄獨居形體腫脹脈不可與衣相保岐伯曰

平治於權衡去菀陳莖微動四極溫衣繆刺其處以復其形開

鬼門潔淨府精以時服五陽以布疎滌五藏故精自生形自盛

骨內相保巨氣乃平權衡陰陽各得其平菀者積也陳者久也

者運動四肢也溫則水氣易行故須溫衣不拘隊穴各曰繆刺

疾理謂之鬼門膀胱謂之淨府開者發汗也潔者滌也

既和陰精時服由是五陽宣布陰水盡滌精血自生形肉自盛

也○岐伯無石水之對必有缺文陰陽別論曰愚按內經之論

陰陽結邪多陰少陽曰石水少腹腫其脈當沉

腫脹五藏六府靡不有之詳考全經如脈要論曰胃脈實則脹

病形篇曰胃病者腹脹本神篇曰脾氣實則腹脹涇漉不利

應象論曰濁氣在上則生腹脹此四條皆實脹也太陰陽明論

曰飲食起居失節入五藏則真滿閑塞師傳篇曰足太陰之別

公孫虛則鼓脹此二條皆虛脹也經脈篇曰胃中寒則脹滿方

宜論曰藏寒生滿病風論曰胃風隔寒不通失衣則腹脹此三

條皆寒脹也。六元正紀至真要等論有云：太陰所至爲胕腫及土鬱之發。太陰之初，氣太陰之勝復皆濕勝之腫脹也。或曰：水運太過，或曰：寒勝則浮，或曰：太陽司天，太陽勝復皆寒勝之腫脹也。或曰：少陰司天，少陰勝復少陽司天，少陽勝復，或曰：熱勝則腫，皆火勝之腫脹也。或曰：厥陰司天在泉，厥陰之復，或曰：陽明之復，脹木邪侮上及金氣反勝之腫脹也。由是則五運六氣亦各有腫脹矣。然經有提其綱者，曰：諸濕腫滿皆屬于脾。又曰：其本在腎，其末在肺，皆聚水也。又曰：腎者胃之關也，關門不利，故聚水而從其類也。可見諸經雖皆有腫脹，無不由于脾肺腎者。蓋脾土主運行，肺金主氣化，腎水主五液，凡五氣所化之液悉屬于腎，五液所行之氣悉屬于肺，轉輸二藏以制水生金者悉屬于脾，故腫脹不外此三經也。但陰陽虛實不可不辨，大抵

陽證必熱。熱者多實。陰證必寒。寒者多虛。先脹于內而後腫于外者爲實。先腫于外而後脹于裏者爲虛。小便黃赤大便秘結爲實。小便清白大便溏泄爲虛。滑數有力爲實。弦浮微細爲虛。色紅氣粗爲實。色悴聲短爲虛。凡諸實證或六淫外客或飲食內傷。陽邪急速其至必暴。每成于數日之間。若是虛證或情志多勞或酒色過度日積月累其來有漸。每成于經月之後。然治實頗易。理虛恒難。虛人氣脹者脾虛不能運氣也。虛人水腫者土虛不能制水也。水雖制于脾實則統于腎。腎本水藏而元陽寓焉。命門火衰既不能自制陰寒又不能溫養脾土則陰不從陽而精化爲水。故水腫之證多屬火衰也。丹溪以爲濕熱宜養金以制水使脾無賊邪之患。滋水以制火使肺得清化之權。夫制火固可保金獨不慮其害土乎。惟屬熱者宜之。若陽虛者豈

不益其病哉。更有不明虛實專守下則脹已之一法。雖得少寬于一時。真氣愈衰。未幾而腫脹再作。遂致不救。殊可嘆也。余于此證察其實者。直清陽明。反掌收功。苟涉虛者。溫補脾腎。漸次康復。其有不大實亦不大虛者。先以清利見功。繼以補中調攝。又有標實而本虛者。瀉之不可。補之無功。極爲危險。在病各有鼓脹與蟲脹之殊。鼓脹者中空無物。腹皮綳急。多屬于氣也。蟲脹者中實有物。腹形充大。非虫卽血也。在女科有氣分與血分之殊。氣分者心胸堅大而病發于上。先病大脹而後經斷。血分者血結胞門而病發于下。先因經斷而後水脹。在治法有理肺與理脾之殊。先喘而後脹者治在肺。先脹而後喘者治在脾。以上諸法。此其大畧也。若夫虛實混淆。陰陽疑似。貴在臨證之項神而明之。其免于實實虛虛之害乎。

四肢不腫但腹脹者名單腹脹難愈

死證腹脹身熱者死 腹脹寒熱如瘧者死 腹大脹而支清

脫形洩甚為逆 腹脹便血脈大時絕者死以上 唇黑或腫

肝傷 缺盆平心傷 臍突脾傷 足心平腎傷 背平肺傷

五傷者死 陰囊及莖腫腐者死 瀉後腹脹而有青筋者死

大便滑泄水腫不消者死 水腫先起于腹後散四肢者可

治先起于四肢後歸于腹者死以上

脈濇盛而緊 大堅以瀉 遲而滑皆脹滿 沉而滑 浮而

遲 弦而緊皆水腫 二病之脈實大者可治虛微者難治

醫案

太學何宗魯夏月好飲水一日太宗師發放自早起候至未申
為炎威所逼飲水計十餘碗歸寓便脹悶不能食越旬且腹如
抱甕氣高而喘余視之曰皮薄而光水停不化也且六脈堅實

其病暴成。法當利之。遂以舟車丸每服三錢。香薷湯送再劑。而二便湧決如泉。復進一錢五分。腹減如故。用六君子十貼。卽愈。徽州方太和太怒之後。復大醉。至明日目下如卧。蚕居七日而肢體皆腫。不能轉側。二便不通。煩悶欲絕。余診之。脉沉且堅。當逐其水。用疎鑿飲子。一服而二便快。再服而四肢寬。更以五皮飲服三日。隨愈。

以上二案
水腫實證

武林文學錢賞之。酒色無度。秋初腹脹。冬杪遍體腫急。臍突背平。在法不治。迎余治之。舉家叩首求救。哀迫余曰。我非有起死金丹。但當盡心力而圖之耳。卽用金匱腎氣丸料。大劑煎服。兼進理中湯。服五日無效。余欲辭歸矣。其家曰。自知必死。但活一日。則求一日之藥。卽使不起。安敢歸咎乎。勉用人參一兩。生附子三錢。牛膝茯苓各五錢。三日之間。小便解下。約有四十餘碗。

腹有縐紋舉家拜曰皆再造之恩也約服人參四觔附子一斤

薑桂各一斤餘半載而瘥

此水腫之虛者

都憲李來吳積勞多鬱肢體脹滿以自知醫輒用胃苓湯加枳

殼三月以來轉加痞悶余診其脉沉瀄而軟視其色黃白而枯

此虛證也宜大溫大補始猶不信爭之甚力僅用參二錢稍覺

寬舒欲加桂附執不肯從余曰證坐虛寒喜行攻伐已見既堅

良言不納雖有扁倉豈能救耶越兩月果歿

此氣脹之虛者

錦衣太傅徐擔寧稟界素壯病餘肥甘過度腹脹氣粗余診之

脉盛而滑按之不甚虛宜以利氣之劑少佐參朮惑于多岐之

說旦暮更醫余復診曰卽畏參不用攻擊之劑決不可投也後

與他醫商之仍用理脾疎氣之劑而安

此氣脹之不實亦不大虛者

光祿卿吳伯玉夫人患腹滿而痛喘急異常大便不通飲食不

進醫者用理氣利水之劑二十日不效余診之脉大而數者只
為甚令人按腹手不可近余曰此大腸癰也脉數為膿已成用
黃耆皂刺白芷之類加葵根一兩煎一碗頓服之未申痛甚至
夜半而膿血大下昏暈不支即與獨參湯稍安更與十全大補

一月而愈此似脹而實非者

五皮飲治脾肺不能運行氣滯皮膚水停不利

大腹皮洗

赤茯苓皮

生薑皮

陳皮

桑白皮炒各一錢

五分

水鍾半煎八分日進三服

胃苓湯方見泄瀉

香蘇散

治水氣虛腫小便赤澀

橘紅去白二錢

防已

水通

紫蘇葉各一錢

水鍾半薑三片煎八分服

實脾飲 治陰水發腫用以實脾

厚朴薑汁炒

白朮炒

木瓜

大腹皮

附子炮

木香忌火

草果

白茯苓

乾薑炒各二錢

水鍾半薑五片煎七分服

復元丹 治脾腎俱虛遍身水腫小便不通

附子炮二兩

木香煨

茴香炒

川椒炒出汗 厚朴薑汁炒

獨活

白朮炒

橘紅

吳茱萸炒 桂心各一兩

澤瀉二兩

肉果煨

檳榔各五錢

爲末糊丸桐子大每服三錢紫蘇湯送下

金匱腎氣丸 治肺脾腎俱虛遍身腫脹小便不利痰氣喘急非此藥不救

白茯苓四兩

附丸炮七錢

川牛膝

肉桂去皮 澤瀉去皮

車前子

山茱萸去核

山藥

牡丹皮各一兩

熟地黃

四兩酒浸杵膏

蜜丸桐子大每服四五錢空心白湯下

補中益氣湯

方見類中風

理中湯

方見傷寒

導水茯苓湯

治遍身水腫喘滿小便不通諸藥不效者用此即愈

赤茯苓

麥門冬

去心 澤瀉

白朮

各三兩

桑白皮

紫蘇

檳榔

木瓜

各一兩

大腹皮

陳皮

砂仁

木香

各七錢半

右為粗末每服五錢水二鍾燈草

二十五根煎八分服連進三服小水漸利

沉香琥珀丸

治水腫小便閉

沉香琥珀丸水腫連服琥珀香蘇皮淨已沉利

琥珀

杏仁

去皮尖炒

紫蘇

赤茯苓

澤瀉

葶藶

炒

郁李仁

去皮

沉香

各一兩五錢

陳皮

去白

防己

各七錢五分

為末蜜丸梧子大以麝香為衣每服

二錢五分

加至五錢空心人參湯送下

疏鑿飲子

治通身水腫喘呼氣急煩躁多溺大小便不通服熱藥不得者

澤瀉

商陸

赤小豆

羌活

大腹皮

樹目

木通

秦艽

茯苓皮

檳榔

水鍾半薑五片煎九分服

敷藥

治腹滿如石或陰囊腫
大先用甘草嚼後用此

大戟

芫花

甘遂

海藻

各等分

為細末用醎醋調麩和藥攤綿紙上覆貼腫處以軟綿裹佳

小胃丹

芫花

醋拌一宿瓦器內炒黑不可焦

甘遂

長流水浸半日煮晒乾

大戟

長流水煮再用水洗晒各五錢

大黃

濕紙裹煨切酒炒一兩五錢

黃蘗

炒二兩

右為細末以白朮膏丸如雞子大臨卧白湯送下每服

一錢欲利空心服

十棗湯

見傷寒

醫宗金鑑

卷七腫脹

八

卷七

舟車神佑丸

去一切水濕痰飲如神

甘遂

芫花

大戟

各一兩俱醋炒

大黃

二兩

輕粉

一錢

黑牽牛

頭末四兩

青皮

陳皮

木香

檳榔

各五錢

爲細末

水丸

椒目

大空

心服

五丸

日三服

痞悶者

多服

反煩

滿宜

初服

二丸

每服

加二丸

快利爲度

戴人

每令

病者

先服

百餘粒

繼以

瀉川

等藥

投之

五更

當下

種種

病出

輕者

一二

度重者

五六度

方愈

藥雖

峻急

爲效

極神

弱者

當依

河間

漸

次進

實者

依戴

人治

之

大聖瀉川散

大黃

煨

牽牛

取頭末

郁李仁

各一兩

木香

三錢

芒硝

三錢

甘遂

五分

評曰

諸溼

爲土

火熱

能生

溼土

故夏

熱則

溼

涼則

燥

嘗考

戴人

治法

假令

肝木

乘脾

土土

不勝

木求