

瘍醫大全



傷醫大全目錄

卷二十一

內癰部

內癰門主論

心癰門主論 附方

肝癰門主論 附方

脾疽門主論

肺癰肺痿門主論 附方

腎癰門主論

易醫大全

卷二十一 目錄

頁氏必書



南京中醫藥大學圖書館藏

胃癰門主論

大腸癰門主論

小腸癰門主論
附方

三焦疽門主論

痞積癥瘕門主論
附方



南京中醫藥大學圖書館藏

瘍醫大全卷二十一

廣東省城雙門底玉

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

增錢之栢東陽

男 櫛燮用和

內癰部

自五臟六腑內癰內疽癰疽疔瘡止皆彙於此部中

以便閱檢參治



所有

內癰門主論

凡人胸腹有十一募募者各臟腑陰會之所也靈樞
云發內癰內疽者其本經募上肉必浮腫募中必
時時隱痛浮腫爲癰隱痛爲疽此卽內癰內疽之
驗也但內癰有治法而內疽無治法何也蓋內癰
內疽其病原無殊惟在根淺根深之別耳根淺者
爲癰根深者爲疽若臨症用藥攻補得宜無不收
效至募有十一而內癰僅九證者何也蓋膻府形
如膜皮無出無納汁清氣潔不生內癰內疽若夫

膀胱亦如膜皮中惟濁水故古今書籍並無講及
內癰內疽者是以未敢詳載雖然中極穴而膀胱
募也今人間有中極穴或浮腫或隱痛者所見證
候竟同小腸癰相似則治法亦當按小腸癰治之
可也俟後之學者留意焉

驗內癰法 凡遇生內癰疑似者但與生黃豆五粒
令病人嚼之口中無荳腥味者是其候也

書云凡內癰俱係膜內成患外皮不腐

齊氏曰臟腑腸胃內癰內疽其疾隱而深藏目既不



見手不能近所至難矣但以診脉辨之亦可知也
若其脉洪數者膿已成也設脉遲緊雖膿未就
有瘀血也宜急治之不爾則邪氣內攻腐爛腸胃
不可救也

凡此病皆由

飲食不節

傷於脾胃

以致

此病



心癰門主論

經曰巨闕隱隱痛者心疽其上肉微起者心癰

鳩尾下一寸
心之募也

王肯堂曰心癰始發巨闕穴必隱痛微腫令人寒熱
身痛頭面色赤口渴隨飲隨乾由心火熾盛更兼
酷飲嗜熱而成宜服涼血飲如酒毒爲病宜升麻
葛根湯治之但此證甚屬罕有而治法不可不備



石上脈流... 脈流... 脈流...

身熱... 身熱... 身熱...

身熱... 身熱... 身熱...

身熱... 身熱... 身熱...

身熱... 身熱... 身熱...

醫曰...

醫曰...



南京中醫藥大學圖書館版權所有

心癰門主方

涼血飲

生地

麥門冬

連翹

天花粉

木通

赤芍

荆芥

車前子

瞿麥

白芷

甘草

薄荷

山梔

各等分

白燈心為引

潮熱加

淡竹葉

升麻葛根湯



張醫方全

升麻

柴胡

黃芩

白芍

葛根

木通

山梔

黃連

甘草

白水煎服

甘草

蘇合

佩花

車前子

蜀黍

天芥

木通

赤芍

生麻

交門

蘇合

熱血

心齋門生



南京中醫藥大學圖書館藏書
南京中醫藥大學圖書館藏書

肝癰門主論

經曰期門隱隱痛者肝疽其上肉微起者肝癰

名肝募在乳傍一寸半再直上一寸半

素問曰肝癰兩肱滿卧則驚不得小便

華真君曰肝癰不可用針刺須用內消內散

秘錄

陳遠公曰人素多惱怒容易動氣一旦兩脇脹滿發

寒發熱已而脇疼之至按之疼不可忍人以爲肝

火盛也誰知肝葉生瘡乎人但知肺生癰不知肝

亦能生癰也且靈素諸書亦未詳言得毋剗論以



驚俗乎余聞異人云脇疼手不可按者肝葉生癰也靈素未詳者以肝癰世不常有所以畧之也凡古今之氣運不同癰毒之生長不一肝能生癰烏可缺而不論乎况肝之生癰未嘗無理也肝一惱怒則葉開張肝氣卽逆大怒之後肝葉空脹未易平復設使時加惱怒是肝葉竟不得安且怒後必然動火怒益多而火益盛盛必燥乾肝血血乾則肝氣大燥無血養肝更易發怒欲不鬱結成癰烏可得乎然癰生於內何從而見然外可辨也肝

脾疽門主論

經曰章門隱隱痛者脾疽其上肉微起者脾癰

名脾募在臍傍開六寸高上二寸

王肯堂曰脾癰始發章門穴必隱痛微腫由過殮生
冷兼濕熱或瘀血鬱滯脾經而成令人腹脹咽嗝
乾燥小水短澁宜大黃湯赤豆以仁湯二方合而
用之腹脹全消宜六君子扶脾調理



甲乙類全書宜大...

道製小水...

今兼...

王齊堂曰...

...

...

...



南京中医药大学图书馆版权所有

生在左而不在右左脇之皮必見紅紫之色而
必見青色也此而辨之斷斷無差治必以平肝爲
主佐以瀉火去毒萬不可因循令其潰爛而不可
救也化肝消毒湯白芍當歸各三兩金銀花五兩
黑山梔五錢生甘草三錢水煎三劑疼止又減半

服數服全愈

水鑑

此方以歸芍入肝以滋肝血則肝血驟生易平肝
血之燥又得甘草緩急梔子清火銀花解毒安得
不效哉惟是火毒大盛肝血大虧不如此大劑亦
自徒然倘執以肝火之旺非肝癰之症只用當芍
治脇痛必不效也

又曰有左脇大痛按之尤甚此肝癰耳非脇痛也肝
癰多得之惱怒前條已論之矣然而憂鬱亦能生
癰也惟惱怒得者其痛驟憂鬱得者其痛緩初痛
之時逍遙散大劑煎飲痛立止矣何至成癰也因
失於速治而肝中鬱氣苦不能宣而血因之結矣
血結不通遂化膿而成癰其勢似緩然肝性最急
癰成而毒發甚驟也有脇疼數日而死者正因生
癰毒敗而死非脇痛能死也可不急爲治之乎宜
鬱化毒湯柴胡薄荷香附各二錢白芍當歸金銀