

赤水玄珠第十五卷目錄

秘結門

大小便不通

閉癰遺溺不禁辨

小便不通門

癰門

遺溺門

小便不禁門

溺赤

脫肛門

附截腸病

前陰諸疾門

疝門

赤水玄珠第十五卷

新安生生子孫一奎著輯

秘結門

經曰大便秘者腎之所主腎主五液也腎氣充則大便潤虛則津液耗竭而燥結矣又飢飽勞役損傷胃氣及食辛熱厚味之物而助火邪伏於血中煎熬真陰皆能使大便燥結又有年老陰血不足而燥者惟當補而潤之不可用峻利之劑又大便秘結者不得發汗汗則重亡津液必秘結而死矣

有陽結有陰結有風結有實結有虛結有氣秘有血秘仲景曰脈浮數能食不大便秘者此爲實名曰陽結也期十

七日當劇脈沉而遲不能食身體重大便反硬名曰陰結也期十四日當劇陽結者散之陰結者熱之風結者

諸藥中加羌活防風之類此二味雖是風藥然味辛所

以能潤燥也

經曰腎惡燥急食辛以潤之

潔古曰臟腑之秘不可一槩治療有虛秘有實秘胃實而秘者能食小便赤以麻仁丸七宣丸之類主之胃虛不能食而小便清利者厚朴湯主之實秘者物也虛秘者氣也

東垣曰有物有積而結者當下之食傷太陰腸滿食不化

腹嚮嚮然不能大便秘者以苦泄之

仲景麻仁丸局方七宣丸皆以大黃為君

之類治注夏大便瀉滯者血少血中伏火也黃耆人參是也

湯加生地當歸身桃仁泥潤之如潤之大便仍久不快者少加煨大黃微利之如加大黃久不快利者非血結血秘是熱生風止當服黃耆人參湯內用羌活防風各五錢水四盞煎至一盞空心服之其便必大走也

丹溪戒人用峻利但宜滋養陰血使孤陽之火不熾而金行清化木邪有制脾土清健而運行津液津液入胃則腸潤而通矣須知在西北以開結爲主在東南以潤燥爲主慎勿膠柱而調瑟也

上海藏云桃杏仁俱治大便秘當以血氣分之年老虛人大便秘脈浮在氣杏仁陳皮主之脈沉在血桃仁陳皮主之所以俱用陳皮者以其干陽明病與手太陰爲表

裏也

脈多沉伏而結 陽結脈沉實而數 陰結脈
伏而遲或結 老人虛人便結脈雀啄者不治

七宣丸

柴胡 枳實炒

訶子皮

木香各五兩

桃仁去皮尖炒六兩

甘草炙四兩 大黃麵包煨十五兩

右煉蜜丸桐子大每服二十

丸米飲下漸加四五十九以利為度

厚朴湯 胃虛而秘者不能飲食小便清利

陳皮 半夏炒 枳實炒各一兩 甘草炙 厚朴製各二兩 白朮三兩

每三五七錢羌三片棗一枚水煎服

保命集大黃牽牛散 相火之氣遊走臟腑大便秘結

大黃一兩 牽牛頭末五錢 為細末每三錢有厥冷合用酒調

無厥冷而手足煩熱者蜜湯調下食後以微利為度此
謂不時而熱者濕熱也凡用大黃半兩至一兩而大便
不通利者加射香少許調于藥中則大便必大走也

半碗丸 治年高虛秘冷秘 方見燥門

大潤腸丸 治大便秘澁通用

杏仁炒 枳殼 麻仁 陳皮各五錢 阿膠各二錢半 防風

右煉蜜丸梧子大每五十丸老人蘇子煎湯下壯者

荆芥湯下

麻仁丸 實秘能飲食小便赤此丸與七宣丸主之

枳殼 川芎等分 麻仁泥減半

煉蜜丸梧子大食前溫水服

又麻仁丸 風秘脾約症小便數大便秘

大黃 枳殼 赤芍藥 厚朴 麻仁
各一兩 各一兩 五錢

杏仁 煉蜜丸梧子大每服三五十丸
各一兩二味俱另研

皂角丸 治有風人大便秘澀

牙皂 枳殼 羌活 桑白皮 檳榔 杏仁

麻仁 防風 白芷 陳皮
等分

蜜丸梧子大每服三五十丸蜜湯下

皂角枳殼丸 大腸有風秘結老人宜服

皂角 枳殼
炙去皮子 炒各等分

蜜丸梧子大每七十九丸空心食前米飲下

搜風順氣丸 治大腸秘澀

大黃五兩半熟半生 山茱萸 麻仁泥 郁子仁炮去皮研

兔絲子 山藥 牛膝 煨榔各二兩 防風 枳殼

獨活各一兩 車前子二兩半 陳蜜丸 梧子大每二三十九

米飲下平旦臨臥各一服

二仁丸 治老人虛人風秘不可服大黃者妙

麻仁 杏仁 枳殼 訶子等分

蜜丸 梧子大每三十九丸溫水下未利增之

四磨湯 氣滯腹急大便秘澀

沉香 木香 檳榔 烏蘘等分

各磨半鍾和勻溫服有執者加大黃枳殼名六磨湯

橘杏丸 治氣秘老人虛弱人皆可服

橘紅 杏仁等分

煉蜜丸 梧子大每七十九丸 空心米飲下

蘇麻粥 順氣滑大便 蘇子 麻仁

二味不拘多少 研爛水瀹取汁 煮粥食之

從容瑣陽粥 老人陰血不足 大便燥結

肉蓯蓉 瑣陽 煮粥服

小通氣散 虛人憂怒傷肺 致令秘澁曾服燥藥而大便秘

陳皮 蘇葉 枳殼 木通等分 水煎服 立通

金液丹 治挾冷結滯 兼治傷寒陰結 以杏仁麻仁煎湯

吞下 方在寒門

神功丸 治氣壅風盛 秘結後重 疼痛煩悶

大黃 訶子各四兩 人參 麻仁各二兩 右蜜丸梧子大

每二十丸米飲下食後臨臥服此藥虛實加減

小柴胡湯 治傷寒陽結能食而大便結

檳榔丸 治大腸實熱不通心腹脹滿

檳榔 大黃 麻仁 枳實 羌活 杏仁 牽牛

白芷 黃芩 各一兩 人參 五錢

蜜丸梧子大每四十九空心溫水下

四順清涼飲 治同前 每加燈心十根枳殼十片水煎

服効

檳榔散 治腸胃有濕大便秘結

檳榔 不拘多少 爲末每服二錢蜜湯點服

香蘇散 治同上 加枳殼檳榔水煎服

五仁丸 津液枯竭大腸秘結傳道艱難

桃仁 杏仁 各一兩 栝子仁 郁李仁 炒 松子仁 各二錢半

陳皮 四兩另為末 右五仁另研為膏入陳皮末研勻蜜丸梧

子大空心米飲下五十丸

調氣滋補溫腸丸 治發汗利小便亡津液以致秘結

沉香 一兩另為末 肉蓯蓉 二兩 為末用麻子仁汁打糊為

丸梧子大每七十九丸空心米飲下

潤腸丸 治脾胃中伏火秘結及風結血結

桃仁 麻仁 當歸尾 大黃 羌活 各五錢 升麻

紅花 郁李仁 右除桃麻仁另研為泥外餘為末煉

蜜丸梧子大每三五十九丸空心白湯下

一方加防風三錢皂角仁燒存性兩半無升麻以下三味

葳靈仙丸 治年高氣衰津液枯燥秘結

黃耆

枳殼

葳靈仙

等分

煉丸梧子大每五七十九丸薤湯熱水任下

陳黃湯

治老人大便秘結

黃耆

陳皮

各五錢為末

每服三錢用火麻仁一合研爛

以水投取汁一鍾瀘去渣于銀石器中煎候有乳花起即入白蜜一大匙再煎令滾調藥末空心服

獨棗湯

治大便積日不通

大棗一枚劈開入輕粉五分依舊合起以麻線縛札慢

火水煮熟嚼碎以棗汁送下

丹溪治虛熱大腸秘

白芍藥

一兩半

陳皮

生地黃

當歸身

各一兩

條芩

甘草

各二錢

右粥丸每七八十丸白湯下

潤麻丸

治血燥大便不通

此丹溪秘方

麻仁

當歸

桃仁

生地黃

枳殼

各一兩

蜜丸梧子大每五十丸空心白湯下

導滯通幽湯

治大便難幽門不通上冲吸門不開噎塞

不便燥秘氣不得下治在幽門以辛潤

當歸身

桃仁泥

升麻

各一錢

生地

熟地

各五分

炙甘草

紅花

各三錢

水煎食前調檳榔末五錢或加

麻仁泥一錢若加大黃名當歸潤燥湯

潤燥湯

升麻

生熟地黃

各二錢

當歸梢

生甘草

大黃

煨

桃仁泥

麻仁泥

各三錢

紅花

五分

右除二仁另研作

一服水煎數沸下二仁煎空心熱服

活血潤燥丸

治大便風秘血秘時常燥結

當歸稍

一錢

防風

三錢

大黃

紙裹煨

羌活

各一兩

桃仁

麻仁

各二兩研如泥

皂角

燒存性一兩三錢其性濕濕則滑滑則燥濕自解

右除二仁另研外餘為末蜜丸梧子大空心服五十

丸白湯送下三兩服後以蘇子麻仁粥每日早晚食

之大便不致燥結以磁器盛藥紙封

脾約麻仁丸 和劑方 治腸胃熱燥大便秘結

厚朴 去皮 芍藥 枳實 麩炒各八分 杏仁 去皮尖炒

麻仁 另研各五錢 大黃 蒸焙一兩六錢

蜜丸 梧子大每二十九臨臥溫水下以通利

潤腸丸 治大便秘澁連日不通

麻子仁 一盞半細研用水浸濾去皮取汁 芝蔴 半盞微炒研用水浸取汁

桃仁 泡去皮尖炒 荆芥穗 為末各一兩

右前藥入鹽少許同煎可以代茶飲之以利為度

三和散 治七情之氣結于五臟不能流通以致脾胃不

和心腹痞悶大便秘澁

川芎 三兩 羌活 去 紫蘇 去 沉香 宣木瓜 白朮

木香 檳榔 陳皮 甘草 各七錢半 大腹皮

每服五錢水煎服

木香三稜散 治腹中有虫面色痿黃一切積滯

黑丑 半生半炒 君 大腹子 君 檳榔 木香 三稜 煨 雷丸

莪朮 煨 錫灰 醋炒 大黃 已上各二兩 右為末每服三錢空

心蜜水調下或砂糖水亦可須先燒肉一片口中嚼

之久久吐出口中肉汁然後服藥

大小便不通

烏柏湯 治大便不通如神亦能通小便

烏柏木皮方一寸七劈破以水煎取小半盞服之立通

不用多服其功神聖兼能取水或以此湯調下五苓