

為散。每服四五錢。薑三片。紅棗一枚。水煎調服。此即平補正氣湯。去棗仁柏仁薑蒲生地山

藥五味硃砂。加延胡細辛甘草。

加參生化湯。見本卷華嚴門。

生化湯。

見本卷生化湯論後。

大補回陽生化湯。

見本卷華嚴門。附加參生化湯下。

大補元煎。

見本卷惡露不止門。

理陰煎。

見上卷惡阻門。

四物湯。

見上卷安胎門。

失笑散。

見中卷胞衣不下門。

補中益氣湯。

八珍湯。

四烏湯。

俱上卷諸痛門。

惡露不止論

產後惡露不止。非如崩證暴下之多也。由於產時傷其經血。虛損不足。不能收攝。或惡血不盡。則好血難安。相併而下。日久不止。漸成虛勞。當大補氣血。使舊血得行。新血得生。不可輕用固澀之劑。致敗血聚為癥瘕。反成終身之害。十全大補湯主之。如小腹刺痛者。蒲黃四物湯主之。如產後月餘。經血淋瀝不止。宜用升陷固血湯。全書云。因血熱者。宜保陰煎。清化飲。因傷衝任之絡而不止者。固陰煎。加減用之。若肝脾氣虛。不能收攝。而血不止者。宜壽脾煎。若氣血俱虛。而淡血津津不已者。宜大補元煎。若怒火傷肝。而血不藏者。宜薛氏加味四物湯。若風熱在肝。而血下泄者。宜一味防風散。以上諸治法。與濟陰綱目理同。血崩門亦可參看通治。

蒲索四物湯 治產後惡露不止。

當歸

五錢 川芎

八錢 熟地

黃二錢 白芍

酒炒 延胡索

一錢 蒲黃

七分 乾薑

五分 炒黑

產後忌芍藥。而此方用之。審惡露不止四字。則產日已久矣。故不忌也。

升陷固血湯

治產後月餘。經血不止。陷下者舉之。

當歸

川芎

熟地

白芷

升麻

血餘

灰 水煎服

保陰煎

治一切陰虛內熱動血等證。

生地

熟地

芍藥

山藥

川續斷

黃芩

黃柏

生草

水二鍾。煎七分。食遠服。

如小水多熱。或兼怒大動血者。加焦梔子一二錢。

如夜熱身熱。

加地骨皮一錢五分。

如肺熱多汗者。加去心麥冬炒棗仁。

如血熱甚者。

加酒炒黃連一

錢五分。

如血虛血滯。

筋骨腫痛者。

加當歸二三錢。

如氣滯而痛。

去熟地。

加陳皮青皮丹

皮香附之屬。

如血脫血滑。

及便血久不止者。

加地榆一二錢。

或烏梅一二個。

或百藥煎一

二錢。醋炒文蛤亦可。

如少年或血氣正盛者。不必用熟地山藥。

如肢節筋骨疼痛。

或腫

者。加秦艽丹皮各一二錢。

此方苓連梔柏等類。當於產後日久。方可用之。

清化飲

治婦人產後因火發熱。及血熱妄行。陰虧諸火不清等證。此方清涼。產後日久

方可用之。

芍藥

麥冬

丹皮

茯苓

黃芩

生地

石斛

一錢

水一鍾半。

煎七分。食遠溫服。

如覺骨蒸多汗者。

加地骨皮一錢五分。

熱甚而渴。

或頭痛

者。加煨石膏一二錢。

下熱便澀者。

加木通一二錢。

或炒黃柏炒梔子。

皆可隨證用之。

如

兼外邪發熱。加柴胡二錢。

以上保陰清化二方。蓋因產家或過慎太燥。或因年力方壯。而飲食藥餌大補過度。致火動

病熱下血日久不止此產後間有之實證故錄是方以備用

固陰煎 治陰虛滑泄帶濁淋瀝及因虛不固此方專主肝腎

人參隨錢三五 熟地錢三五 山藥二錢 山茱萸錢五 遠志七分 甘草水 炙草錢一二 五味

子十四 兔絲子炒香

水二鍾煎七分食遠溫服如虛滑泄甚者加金櫻子肉二錢或醋炒文蛤一錢或烏梅

二個如陰虛微熱而經血不固者加製川續斷肉二錢

泄者加補骨脂吳茱萸之類隨宜用之如肝腎血虛小腹痛而血不歸經者加當歸二三

錢如脾虛多濕或兼嘔惡者加土炒白朮一二錢如氣陷不固者加炒升麻一錢如

兼心虛不眠或多汗者加炒棗仁二錢

壽脾煎 治脾虛不能攝血等證及婦人無火崩淋凡兼嘔惡尤為危候速宜用此救脾

則統血歸源矣若再用寒涼胃氣必脫無不死者

人參隨宜一二錢 白朮錢二三 當歸錢二 山藥錢二 棗仁錢五 遠志三五分 乾薑一二錢

炙草錢一 蓮肉去心炒

水二鍾煎服如血未止加烏梅二個凡畏酸者不可用或加地榆一錢五分亦可滑脫

不禁者加醋炒文蛤一錢下焦虛滑不禁鹿角霜二錢為末攪入藥中服之氣虛甚者加炙

黃耆二三錢氣陷而墜者加炒升麻五七分或白芷亦可兼溼泄者加炒補骨脂一錢

陽虛畏寒者加製附子一二錢血去過多陰虛氣餒心跳不安者加熟地七八錢或一

大補元煎 治男婦血氣大壞精神失守危劇等證

人參一二錢多則 山藥二錢 熟地二三錢多則 杜仲二錢鹽水 當歸去之 枸杞

各二錢 山茱萸如畏酸者去之 炙草各二錢

水二鍾煎七分食遠溫服。如元陽不足多寒者。加製附子肉桂炮薑之類。隨宜用之。如氣分偏虛者。加炙黃耆土炒白朮。若胃口多滯者。不必用。如血滯者。加川芎去山茱萸。滑瀉者。加五味炒故紙之屬。

薛氏加味四物湯 養肝血清肝火

熟地

當歸

各三錢

芍藥二錢

川芎

山梔炒

柴胡

丹皮

各一錢

水二鍾煎服。

防風

去蘆

良方一味防風散

一名獨聖散

為末每服二錢。空心食前用酒煮白麵清飲調下。治肝經有風以致血得風而流。不歸經者。極效。

十全大補湯

見上卷胎不長養門

氣喘論

凡產後若因風寒外感。邪氣入肺而喘急者。必氣粗胸脹。或多咳嗽。自與氣短似喘。上下不接者不同。治當疎散中兼補為主。宜金水六君煎。或六君子湯。若單以寒邪入肺。氣實氣壅。而本無虛者。宜六安煎。或二陳湯。加蘇葉之類。主之。又有瘀血入肺。必面黑發喘。與氣短似喘。大不相同。用二味參蘇飲治之。或有氣虛血瘀。泛上者。用六君子調服。失笑散亦效。

金水六君煎

治肺腎虛寒。水泛為痰。或年邁陰虛。氣血不足。外受風寒。咳嗽嘔惡多痰。

喘急等證。

當歸

半夏製

茯苓各二錢

熟地三錢

陳皮一錢

五分

炙草一錢

如大便不實而多濕者。去當歸加山藥。

如痰甚。

水二鍾。生薑三五片。煎八分。食遠溫服。

如陰寒甚而嗽不愈者。加細辛五分。

如兼表邪。

氣滯胸膈不快者。加白芥七八分。

如陰寒甚而嗽不愈者。加細辛五分。

寒熱者加柴胡一二錢

六安煎 治風寒咳嗽及非風初感痰滯氣逆等證

陳皮

錢五分

半夏

錢二

茯苓

錢二

杏仁

錢二

甘草

錢一

白芥子

錢一

白芥子

錢一

白芥子

錢一

白芥子

錢一

白芥子

錢一

水一鍾半。加生薑三五片煎七分食遠服

若氣虛猝倒及氣平無痰者不可用此劑

六君子湯

見上卷

煩門

二陳湯

見上卷

煩門

二味參蘇飲

見本卷

衛證門

失笑散

見中卷

胞衣不下門

惡露不下論

凡產後臟腑勞傷氣血虛損或胞絡挾於宿冷或當風取涼風冷乘虛而搏於血壅滯不宣積蓄在內故不下也宜溫煖活血則血自行此必小腹脹滿刺痛無時宜用血證黑神散予每治此證用生化湯倍桃仁調失笑散生新行瘀頻以黑沙糖沖滾湯少滴無灰酒服之如素不飲或恐發暈即不加酒亦可每每獲效又或因脾胃素弱中氣本虛敗血亦少氣乏血阻不能盡下其證乍痛乍止痛亦不甚不可用大黃等葯攻之反增別病加減八珍湯主之或生化湯多服數貼亦效薛氏止用失笑散治之尊生錦囊均用四味散治效二產婦患前證服岐屬之劑惡露隨下久而昏憤以手護其腹此脾氣復傷作痛故用手護也以人參理中湯加肉桂二劑補之而愈

加減八珍湯

人參

錢八分

白芍

錢八分

茯苓

錢一

歸身

錢二

川芎

錢一

赤芍

錢一

熟地

錢一

延胡索

錢一

延胡索

錢一

延胡索

錢一

延胡索

製香附

錢八分

炙草

錢五分

薑棗引水煎食前服

四味散

治瘀血不下及療緩分娩一切諸疾

當歸

延胡

血竭

沒藥各五錢

為末用熱童便半鍾調服

血證黑神散

見上卷論錢門

生化湯

見本卷生化湯論後

失笑散

見中卷胞衣不下門

脫汗亡陽及諸汗論

產婦分娩既已亡血而又多汗極危證也蓋汗者心之液榮於內為血發於外為汗血液屬陰陰亡陽亦隨之而走故曰脫汗亡陽其用藥與他證不同但血塊作痛著木又未可遽加如倦甚澱澱汗出形色又脫速灌加參生化湯倍參以救為急毋拘塊痛俟汗止再去參服之經曰陽氣者精則養神柔則養筋多汗不止必發柔癭氣血俱虛當用十全大補湯不應加附子予謂無塊痛者當用之此證若服參耆重劑而汗多不止及頭汗出不至腰足難治

自汗不止皆由勞傷心神不能鎮守其液治當健脾胃散水穀之精以歸肺益其榮衛而虛血歸源灌漑四傍不使妄行於外而為汗也亦用加參生化湯或麻黃根湯并間用黃耆五味煎湯送六味丸醫通云因外感多汗者黃耆建中湯治之

盜汗者睡中汗出醒來即止猶盜賊之瞰人睡而盜之謂之盜汗非自汗可比此因亡血陰虛陽氣偏盛內經云陽加於陰則發汗治當兼用血分藥品雜病雖有當歸六黃湯然寒而膩陽又不可治產後之盜汗也宜止汗散主之

頭汗者或因濕熱或因瘀血當審虛實治之

半身汗出昔人用二陳合四物治多不效以血藥助陰閉滯經絡也此屬氣血不充而有寒痰留滯非大補氣血兼行經絡痰不效宜十全大補人參養榮加星半川烏若肥人多加豁痰行

氣藥如瘦人乃氣血本枯天之徵也。

麻黃根湯

治產後虛極自汗不止。

人參一錢或二錢

當歸二錢

黃耆一錢五分

麻黃根

牡蠣煨

麥冬去心

浮麥各一錢

桂枝分

炙甘草四分

水煎服

如無塊痛加土炒白朮一錢

熟地三錢

手足冷加熟附子一片

炮薑四分湯

加去心麥冬一錢五味子十粒

惡風寒加防風五分

肥人加竹瀝一小盞生薑汁半茶

以清痰火并間服六味丸七八十丸用炙黃耆五味子煎湯送下。

黃耆建中湯附小建中湯內補建中湯

桂枝三錢

白芍六錢

炙甘草二錢

黃耆一錢五分

膠飴一合

生薑五片

大棗四枚

右開乃古方分兩後人多有減用者桂枝一錢白芍二錢炙甘草七分膠飴三錢薑三片棗一

枝千金多人參二錢

桂枝湯者和榮表藥也倍芍藥加膠飴便能建立中氣故名小建

中湯以芍藥之酸斂護營血膠飴之甘培養中土能治風木乘脾寒熱腹痛再更加炙黃耆

即黃耆建中湯治虛勞感寒發熱自汗以黃耆實衛氣使榮衛藏府俱和而受益多矣。十

金以小建中方加入當歸名曰內補建中其調和中外之力可知。

止汗散 治產後盜汗。

人參二錢

麻黃根五錢

當歸酒洗

熟地各三錢塊痛不用

黃連五分

浮麥一錢

水煎服

一方用牡蠣五錢

炒小麥欸八兩

二味煎服三五錢猪肉汁調服。

人參養榮湯

治心脾虛寒榮血不足寢汗發熱。

人參

黃耆蜜酒

炙甘草

白朮土炒

茯苓

陳皮

熟地

當歸酒拌各

芍藥一錢五分

肉桂八分

遠志五分

甘草木五分

五味子七分

碎

薑三片。棗二枚。水煎服。

二陳合四物名八物湯因不用故不錄方

加參生化湯

見本卷暈厥門

六味丸

見上卷諸痛門附六黃地黃湯下

十全大補湯

見上卷胎不長養門

傷食論

產後形體勞倦。脾胃俱傷。是以新產之後。去膏粱。遠食味。食粥茹蔬。以為調攝。不知者惟慮產後之虛。以厚味為有補。更有本不思食而強與之。胃雖少納。脾難轉運。易至食停痞塞。甚而傷食發熱。切勿誤認為陰虛。更有食滯腹痛。又勿錯疑為血凝。治斯證者。體認真實。如發熱而飲食調者。方可補血。若惡食噯酸者。食滯之徵。即當扶元為主。補氣養血。健脾助胃。審傷何物。佐以何藥。消導則脾氣復而轉輸易滯。物行而胃思穀矣。如此補消兼治。無有不妥。故善治者。治法有先後緩急。論證因塊痛有無。產後有日數新久。能重產虛之本。而兼去停積之標。攻補如法。無不應手而愈。故有生化消食湯。健脾消食湯之分別施治。如誤服峻藥。過於消導。致不思穀。惟活命丹可救。子母見治產者。但知速消食物。反損正氣。益以滿悶。一劑不效。又加峻藥。一醫無功。又更一醫。先後互異。輕證反重。以致命絕。病家自歸命數。醫家以為盡技。豈不惜哉。

生化消食湯

治產後塊痛未止消食痞塞

川芎

錢二

當歸

五錢

乾薑

五錢

炙甘草

各四

砂仁

五分

桃仁

十粒

神麴

炒

麥芽

炒

肉桂

五分

虛人

加人

水煎服

傷肉食

加山查

五分

傷寒物

加吳茱萸

一錢

肉桂

五分

虛人

加人

參一錢或二錢

健脾消食湯

治產後塊痛已除停食痞塞

人參

當歸

三錢

酒洗

川芎

神麴

炒

白朮

一錢

山查

五分

砂仁

各六

麥芽

炒

炙甘草

各六

山查

五分

砂仁

各六

麥芽

炒

炙甘草

各六

山查

五分

水煎服。或停寒日久。脾胃弱甚。雖藥不能即運。須以手揉按。或炒麵熨法亦妙。

長生活命丹 治過服消導之藥。致令少食。或本思食之人。反令絕食。

人參錢三 用新礮。或銀銚。水鍾半煎七分。再用飯鍋焦研粉。先用些須。以參湯調送二三茶匙。

引開胃口。後漸漸加多。漸加參湯。陸續調服。煎參不可用礮。恐開藥發。嘔此方曾活數十餘命神效。

忿怒氣逆論

產後忿怒氣逆。胸膈不舒。甚而作痛者。兼之血塊。又痛。宜用木香生化湯。則自然血塊速化。怒氣易散。並治而不悖也。若輕產而重氣。偏用香附烏藥枳殼香砂之類。以散氣行塊。而元氣反損。悶滿疼痛益增。非善治產者也。又如怒後即食。胃弱停悶。已無塊痛。宜用健脾化食理氣湯。再審何物所傷。則佐以何藥消之。痛悶即除。慎勿輕用檳榔。丸流氣欬等方。以散氣化食。則虛弱產婦重虛之禍。不可勝言矣。

木香生化湯 治產後塊痛未除。日受氣惱至效。

川芎錢二 當歸六錢 乾薑四分 陳皮三分 木香二分 麝香一分

水煎服。若怒後傷食。與傷食治同。審傷何物。以何藥消之。

健脾化食理氣湯 治產後無塊痛而受氣傷食者。

人參 白朮土 當歸三錢 川芎錢一 乾薑黑 炙草各四分 陳皮三分

水煎服。如傷麵。加炒神麵炒麥芽。傷肉。加山查砂仁。傷寒物留滯腸間作痛。加桂枝。

吳茱萸亦有止。加桂枝八分亦可。

頭痛論

人身之中。氣為陽。血為陰。陰陽和暢。斯無病矣。夫頭者。諸陽之會也。產後去血過多。陰氣已虧。而虛陽失守。上湊於頭。則令頭痛。但補其血。則陽氣得從。而頭痛自止。間有敗血停留子宮。厥陰之位。其脈上貫顛頂。作顛頂痛者。雖有身熱惡寒之候。只宜生化湯加減。慎不可用羌獨等藥。蓋由真陽虧損。濁陰得以犯上。陷入髓海。為脹為痛。是非清陽升復。則濁陰不降。在裡內起之邪為病。非若外入之邪可表而愈也。況生化湯中。羌薑亦能散表邪。桃仁亦能逐瘀血。是又可兼治。再少為因證。加入又何用。另方製產而施治乎。尊生治血虛頭痛用芎歸湯。治感冒頭痛參蘇芎歸湯。齊治停痰頭痛用血證黑神散。如真頭痛。旦發夕死不治。

當歸

川芎 各二錢五分

產後芎歸湯

治產後血虛頭痛

水煎服

有汗是氣虛。加人參

五七分 桂心 三分

感寒加天麻白芷羌活 各四分

參蘇芎歸湯

治產後感冒

人參 紫蘇

乾葛

錢各一

當歸

川芎

錢各二

薑一片煎服

生化湯

見本卷生化湯論後

血證黑神散

見上卷語門

心痛即胃脘痛論

人之胃脘。居於心下。產後或傷寒氣。及冷物而作痛。因痛近於心。俗呼為心痛。殊不知心為君主之官。主血行氣。統馭臟腑。血氣盛則泰然安寧。血不足則怔忡驚悸不安。耳豈可痛乎。若寒傷心經。為真心痛。與頭痛證同。皆無藥可救。手足甲見青黑色。旦發夕死。諸書論之詳矣。凡胃口痛。當散胃中之冷物。生化立效。方治之無有不安。若獨用熱藥攻寒。其痛雖止。而血妄行。反虛產母。況寒者。必扶虛而燥熱者。必佐陰藥。方能制其僭越也。至於綿綿而痛。當問血塊。盡又

可揉按而少止是虛當用補劑大抵產後寒食上攻於心則心痛下攻於腹則腹痛治心腹之痛大約相同馮氏云產後陰血虧損隨火上冲心絡故名曰心胞絡痛宜歸脾湯主之醫通用理中加當歸治之

化化立效方

治產後因傷冷物胃脘作痛

川芎

當歸

桃仁

乾薑

炙甘草

肉桂

吳茱萸

水煎服

一方無桃仁

傷肉食如山查砂仁

傷麵食加炒神曲炒麥芽

大便秘加酒

沈茯苓

尊生云如不止蒲黃

二錢五分五靈脂

一錢四分木通

一錢赤芍

一錢沒藥

延胡

一錢五分

薑黃

一錢五分

鹽酒

一滴

此蓋因瘀作痛服前藥痛仍不止而用也

歸脾湯

見上卷胞漏小產門

理中湯

見上卷虛門附枳實理中湯下

腹痛論

產後腹痛先問血塊如有血塊只服生化湯甚則調失笑散其塊消而痛自止尊生亦用生化湯稍久始調失笑散下延胡一錢若風冷乘虛入腹或內傷寒涼之物作痛得人按摩畧止或熱物熨止畧止宜加味生化湯密齋用當歸建中湯治之馮氏云產後惡露或因外感六淫內傷七氣致令斬然而止瘀血壅滯所下不盡故令腹痛當審因治之如產後數朝內飲食如常忽作腹痛六脈沉伏四肢厥冷此惡血不盡傷食裏血而脈不起也不可誤認氣血兩虛而用大補須兼消導行血之藥但產後惡露不盡留滯作痛亦常有之然與虛痛不同必其由漸而甚或大小便不行或小腹鞭實作脹痛極不可近手或自下上冲心腹或痛極牙關緊急有此實證當速去之近上者宜失笑散近下者宜通瘀煎未效用決津煎為善又有腹痛定於一邊及小腹者此是側臥敗血留滯所致醫通用四烏湯加蓬朮然亦不若決津煎為當也金匱云

產後腹中疝痛。當歸生薑羊肉湯主之。蓋疝痛者。緩緩痛也。屬客寒相阻。故以當歸通血分之滯。生薑行氣分之寒。君以羊肉者。所謂形不足補之以味。况羊肉又能補氣。疝痛屬氣弱。宜之。若婦人產當寒月。寒氣入產門。臍下脹痛。手不可犯。此寒疝也。亦宜當歸生薑羊肉湯治之。密齋云。產時寒氣客於子門。入於小腹。或坐臥不謹。使風冷之氣乘且而入。此寒疝。但不作脹。且無形影為異。治以金鈴子散。予考金匱密齋之論寒疝不同。金匱云。臍下脹痛。手不可犯。蓋有寒凝瘀滯也。密齋云。但不作脹。且無形影。是無瘀滯也。又有產後脾虛腎虛。而為腹痛者。此不由產。而由臟氣不足。若脾氣虛寒。為嘔吐。為食少。而兼腹痛者。宜五君子煎。及六君子湯。主之。若腎氣虛寒。為瀉。為痢。而兼腹痛者。宜胃關煎。或理陰煎主之。馮氏用六君子湯。送四神丸治之。若胸膈飽悶。或惡食吞酸。腹痛。手不可按。此飲食所傷。治法見傷食門。若食既消。而仍痛。按之不痛。更加頭痛煩熱。作渴惡寒。欲嘔等證。此是中氣被傷。宜溫補脾胃為主。若發熱腹痛。按之痛甚。不惡食吞酸。此是瘀血停滯。失笑散消之。若止發熱。頭痛腹痛。按之却不痛。此是血虛。初產生化湯。日久用四物加炮薑參朮以補之。若產後惡露既去。而腹仍痛。四神散調補之。不應八珍湯治之。醫通云。若下焦虛寒。用六味丸加桂。

加味生化湯 治產後風冷。或傷寒物腹痛。

川芎錢二 當歸錢四 炮薑分四 桃仁十粒去 炙草分五 桂枝分四

水煎服。傷食照生生化立效。方加法。尊生於生化湯內。加炒白芍分五 桂枝分五 痛止減去。

當歸建中湯 治風冷乘虛入腹。或傷寒冷物腹痛。

當歸洗酒 白芍炒酒 桂心 炙草錢各二

薑五片。棗三枚。水煎。入飴糖三匙。攪勻熱服。

金匱當歸生薑羊肉湯 治產後腹中疝痛。及寒月生產。寒氣入於子門。手不可犯。臍下

脹滿並治寒疝虛勞不足及脇痛裏急者

當歸

兩

生薑

五錢

羊肉

二觔

生

先煮羊肉去滓及沫取清者煮當歸生薑溫分三服亦有加入蔥椒鹽以適口者

苦寒多

者倍生薑

痛多而嘔者加橘皮土炒白朮

後人治產後腹中疝痛用大劑人參阿膠生

薑煎服效此即當歸生薑羊肉湯之變法

金鈴子散

治產後寒氣入於小腹而為寒疝非若血滯之作脹而有形影者

川楝子

小茴香

補骨脂

桂心

各一錢

薑乳水煎加木香一錢水磨汁和勻食前熱服予謂木香磨汁二三分沖服亦足矣

五君子煎

治脾胃虛寒嘔吐泄瀉而兼濕者

人參

白朮

茯苓

乾薑

炙草

水煎服

胃關煎

治脾胃虛寒作瀉或甚至久瀉腹痛不止冷痢等證

熟地

山藥

白扁豆

吳茱萸

焦乾薑

白朮

炙草

水煎服

水煎服

瀉甚者加麵煨肉豆蔻一二錢或破故紙亦可

氣虛勢甚者加人參隨宜用

陽虛下脫不固者加製附子一錢

腹痛甚者加木香七分或加製厚朴亦可

滯痛不通者加當歸二三錢

滑脫不禁者加烏梅二個或北五味二十粒

若肝邪侮脾者加肉桂一錢

四神丸

治腎虛肝氣逆不能消納腹脹泄瀉並治五更腎瀉神效

補骨脂

肉豆蔻

吳茱萸

五味子

各二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

脂肉豆蔻等分

吳茱萸五味子減半

止用補骨脂肉豆蔻二錢

米湯溫酒任下

一方補骨

四神散 治產後血虛或瘀血腹痛

當歸^{錢二} 川芎 白芍^{一錢} 炮薑^{五錢}

水煎服 子謂白芍治血虛腹痛則可若治瘀血作痛未必然也今炒透而與炮薑合用故

血虛瘀痛兼治之

生化湯 見本卷生化湯論後

失笑散 見中卷胞衣不下門

通瘀煎

失津煎 俱見上卷鬼胎門

四烏湯

六君子湯

八珍湯

六味丸 俱見上卷諸痛門

理陰煎 見上卷惡阻門

四物湯 見上卷安胎門

小腹痛並兒枕論

產後虛中感寒及飲食冷物下攻小腹作痛前已論之矣又有因血虛痛及小腹者亦服生化湯妙至血塊作痛俗名兒枕痛者亦用生化湯不應用延胡索化湯均可馮氏用芎歸益母山查香附陳皮煎服甚者加炒五靈脂密齋云臍下胞胎所繫之處血之所聚也產後血去不盡即成小腹痛證刺痛無時痛則有形須臾痛止又不見形血證黑神散主之然有產婦小腹作痛服行氣破血藥不效其脈洪數此瘀血內漬為膿也是因榮衛不調瘀血停滯宜急治之緩

則腐化為膿。最難治療。若流注關節。則患骨疽。失治多為敗症。脈數而洪。已有膿。遲緊乃瘀血也。下之愈。若腹脹大。轉側作水聲。或膿從臍出。或從大便出。用臘礬丸。太乙膏。下膿而愈。

延胡生化湯 治小腹兜枕塊痛。

川芎

錢二

當歸

酒洗

桃仁

十粒去

炮薑

炙草

各四

延胡

錢一

水煎服。

或用生化湯。送延胡索一錢。治同。亦能治寒氣痛。

如無塊。

但小腹痛。可按而止。

者屬虛。以生化湯加入延胡索散。再加入熟地二錢。

延胡索散

肉桂

延胡

各等分。合為細末。聽用。

蠟礬丸

治一切瘡癰惡毒。先服此丸。護膜托裏。使毒不攻心。或為毒蟲蛇犬所傷。並宜服之。

服之

黃蠟

兩

白礬

兩

先將蠟鎔化。候少冷。入礬和勻。為丸。如小豕豆大。每服十丸。或二十丸。漸加至百丸。則有力。

瘡愈後服之。亦佳。一方加雄黃。名雄礬丸。治蠱毒蛇犬蟲蝕毒。黃蠟甘溫。白礬酸澁。並

能固膜護心。解毒定痛。托裏排膿。使其毒不致內攻。故外科諸證之所必用也。

太乙膏

治內外一切癰瘍。

黨參

白芷

歸身

肉桂

大黃

赤芍

生地

各二

兩

右切為片。麻油二觔浸。春五夏三秋七冬十日。煎熟去滓。搥淨再熬。徐下黃丹。不住手攪。滴

水不散為度。內癰可丸服之。

生化湯

見本卷生化湯論後

血證黑神散 見上卷諸語門

腰痛論

產後腰痛者。由腎位繫胞。腰為腎府。產則勞傷腎氣。損動胞絡。或虛未平復。而風冷乘之。二者皆致腰痛。苦寒冷邪氣連滯背脊。痛久未已。後忽有孕。必致損動。宜養榮壯腎湯主之。如產後日久腰痛。濟陰大造丸治之。如惡露方行。忽斷絕不來。腰中重痛。下注兩股。痛如錐刺入骨。此血滯經絡。不即通之。必作癰疽。醫通用調經散。加陵鯉甲。或琥珀地黃丸。亦宜切勿誤用。五積散等辛溫之藥。蓋五積之治瘀血作痛。以蒼朮為君。府黃為臣。厚朴枳殼為使。雖有歸芍之補血。僅及蒼朮三分之一。不思產後之婦。即有寒邪血氣未充。似難發汗。不過水藥性溫。和可以推陳致新。豈可用麻黃之悍。蒼朮之燥散。虛而又虛。禍不旋踵矣。

養榮壯腎湯 治產後腰痛屬勞傷或風寒所乘

當歸^{錢二} 獨活 桂心 川芎 杜仲^{鹽水製} 續斷^{製取} 桑寄生^{各八分取真} 防風^{四分}

生薑三片煎服。如服二貼後。疼痛不止。腎虛也。加熟地三錢再服。失血過多者。加當歸

二錢。蜜炙黃耆。酒炒白芍。各一錢五分。

局方調經散 治產後敗血乘虛停積於五臟。循經流入於四肢。留滯日深。腐壞如水。漸

致身體面目浮腫。或因產敗血上干於心。心不受觸。致心煩燥。臥起不安。如見鬼神。言

語顛倒。並宜服之。

赤芍 沒藥 琥珀^{別研} 桂心 當歸^{各一錢} 細辛^{去苗} 麝香^{別研各五分}

右為和勻。每服一錢。溫酒入生薑少許服。一方每服五分。以痛止為度。

琥珀地黃丸 治產後惡露未淨。胸腹痛小。便不利。

琥珀^{別研} 延胡^{同糯米炒去末} 當歸^{各一} 蒲黃^{半炒生} 乾生地^八 生薑^一

右將地黃咀碎。酒浸生薑切片。各搗取汁。留滓無油杓中。用薑汁炒。地黃滓。地黃汁炒薑滓。