

傷寒集驗卷之五

秀水陳文治

大黃黃連瀉心湯

一百七十八心下痞按之濡其脉關上浮者宜服此

大黃 五錢

黃連 三錢

二味以麻沸湯一鍾漬之須臾絞去滓溫服

評曰大黃黃連苦寒以導瀉心下之熱而以麻沸湯漬

服者取其氣薄而瀉虛熱也

附子瀉心湯

百七十九心下痞而復惡寒汗出者若去附子名二黃瀉心湯

大黃 四錢

黃連

黃芩

附子 各二錢

先以水一鍾煮附子取半盞次以沸湯二盞漬三黃



北京中醫藥大學圖書館版權所有

傷寒集驗卷之五

秀水陳文治

大黃黃連瀉心湯

一百七十八心下痞按之濡其脉關上浮者宜服此

大黃 五錢

黃連 三錢

二味以麻沸湯一鍾漬之須臾絞去滓溫服

評曰大黃黃連苦寒以導瀉心下之熱而以麻沸湯漬

服者取其氣薄而瀉虛熱也

附子瀉心湯

百七十九心下痞而復惡寒汗出者若去附子名二黃瀉心湯

大黃 四錢

黃連

黃芩

附子

各二錢

先以水一鍾煮附子取半盞次以沸湯二盞漬三黃



南京中醫藥大學圖書館版權所有

許久絞去粗入附子汁和勻俟溫分二服

生薑瀉心湯 一百八十傷寒汗出解後胃中不和心下利下重

服

生薑 二錢

半夏

黃芩 各一錢五分

人參

黃連 各一錢

甘草 八分

大棗 二枚

右用水二鍾煎至一鍾溫服

半夏瀉心湯 一百八十一治心下痞滿軟而不痛

半夏 二錢五分

甘草 三錢

黃芩

乾薑

人參 各二錢

黃連 一錢

右薑棗水煎服

甘草瀉心湯 一百八十二傷寒中風而下之其人下利日數十行穀不化腹中鳴心下痞鞭而滿乾



嘔心煩不得安醫見心下痞謂病去未盡而復下之痞益甚此非結熱但胃中虛客氣上逆故便下

即半夏瀉心湯再加甘草一錢人參一錢五分

赤石禹餘糧湯

一百八十三傷寒服湯藥下利不止

止醫以理中與之利益甚常利小便

赤石脂

五錢

禹餘糧

四錢

右用水二鍾煎至八分溫服

評曰瀉可以去脫石脂之瀉以收欬重可以去怯餘

糧之重以固慎

旋覆代赭湯

一百八十四傷寒發汗若吐下解後心下痞鞭噫氣不除

旋覆花

一錢五分

人參

二錢

代赭石

一錢

甘草

八分

半夏

一錢



北京中醫藥大學圖書館藏

右加生薑三片大棗二枚水二鍾煎一鍾溫服

評曰鞭則寒堅旋覆花之鹹以栗痞鞭怯則氣浮代諸

之重以鎮虛逆生薑半夏之辛可以散虛痞人參其

大棗之甘以補胸弱

赤石脂丸

一百八十五治小便利瀉大便利謂之按熱自利

赤石脂

乾薑各一兩

黃連

當歸

各二兩

右為末蜜丸梧子大每服三十丸米飲下

桃花散

一百八十六治少陰下利膿血腹痛小便利下利不止脉沉血寒凝滯下必紫黑成塊或錐膿

血

赤石脂

五錢一半生燉入湯一半生為末

乾薑 二錢

糯米 一合



右水煎去粗入石脂生末調服

梔子豉湯

一百八十七發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反復顛倒懊懷宜用

梔子

五錢

香豉

一合

右用水二鍾先煎梔子至鍾半入豉煮至一鍾去滓溫服得吐止

評曰酸苦湧泄爲陰苦以湧吐寒以勝熱梔子豉相合吐劑宜矣

加減法

若少氣者加甘草名梔子甘草湯因熱傷氣也故加甘草嘔加生薑名梔子生薑湯因熱搏而氣逆故加生薑汗下後而煩熱胸中窒者宜服若傷寒五六日大下之

後身熱不去心中結痛未入解也宜下之

梔子厚朴湯

一百八十八傷寒下後心煩腹滿卧起不寒者宜服此

梔子

厚朴

生薑汁炒

枳實 楚炒

右用水二鍾煎至一鍾去滓溫服

評曰梔子之苦以湧虛煩厚朴枳實之苦以泄腹中滿

梔子乾薑湯

一百八十九醫家以丸藥下之身熱不去因而煩者宜用此

梔子

五錢

乾薑

三錢

右用水二鍾煎八分溫服得吐不再服

梔子仁湯

一百九十發狂煩躁面赤咽痛潮熱服此

梔子仁

炒

赤芍藥

炒

大青

知母

柴胡

一錢

甘草

五分



北京中醫藥大學圖書館藏

香豉

枝五十

右用水二鍾煎至一鍾去粗溫服

梔子升麻湯

一百九十一夏月感冒虛煩不止而渴

生地黃

梔子

升麻

柴胡

石膏

右用水二鍾煎至一鍾去粗溫服

梔子烏梅湯

一百九十二傷寒瘧後不得眠

梔子

黃芩

甘草

柴胡

錢各二

烏梅

二個

香豉

粒五十

右用水二鍾生薑三片竹葉二十五片煎一鍾溫服

梔子蘖皮湯

一百九十三傷寒身寒發熱及濕熱發黃者



南京中醫藥大學圖書館版權所有

梔子

五十

井草 二錢

黃蘗 一錢

右用水二鍾煎一鍾溫服

凡大便先微溏者不可服梔子湯

梔子鼓枳實湯

一百九十四治
勞復發熱

山梔

枳實 各一錢

香鼓 五錢

右水煎服取微汗

評曰熱聚於上以苦吐之熱散於表以苦發之經曰火淫所勝苦以發之是也

梔子鼓枳黃湯

一斤九十五治
食復發熱

山梔

枳殼

柴胡 各一錢

香鼓

五錢

大黃

三錢人壯積
堅者五錢



南京中医药大学图书馆版权所有

右水煎溫服內熱加黃芩腹脹加厚朴傷肉加山查

傷麵飯加神麴

理中湯

一百九十六霍亂頭疼發熱身痛熱多欲飲水者

五苓散若寒多不用水者此藥主之傷寒

人參

白朮

乾薑

各三錢

甘草

炙二錢

評曰脾欲緩急食甘以緩之用人參白朮甘草之甘以緩脾補中寒淫所勝平以辛熱乾薑之辛以溫胃散寒

加減法

若臍下築者腎氣動也去朮加桂一錢吐多去朮加生薑一錢下多者還用白朮悸者加茯苓一錢渴欲飲水



者加二錢腹中痛者加人參一錢腹滿者去朮加附子
三片服湯後如食頃飲熱粥一碗許微自溫寒甚加乾
薑一錢

加味理中湯

一百九十七足太陰脾經受濕自利不渴手足溫身無熱脈來沉而無力此屬臟寒

即理中湯加陳皮茯苓肉桂

右用水二鍾薑一片棗二枚煎至一鍾臨服入炒陳
壁土一匙以助胃氣

加減法

厥陰消渴氣衝心腹不欲食食即吐蛇腹痛大便實者
本方知大黃蜜少許利之若蜷卧沉重利不止少加附
子利後身體痛者急加附子溫之自利腹痛者入朮香

磨薑汁和之

理中加茵陳湯

一百九十八傷冷中寒
脉弱氣虛變為陰黃

即理中湯加茵陳

二錢

煎法如前

理中石膏湯

一百九十九霍亂
煩渴有熱轉筋

即理中湯加石膏

二錢

煎法如前

增損理中湯

二百太陰病下
之胸滿鞭

即理中湯加黃芩

錢炒二

枳殼

錢炒二

右為末蜜丸如彈大沸湯溶化渴者加天花粉一錢

汗出者加牡蠣一錢



南京中醫藥大學圖書館版權所有

四順湯 二百一 身無熱 脉沉 嘿嘿不効
見光明腹滿下利手足逆冷

即理中湯加甘草一倍

依本方煎服

四順丸 二百二 少陰病十餘日下利
不止手足微冷者作丸服

即理中湯加甘草蜜九日夜三凡

羌活附子湯 二百三 治胃寒欬
逆脉遲厥逆

羌活 附子 乾薑

茴香 木香 各五錢 四錢

右用水二鍾半煎至一鍾每服五錢鹽二捻涼服

附子湯 二百四 少陰病得之一二日口中背惡寒者
高

陽消陰此湯
濕經散寒



附子

去皮破四片

人參

茯苓

各二錢

白朮

芍藥

各二錢

右用水二鍾煎一鍾溫服

評曰辛以散之附子之辛以散寒其以緩之茯苓參

之其以補陽酸以收之芍藥之酸以扶陰所以然者偏

陰偏陽則為疾火欲實水當平不欲其偏勝也

附朮散

二百五治傷寒柔痙手足逆冷筋脉拘急汗出不止時發時止不食下利者難治如痙之輕者剛

柔痙用九味羌活湯加減

附子

白朮

各一錢

獨活

五分

川芎

三分

桂心

二分

右加棗二枚水煎

術附湯

二百六治中濕一身盡痛發熱身黃多煩脉浮而緩

白朮

三錢

附子

二錢

甘草

一錢

右薑棗水煎

甘草附子湯

二百七風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸

風不欲去衣濕勝則小便不利或身微腫是以用

桂枝甘草之辛甘散風寒以因衛附子白朮之辛

甘草

附子

白朮

各二錢

桂枝

四錢

右水煎溫服得微汗即解

附子防風湯

二百八治傷寒榮症開目合面手足厥逆筋脉拘急汗出不止

附子

防風

川芎



白朮

白茯苓

乾薑

桂心

柴胡

甘草

各七

五味子 九粒

右薑水煎如汗不出者去防風加麻黃五分薑桂

用三分

乾薑附子湯

二百九下後復汗晝煩躁不眠夜而安靜不嘔不渴脉沉微身無大熱無表證者服此

乾薑 五錢

附子 一枚生用去皮披三片

右用水二鍾煎法如前溫服

評曰寒淫所勝平以辛熱虛寒太甚是以辛熱劑勝之

也

芍藥甘草附子湯

二百十傷寒發汗後病不解反惡寒乃虛也或無已云發汗病解則不惡寒



發汗後不解表實者亦不惡寒今發汗病且不
反惡寒者榮衛俱虛也汗出則榮虛惡寒則衛
補榮衛此以

芍藥

二錢

甘草

炙一錢

附子

皮一枚炮

右用水二鍾煎法如前

評曰芍藥之酸以飲津液而益榮附子之辛溫固陽氣
而補衛甘草之甘調和辛酸而安正氣

薑附湯

二百一十一治直中陰經真寒證如
厥逆脈不至者加甘草一倍

乾薑

兩

生附

一個

右水三盞煎至一盞去粗頓服

九味桂附湯

二百一十二

治足少陰傷風胸膈滿心煩咽痛自
汗腰連脛骨酸痛嘔吐涎沫頭痛脈沉而

弦

