

註  
解  
傷  
寒  
論

註解傷寒論卷第六

漢張仲景著

晉王叔和撰次

宋成無已註

明汪濟川校正

辨太陰脉證并治第十

太陰之爲病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自  
痛若下之必胃下結鞭

太陰爲病陽邪傳裏也太陰之脉布胃中邪氣  
壅而爲腹滿上不得降者嘔吐而食不下下不  
得升者自利益甚時腹自痛陰塞在內而爲腹  
痛者則爲常痛此陽邪干裏雖痛而亦不常痛

但時時腹自痛也若下之則陰邪留於胃下爲結鞭經曰病發於陰而反下之因作痞

太陰中風四肢煩疼陽微陰澁而長者爲欲愈

太陰脾也主營四末太陰中風四肢煩疼者風淫末疾也表邪少則微裏向和則澁而長長者陽也陰病見陽脉則生以陰得陽則解故云欲愈

太陰病欲解時從亥至丑上

脾爲陰土王於丑亥子向陽故云解時

太陰病脉浮者可發汗宜桂枝湯

經曰浮爲在表沉爲在裏太陰病脉浮者邪在經也故當汗散之

自利不渴者屬太陰以其藏有寒故也當溫之宜服四逆輩

自利而渴者屬少陰爲寒在下焦自利不渴者屬太陰爲寒在中焦與四逆等湯以溫其藏

傷寒脉浮而緩手足自溫者繫在太陰太陰當發身黃若小便自利者不能發黃至七八日雖暴煩下利日十餘行必自止以脾家實腐穢當去故也太陰病至七八日大便鞮者爲太陰入府傳於

陽明也今至七八日暴煩下利十餘行者脾家  
實腐穢去也下利煩燥者死此以脾氣和逐邪  
下泄故雖暴煩下利日十餘行而利必自止  
本太陽病醫反下之因而腹滿時痛者屬太陰也  
桂枝加芍藥湯主之

表邪未罷醫下之邪因乘虛傳於太陰裏氣不  
和故腹滿時痛與桂枝湯以解表加芍藥以和  
裏

太實痛者桂枝加大黃湯主之

大實大滿自可除下之故加大黃以下大實

太陰爲病脉弱其人續自便利設當行大黃芍藥者宜減之以其人胃氣弱易動故也

腹滿痛者太陰病也脉弱其人續自便利則邪雖在裏未成大實欲與大黃芍藥攻滿痛者宜少與之以胃氣尚弱易爲動利也

辨少陰病脉證并治第十一

少陰之爲病脉微細但欲寐也

少陰爲病脉微細爲邪氣傳裏深也衛氣行於陽則寤行於陰則寐邪傳少陰則氣行於陰而不行於陽故但欲寐

少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也虛故引水自救若小便色白者少陰病形悉具小便白者以下焦虛有寒不能制水故令色白也

欲吐不吐心煩者表邪傳裏也若腹滿痛則屬太陰此但欲寐則知屬少陰五六日邪傳少陰之時自利不渴者寒在中焦屬太陰此自利而渴爲寒在下焦屬少陰腎虛水燥渴欲引水自救下焦虛寒不能制水小便色白也經曰下利欲飲水者以有熱故也此下利雖渴然以小便

色白明非裏熱不可不察

病人脉陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復吐利

脉陰陽俱緊爲少陰傷寒法當無汗反汗出者陽虛不固也故云亡陽以無陽陰獨是屬少陰內經曰邪客少陰之絡令人嗌痛不可內食少陰寒甚是當咽痛而復吐利

少陰病欬而下利譏語者被火氣劫故也小便必難以強責少陰汗也

欬而下利裏寒而亡津液也反以火劫強責少

陰汗者津液內竭加火氣煩之故讖語小便難也

少陰病脉細沉數病爲在裏不可發汗

少陰病始得之反發熱脉沉者爲邪在經可與麻黃附子細辛湯發汗此少陰病脉細沉數爲病在裏故不可發汗

少陰病脉微不可發汗亡陽故也陽已虛尺脉弱瀋者復不可下之

脉微爲亡陽表虛不可發汗脉弱瀋爲亡陽裏虛復不可下

少陰病脉緊至七八日自下利脉暴微手足反温  
脉緊反去者爲欲解也雖煩下利必自愈

少陰病脉緊者寒甚也至七八日傳經盡欲解  
之時自下利脉暴微者寒氣得泄也若陰寒勝  
正陽虛而泄者則手足厥而脉緊不去今手足  
反温脉緊反去知陽氣復寒氣去故爲欲解下  
利煩燥者逆此正勝邪微雖煩下利必自止

少陰病下利若利自止惡寒而蹇卧手足温者可  
治

少陰病下利惡寒蹇卧寒極而陰勝也利自止

手足溫者裏和陽氣得復故爲可治

少陰病惡寒而踈時自煩欲去衣被者可治

惡寒而踈陰寒甚也時時自煩欲去衣被爲陽氣得復故云可治

少陰中風脈陽微陰浮者爲欲愈

少陰中風陽脈當浮而陽脈微者表邪緩也陰脈當沉而陰脈浮者裏氣和也陽中有陰陰中有陽陰陽調和故爲欲愈

少陰病欲解時從子至寅上

陽生於子子爲一陽丑爲二陽寅爲三陽少陰

解於此者陰得陽則解也

少陰病吐利手足不逆冷反發熱者不死脉不至者灸少陰七壯

經曰少陰病吐利躁煩四逆者死吐利手足不厥冷者則陽氣不衰雖反發熱不死脉不至者吐利暴虛也灸少陰七壯以通其脉

少陰病八九日一身手足盡熱者以熱在膀胱必便血也

膀胱太陽也少陰太陽爲表裏少陰病至八九日寒邪變熱復傳太陽太陽爲諸陽主氣熱在

太陽故一身手足盡熱太陽經多血少氣爲熱  
所乘則血散下行必便血也

少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何  
道出或從口鼻或從目出是名下厥上竭爲難治  
但厥無汗熱行於裏也而強發汗虛其經絡熱  
乘經虛迫血妄行從虛而出或從口鼻或從目  
出諸厥者皆屬於下但厥爲下厥血亡於上爲  
上竭傷氣損血邪甚正虛故爲難治

少陰病惡寒身踈而利手足逆冷者不治

針經曰多熱者易已多寒者難已此內外寒極

純陰無陽故云不治

少陰病吐利燥煩四逆者死

吐利者寒甚於裏四逆者寒甚於表躁煩則陽氣欲絕是知死矣

少陰病下利止而頭眩時時自冒者死

下利止則水穀竭眩冒則陽氣脫故死

少陰病四逆惡寒而身踈脈不至不煩而躁者死

四逆惡寒而身踈則寒甚脈不至則真氣絕煩

熱也躁亂也若憤躁之躁從煩至躁爲熱來有

漸則猶可不煩而躁是氣欲脫而爭也譬猶燈

將滅而暴明其能久乎

少陰病六七日息高者死

腎爲生氣之源呼吸之門少陰病六七日不愈而息高者生氣斷絕也

少陰病脉微細沉但欲卧汗出不煩自欲吐至五六日自利復煩躁不得卧寐者死

陰氣方盛至五六日傳經盡陽氣得復則愈反更自利煩燥不得卧寐則正氣弱陽不能復病勝藏故死

少陰病始得之反發熱脉沉者麻黃附子細辛湯

主之

少陰病當無熱惡寒反發熱者邪在表也雖脉沉以始得則邪氣未深亦當溫劑發汗以散之  
麻黃附子細辛湯方

麻黃

二兩去節甘熱

細辛

二兩辛熱

附子

一枚炮去破八片辛熱

皮

內經曰寒淫於內治以甘熱佐以苦辛以辛潤之麻黃之甘以解少陰之寒細辛附子之辛以溫少陰之經

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內藥煮取三升去滓溫服一升日三服

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以  
二三日無裏證故微發汗也

二三日邪未深也既無吐利厥逆諸裏證則可  
與麻黃附子甘草湯微汗以散之

麻黃附子甘草湯方

麻黃

二兩  
去節

甘草

二兩  
炙

附子

一枚  
炮  
去皮

麻黃甘草之甘以散表寒附子之辛以溫寒氣  
右三味以水七升先煮麻黃一兩沸去上沫內諸  
藥煮取三升去滓溫服一升日三服

少陰病得之二三日以上心中煩不得卧黃連阿