

加減湯散

愚謂人之病於身

血氣

寒熱虛實六字而已。

病症千般

不外乎是。夫治之理。寒者溫之。熱者清之。虛者補之。實者瀉之。此一條大路而無滯曲也。徧觀諸方書中。湯散多有溫涼并用。表裏同施。或不辨氣血之偏勝。純行剋伐者有之。或不分臟腑之虛實。補瀉混用者有之。或十餘味。二十味者。立湯散之名。思之。古人設一攔江網。待愚昧者之為醫也。若明白者。何必以古人之規耳。且湯散中藥多性雜。不相對病者。反致元



神之益虧也。是故將首用湯方。加減一二。庶得原情。合病云耳。

加減湯散目錄

加減六味地黃湯

加減四物湯

加減四君子湯

加減附子理中湯

加減承氣湯

加減麻黃湯

加減桂枝湯

加減九味羌活湯

加減換柳丸

加減十棗湯

加減小柴胡湯

加減大柴胡湯



加減五積散

加減參蘘飲

加減逍遙散

加減蘘子降氣湯

加減小續命湯

加減大秦芎湯

加減順風勻氣散

加減獨活寄生湯

加減回陽救急湯

加減導氣湯

加減四神丸

加減活血潤腸生津飲

加減消渴方

加減清暑益氣飲

加減白虎湯

加減竹葉石膏湯

加減瀉白散

加黃連解毒湯



加減平胃散

加減二陳湯

加減清脾飲

加減常山飲

愚按六味地黃湯者原因腎經虛弱水不制火而五也。今人不識分辨陰陽舉手錯亂。一遇虛弱之症及久病未能取効者。或不知病之名者。概以六味地黃湯加減用之。或加減為丸料。或純以六味地黃湯為煎劑為丸料者。是陰虛火炎者相宜。若是陽虛氣陷者用之。反致陽衰陰旺。喚起偏勝之患出也。又有將六味地黃丸經數年服者。有經一二十年服者。未見



功效者多。但六味中功雖補陰。惟澤瀉味不當用於
腎虛水弱湯中。察澤瀉之性。雖瀉陰火。實瀉腎之元
神。如腎虛水弱之火。豈堪瀉乎。設遇陽虛體弱。中氣
下陷者。服之。則氣益陷。而腎水又受瀉。以一藥而二
者受害。尤致精滑不可勝言矣。處方者當未及深思
耶。或是體健相火炎者。愛以六味滋養其身。於中澤
瀉只可須微用之耳。理宜去澤瀉。易車前。車前之性
走溺竅。閉精竅。是易為當也。

熟地

錢二

山萸

分六

山藥

錢二

茯苓

分八

丹皮

分八

車前

分八

四物湯

愚按四物湯者。因血分虛弱而立也。但血霸熱生。火
必上炎。脈必數而洪大。迫經脈中。氣血奔騰。前走過
行。度數矣。四物湯用生地當歸白芍皆能養血。血得
生而熱自平。不當用川芎。川芎之性。雖養血而長於
催行。血虛度數已過。行何得又催行乎。理去川芎。換
丹參。丹參之性能和血。又降血中伏熱。易之當也。及
中古之士。有將四物湯提說者。不言及川芎。反以白
芍酸斂微寒。諄諄為戒。並不知經脈中氣血流行度



數之過不及者。徒以酸斂微寒而言。及於無益哉。然血虛則熱生。正宜白芍之寒以平之。血虛則脉弱行度數。正宜白芍之斂以挽回之。又言四物湯者。男子多腎虛宜熟地。女人多血熱宜生地。夫男子豈無血熱。女子豈無腎虛。何必分其男女而徒膠柱鼓瑟之。樊也。

生地二錢 當歸一錢 白芍二錢 丹參八分

四君子湯

愚按四君子湯者。因陽氣虛弱而立也。但氣虛則虛

寒生病。必脹滿飽悶。四君子湯中有人參白朮茯苓。以輔正氣。則元陽回而虛寒充也。方中何以用甘草。甘草性甘。甘能作脹。又且緩中。而虛寒之脹滿飽悶。反以甘緩。留之乎。看世人處方。必用甘草來調和。諸藥之性。誠能處方合宜。何必用之調和乎。如人家道本和睦親仁。何必傍人之調釋。哂爾愛用甘草者。緣脉理未明。寒熱未分。症候未別。用藥未決。畏首畏尾。之徒。將以甘草來調用藥之不相合宜耳。且氣虛則寒。行度有差。脉必遲而無力。四君子湯宜也。惟去甘

草之平淡。易以香附。香附之性能行諸氣。本方有參
朮以輔正。則元氣之行自然合度。何憂乎病之不効也。

人參

錢_二

白朮

錢_二

茯苓

錢_二

香附

八分

以姜汁炒之

附子理中湯

愚按附子理中湯者。理中焦之寒冷也。夫寒冷之邪
有內外之殊。外入者風邪干犯。入臟腑筋骨也。内生
者氣虛則虛寒生。致臟腑空角之處。少元神之充備
而陰寒繫焉。病則脹滿虛痛。湯中有人參白朮以輔
正。用乾姜以溫中。則元神充而寒邪散也。何以用甘



草甘能作脹。反助寒涼之脹滿乎。理去甘草換厚朴。厚朴之性散寒除脹。溫胃和中。改之宜也。本方加附子名曰附子理中湯。全得溫中之理。然按此湯可施於臟腑虛寒者是也。如外入寒邪致筋骨之深者。宜加升散之品。方能提出於外也。

人參錢二 白朮錢二 乾姜錢二 附子八分 厚朴錢二

承氣湯

愚按承氣湯者。因壅滯閉結之邪而立也。夫閉結者是熱為害。日積月累。其來久矣。煎燉血液。腸胃枯澀。

熱邪伏翕於腸胃之間。故立承氣湯者。以承順其氣。而推蕩之也。然湯中用大黃。芒硝。枳殼。皆剋伐腸胃之品。實似陸地行舟。舟行而地多坑陷之虧。閉結雖通。難免腸胃中已虧之津液。今更耗也。宜加生地。當歸。白芍。麻仁。以養血潤腸。任熱結之邪不勞而下也。守承氣者是壯健之人。新結之邪。施之猶可。倘遇久病虛弱之閉者。均用之。雖然通後。氣血被傷。臟腑受伐。安得不復結乎哉。

大黃錢二 芒硝錢二 厚朴錢二 枳殼錢二 當歸錢二 生地錢二

麻仁錢

麻黃湯

愚按麻黃湯者為風寒之邪入太陽經絡而立也。而
則頭項痛腰脊強。湯中用麻黃加葱白以發太陽經
之邪從汗而解。但太陽經有寒邪。必咳嗽痰涎。則上
焦濕而且潤矣。何得用杏仁之潤品。既用麻黃湯發
太陽經之汗。使邪從汗解。速治之法。免引入陽明經。
何得用桂枝監之。又使不發。觀之此法。甚非順性之
理。似乎行舟拉緯式。用一上水緯用一下水緯之拙。



也。又何得用甘草緩之。豈番以再傳乎。使愚亦未敢
輕用麻黃湯之弊也。究寒邪入太陽經。其脉必遲而
有力。此湯中理去桂枝杏仁甘草不當之味。易番附
以行氣。加川芎以行血。加紫蘓以溫中散寒。使氣血
流行。邪自無番焉。但此症如少腹疼痛。為邪入太陽
之腑也。

麻黃分八紫蘓分八香附分三川芎錢二

桂枝湯

愚按桂枝湯者。原為太陽經傷風而立也。如見症咳

嗽鼻塞聲重皆是肺病。搃之陽虛者皮毛不固。風邪
易入。故爾自汗。與太陽經何相關乎。用桂枝者。作桂
枝性通血脉。則風邪隨氣血流行。而出汗自止也。定
傷風脉息屬遲為寒也。何得以芍藥血分之味。血得
生而氣益弱。且芍藥性斂酸微寒。與遲脉之風邪度
行有差者之不相宜。反致陰旺陽虧之弊也。如啖嗽
鼻塞痰涎聲重胸滿之病。用甘草以和緩之。是謂留
病於身也。又用棗子引以補脾。脾得生而痰涎更壅
也。此湯之治太陽經全非太陽經之病也。致中古之

士每每多疑麻黃桂枝二湯用之無所取効而捨之矣。理去芍藥甘草。梔子引加防風。荆芥以疎風理血。加紫蘂以溫中達表。加半夏以除痰。仍姜引以散寒。如斯之用。得合傷風之症者也。若陽虛氣弱之人。而得傷風者。自有補中益氣湯脩焉。

桂枝

分八

防風

分八

荆芥

分八

紫蘂

分六

半夏

分八

姜引

九味羌活湯

愚按九味羌活湯者。因三陽經之風寒。與四時氣令通用之而立也。其於湯中羌活。防風。細辛。白芷。蒼朮。



固宜。何以用黃芩之涼味。又用生地之涼血熱於風寒之中。豈相宜乎。或寒包火者。用之猶可。又何以用甘草緩。番乎。理去黃芩生地。甘草不當之味。加香附青皮。以行氣。內有蘊熱。加木通。以分利。則風寒散而熱邪去。方可通治四時之方法也。

羌活分八 防風分八 細辛分六 白芷分六 香附錢乙 川芎錢乙

青皮分八 木通分五 蒼朮錢乙

檳榔丸

愚按木香檳榔者。因熱邪積滯。干犯腸胃。而成痢者。



設也。夫熱邪久居腸胃。則精津血液枯槁空乏。是以得斯症者。難治之候。危亡之秋也。而湯中首用木香。且以之立丸。名竟不知木香之性。偏於辛熱。值此枯燥之腸胃。反以木香燥之。是將以熱濟熱。處方者誠何心歟。內用檳榔。枳殼。山萸。莪朮。黑丑。大黃。芒硝之猛味。推蕩熱邪。不無誅伐太過。值此有病之臟腑。氣血焉受勇猛之過伐乎。歷見醫者。一見痢疾。輒以木香。檳榔。丸為首曲。且隨之囊雜。以煎劑中。不與病家言者。若是強實新邪。雖然應効。而元神亦受其虧。若