

外科集腋

卷五

一
(缺)



外科集腋卷五目錄

上中下發

對心發

背脊生蛇

蓮子蜂窠發

羊毛疔

兩頭尖

癰瘤發

體發疽

陰陽疽

陰陽二氣疽

特疽

黃瓜癰

丹發疽

酒毒發

上搭

中搭

下搭

左右串搭

癰疽發

禽疽

九疽

脊縫生虱

肉龜瘡

老鼠攢

淵疽

石疽

腎俞發

對臍發

陰毒

無名腫毒

鵝口疽

尾閭發

環跳發

髌癰

股陽疽

騎馬癰

坐馬癰

上馬癰下馬癰

湧泉疽

穿襠發

懸癰

坐板瘡

寒火癰

風疔

猴子疔

臍毒

截腸

脫肛

臍頭風

痔瘡

腸風

骨痿瘡

玄疽

陰疽

多骨疽

咬骨疽

箕門癰

腿遊風

肚門癰

黃鰵癰

大腿癰

附骨疽

肉蜈蜂

伏兔疽

骨槽疽

下石疽

緩疽

膝蓋毒

膝眼毒

膝眼風

鶴膝風

人面瘡

上水魚

下疳瘡癰

委中毒

四灣風

流火

三里發

合陽疽

脚氣瘡

臙瘡

濕腫

血槽風

爛皮濕熱

腎臟風

腎氣遊風

濕毒流注

附陰疽

瓜藤癰

接骨發

魚肚發

脾膈疽

青蛇便

黃鰓癰

鱗漏

脛疽

驢眼瘡

脚氣

風疽

內踝疽

外踝疽

穿踝疽

足發背

旁疽

厲癰



牛程躩

足眼疽

流水藤根瘡

土栗

湧泉疽

田螺泡

癰發

青蛙毒

足疔怪病

冷疔

伏鼠疽

脫疽

敦疽

青蛇頭

臭田螺

脚丫毒

脚丫癢爛

甲疽

鷄眼

遠行起泡

四肢節脫

四肢如石

足脫

濕火成瘤

腳板色紅

外科集腋卷五

梁溪張景顏閻賓纂輯

暨陽

吳景范

參訂

繆遂良秉初

宛陵俞宗和添新

校正

錫山李景文雲岩

男

繼綱冠倫
繼栢南喬

同校

上中下發

上發傷於肺。中發傷於肝。下發傷於腎。其種有五。一風熱毒。赤

紫如焰。膿毒難成。防其內陷。裏托爲要。二陰冷毒。初如黍粒。痛應前心。頭目昏重。寒熱如瘧。五七日後始發腫濶。安補氣內托得膿爲吉。三金石毒。多服燒煉。初如丹疹。漸濶漸圓。面色如硃。心膈煩躁。其瘡難起。起卽驚人。宜解藥毒。四酒積毒。醉後當風房室不禁。脾虛少食。發毒攻背。初如小彈。漸大而堅。四肢拘急。口苦舌乾。遍身虛腫。泄瀉如利。內急痛者。宜攻腫發穴。五瘡瘍毒。初如靴皮。頑硬如石。數日之後。寒熱似瘧。毒卽起發。色變青白。狀如拳打。如眼黑頭動。口偏。手足厥逆。此內有風邪相搏。急破出青血四五升。內托趕膿爲妙。凡此

陰症變陽則生。陽症變陰則死。陽症形高腫大。脉必堅實。潰爛多膿。收口時身必輕爽。陰症形多平塌。脉必浮大。初起必癢。潰爛出血。收口時身必沉重。凡背疽初起。不腫不痛。身體不熱。自覺倦怠。日漸開大。低陷敗壞。毒氣內攻。散入四肢。頭面虛腫。聲嘶氣脫。眼睛黑小。十指腫焦。此為內發。皆屬不治。急救湯。治三發初起並效。

金銀花 二兩

茜草

甘菊

桔梗

天花粉

甘草

各三錢

貝母

二錢

黃

栢 一錢

紫花地丁

一兩

水煎三劑

治陰毒方

人參

黃耆

各二兩

金銀花

八兩

白

芍

花粉

甘草

各五錢

荊芥炭

三錢

柴

胡

附子

一錢

水十碗煎二碗服

回陽救胃湯

治瘡口黑爛直至肺腑陰虛無陽胃氣未絕者

人參

熟地

麥冬

各二兩

黃耆

歸身

萸肉

各一兩

白朮

金銀花

各四兩



遠志

肉桂

茯苓

各二錢

五味子

一錢

回陽救陰湯

治背疽將愈瘡口不斂陰虛似陽之症

麥冬

黃肉

金銀花

歸身

各一兩

熟地

二兩

人參

白朮

各五錢

肉桂

一錢

又方治瘡口已平因犯色慾開裂流紅

人參

四兩

黃膏

三兩

當歸

麥冬

白朮

金銀花

各二兩

茯苓

一兩

山茱萸

五錢

肉桂

三錢

五味

二錢

驗方

治大潰僅存皮膜臨危者胸腹皆效



鯽魚

去腸實以山羊糞貯碗內烘焦

研末搽之另以山羊糞晒炒爲末

用大棗肉打丸每服四錢黑棗湯下

背疽惡瘡

用糞坑底泥陰乾爲末水調敷之其痛立止

癰疽發背

用白桐葉醋蒸帖上熱退止痛漸漸生肌

又方

乳香

去油

沒藥

去油

白兒茶

銀硃

鉛粉

黃丹

各四兩

銅綠

三錢



共研末麻油調稠攤紙貼之

背疽初起爛開不止 用白鹽梅皂角燒存性等分研末不

熱者米醋調塗四圍連換

背疽黑色不痛 用艾一觔硫黃雄黃各五錢水十碗煮艾半

日均勻搗爛敷之連換十餘次知痛者生不痛出紫血者死

瘡頭冷者用乾薑研末鷄蛋清調敷四圍如其潰爛猪蹄湯洗

隔皮取膿法

驢

蹄

炙一兩

蕎麥麪

炒二兩

白

鹽

五錢

地丁草

三錢

共爲末水調作餅慢火炙黃研細醋調敷之



麵消散

用麵調勻圈住瘡根將黃蠟薄片鋪平圈內勿使滲漏以炭火熏變青黑色乃毒氣出也如法行三五次俟蠟不變青色內卽消矣

對心發

對心發由心火妄動熱結所致治當大降心火急疎蘊熱頂用針通隨行拔法此穴背脊深固最難起發十五日後得膿爲吉如至期變症堅硬漸大不作膿者死

背脊生蛇

背脊先痛後腫如蛇形尺餘。豎在脊中。預煎人參一兩。附子一錢。夏製南星各三錢。用刀輕輕破皮。俟蛇出服之。

蓮子蜂窩發

蓮子蜂窩發。由手太陰肺經積熱所致。與心相近。與脊中連。輕者形長高腫。重者形斜平塌。孔似蜂窩。突若蓮子。急宜護心護膜。如瘡頭向上。串流肩膊。兩頭開發。無膿穿膜者。慘。

羊毛疔

羊毛疔。生前心後心。紅點爛斑。寒熱交作。宜用衣針挑出黑毛。黑荳蕎麥粉塗之。



兩頭尖

兩頭尖。因素飡辛熱。及氣虛所致。形多開口而濶。上可至肩。下可至腰。低陷黑暗者死。治同癰疽。

癭瘤發

癭瘤發。生脊之正中。大柱陶道身柱三穴之端。此陽維之海。督脉所絡之處。是爲凶症。急宜托之。

體發疽

體發疽。生肺肝二俞。在高骨之傍。足太陽膀胱經症。肉色不變。麻木微癢。頑如牛皮。由盛暑感觸穢氣。及鬱怒所致。七日內

膿未成宜蒜灸。灸而起發者可治。服汗劑得汗生。無汗死。服補劑紅活知痛者生。膨脹不食乾枯黑陷者死。

陰陽疽

陰陽疽由七情內乖陰陽不和所致。背上麻木時腫時塌。乍寒乍熱。此症必神清大渴。脉靜者生。昏迷煩躁。飲食不進者死。

陰陽二氣疽

陰陽二氣疽。廣濶滿背。大小腫脹不常。十日刺之有膿者生。無膿發渴。體倦者死。

特疽

