

救急選方全

亥 22  
23-11



南京中医药大学图书馆版权所有



南京中医药大学  
南京中医药大学图书馆版权所有

中醫之精湛淵博。漸爲世界所注意。然歐美之所研究者藥物而止。日本則進乎理論之探討。歐美之所獲者僅當最近期間。日本則遠在明治維新之前。因維新而廢漢醫。因廢漢醫而感受西方醫學之不完美而復有復興皇漢醫學之舉。則其甘苦備嘗中西醫價值之比較。尤爲親切顯著焉。是故我國醫界欲求改進。最適宜之參攷。厥爲日本漢醫之述作。本局有鑒於此。爰有皇漢醫學編譯社之組織。廣求彼土之名著。以供他山之攻錯。先印津修堂醫學叢書十三種。書爲丹波元簡畢生心血之所聚。攷古精覈。持理平正。方藥純粹。審定謹嚴。求之我國。鮮出其右。宜乎楊守敬稱其有三美。洵非虛語也。印竣爲述崖略。以告世之愛護。而有志中醫者。嗣後會當陸續編譯。以期蔚爲大成。發揚中醫。固中醫。倘其嚆矢乎。

中華民國二十四年十月上海中醫書局謹誌



# 救急選方序

華元化曰。人有危病。急如風雨。命醫不及。須臾不救。觀其橫夭。實可哀憐。先府君有深慨於斯。因撰國字方書三卷。寬政初。鏤版於醫學以傳。於是自通邑大都。以及窮陬僻壤。藉此而全活者。陸續尤多。乃爲世之鴻寶焉。而又將別編一書。以資醫家應急之便。有志而不果。無何罹沉疴。今年夏五溢逝。簡泣血之餘。念所以仰承先志。質性鈍齷。不能紹述其萬一。尙何有所發揮也。嘗歷覩今代醫師。孰不研其學。而逞其技。以理療危險之疚難。而至其稍羸者。則有宿食在上脘。宜用鹽湯。若瓜蒂涌吐之。而却用備急升降乖錯。闕焉而死者。有中風脫證。當與參附峻補之。而認爲發痧。挑血而立斃者。霍亂不辨乾溼。驚風不別急慢。疔瘡灼艾。火燒貼膏之類。亦間有焉。又至其最下者。則遘卒暴之病。少異於尋常者。矇昧不知所出。孟浪處措。或至殞命。歸之于天。恬不爲怪。爲醫如斯。不獲罪於冥冥者。幾希。此無他。因不講明。救卒拯急之術。於素常也。而世所傳。如

救急易方。雖名曰救急。其實不論病之緩急。採輯方藥單省。倉卒易辦者。以具各門。不足耑爲危急諸疾之備也。簡丁艱以來臥病者五閱月。其間時時披閱。架藏諸書於危證門中。遴擇最簡捷者。勒爲上下編。名曰救急選方。唯空摺。不精掛一漏百。未知副先志否。九原叵起。趨庭無期。徒增慟哭而已。然竊意斯書諸方。悉是前賢所詒。已述其明驗。而有試之于今。其效應如影響者。後進之士。常熟此編。能諳其證理。預備其藥劑。則奏回天之功。於逡巡咄嗟之間者。或有之矣。雖然。古人有言曰。病之變狀。不可一概言之。所以醫方千卷。猶未盡其理。若至臨其變。則當推未盡之理。而運用之。圓機之妙。在於神悟矣。

享和紀元冬十一月望丹波元簡廉夫撰

# 救急選方凡例

一是書耑爲拯救危之備焉。凡閒暇之時。宜繙閱之。知某法可以療某病。某物可以理某證。留心記憶。或預畜。或預製。一遇危急。察脈揣腹。審辨甄別。卽與拯救耳。卒病暴疚。或有萬無生機。而翻然致甦者。則呻吟窘迫。呼吸危亡之際。須竭心力。死中求活。此仁人之心術。先府君所以深望於醫家輩。簡區區。所以葺此書之一大關鍵也。

一病有陰陽塞脫之不同。倉猝之際。或難辨認者。間揭其厓略。以爲蒙學指南。一中風脚氣之類。證候多端。茲彙輯倉皇拯救諸方而已。其稍涉輕緩。可以從容調理者。概置不錄。

一輯仲景而降歷代諸方。旁及

本邦所傳。有一證而臚列數方者。非鷺博也。地異產殊。時移物換。此之所有。彼之所無。欲因便取材耳。是乃拯救危之本意也。

一每方各註所出書目。然多隨見採摘。未遑一一尋究。恐未免差錯。且如拯救諸法。有疎于前。而詳于後者。今特採其詳。而切乎施用者。不拘於出典之前後。又如本草綱目附方。盡載出典。而其元書佚于今。而無由乎讎對詳明者。姑以本草附方四字概之。

一金瘡癩撲疔瘡。獨輯內科方。至如貼敷膏散等。責在瘡醫。故一概不錄。一分兩升合。隨時更變。輕重不等。今每方直依元書而載之。不敢以意改易。用者當視病淺深。察藥柔峻。酌古準今。以從俗便。

一纂本未繕。及門湊催傳佈。歲工入梓。如其遺漏。當爲續方而嗣刻。丹波元簡識

# 救急選方目錄

卷上

諸卒死門

五絕死門

脫陽門

癲癇門

中暑喝死門

攬腸沙門

諸卒失血門

急喉痹門

卒暴雜證門

附  
卒轉筋

卒牙  
瘡  
瘻  
急  
暴  
盲  
舌  
瘡  
毒  
內  
攻

附  
卒腫  
目  
睛  
突  
出  
傷  
寒  
并  
熱  
落  
霍  
亂

小兒急證門

中惡門

卒中風門

諸厥門

中寒凍死門

霍亂門

腳氣衝心門

卒心腹痛門

附  
卒積  
疝氣  
奔鬱  
厥冒

小便急閉門

附  
卒腫  
目  
睛  
突  
出  
傷  
寒  
并  
熱  
落  
霍  
亂

婦人急證門

卷下

疔瘡急證門

金瘡撻撲門

湯火傷門

破傷風門

諸物入耳門

附  
眼  
被  
物  
入  
鼻  
頭  
竹  
筒  
白  
入  
物  
撞  
着  
目

諸物哽噎門

中藥毒門

誤吞諸物門

諸物入肉門

中飲食毒門

總三十門

救急選方目錄終

# 救急選方卷上

津修堂醫學叢書  
第十一  
丹波元簡廉夫 撰

## 諸卒死門

三物備急丸 金匱主心腹卒暴百病。若中惡客忤。心腹脹滿。卒痛如錐刺。氣急口噤。停尸卒死。

大黃 一兩

乾薑 一兩

巴豆 一兩去皮心

熬外研如脂

右藥各須精新。先擣大黃乾薑爲末。研巴豆納中。合治一千杵。用爲散。蜜和丸亦佳。密器中貯之。莫令歇氣。○主心腹諸卒暴百病。若中惡客忤。心腹脹滿。卒痛如錐刺。氣急口噤。停尸卒死者。以煖水若酒服大豆許三四丸。或不下。捧頭起灌令下咽。須臾當瘥。如未瘥。更與三丸。當腹中鳴。卽吐下便瘥。若口噤。亦須折齒灌之。案古今錄驗。司空三物備急散。療卒死及感忤。口噤不開者。卽本方爲散。服如大豆二枚。

還魂湯 金匱主心腹卒暴百病。若中惡客忤。心腹脹滿。卒痛如錐刺。氣急口噤。停尸卒死。

麻黃  
兩

杏仁  
七  
箇

甘草  
一  
兩

右三味。以水八升。煮取三升。去滓。分令咽之。通療諸感忤。○裏實者。用備急丸。表實者。用還魂湯。

金鑑

救卒死方

金匱

雄鷄冠割去血管吹納鼻中。○薤搗汁灌鼻中。

又方

肘後

半夏末如大豆許。吹鼻中。

案此千金療五絕法心下溫者一日亦可治。

又方

同上

灸臍中百壯。○又方。令人痛爪其人人中取醒。○又方。以細繩圍其人

肘腕中。男左女右。伸繩從背上大椎度以下行脊上。灸繩頭。

一云五

又從此

灸橫行各半繩。此凡三灸。各灸三壯。卽起。○又方。灸鼻下人中三壯。○又方。

灸兩足大指爪甲聚毛中七壯。此華陀法。一云三七壯。

又方

祕驗

燒炭火一杓。以醋澆之。令患人鼻受醋氣。卽甦。

救卒死而壯熱者

金匱

礬石半斤。以水一升半。煮消以漬脚。令沒踝。

救卒死而張目反折方

金匱

灸手足兩爪後各十四壯。了飲以五毒諸膏散。

有巴豆者。

救卒死而四肢不收失便者方

金匱

馬屎一升。水三斗。煮取二斗。以洗之。又以牛



北京中医药大学图书馆版权所有

洞一升。溫酒灌口中。灸心下一寸。臍上三寸。臍下四寸。各一百壯差。  
小兒卒死。本草附方無故者。取葱白納入下部。及兩鼻孔中。氣通或嚏卽活。

後時

卒死。或先有病痛。或居常倒仆。奄忽而絕。皆是中惡之類。

取葱中央心刺鼻。令入七八寸無苦。使目中血出乃佳。一云耳中血出佳。○又方。令二人以衣壅口。吹其兩耳。極則易人。亦可以葷筒吹之。並捧其肩上側身遠之。莫臨死人上。○又方。以葱刺耳。耳中鼻中血出者勿怪。無血難療之。有血者是活候也。○又方。視其上唇裏弦。有青息肉。如黍米大。以針決去之瘥。○又方。以綿漬好酒。納鼻中。手按令汁入鼻中。並持其手足。莫令驚動也。○又方。取皂莢。如大豆。吹其兩鼻中。嚏則氣通矣。○又方。灸其脣下宛中。名承漿。十壯。大良。

備急療卒死而口噤不開者。

外臺

縛兩手大拇指。灸兩白肉中二十壯。

集驗。療卒死而有脈形候。陰氣先盡。陽氣後竭故也。方

外臺

嚼薤灌之。

驚怖卒死。

本草附方

溫酒灌之卽醒。

療火盜兵戈。驚氣入心。不能言語者。危簡便證蜜陀僧末一錢。清茶調下。驚則氣亂。

簡危  
便證

蜜陀僧末一錢清茶調下驚則氣亂

陀僧之重。以去怯而平肝也。

小兒驚死 指南法  
用生慈姑汁和白蜜灌之。

指醫  
南法

偶見人斬血籍籍驚愕卒死者。經本朝驗溫酒灌之配醋亦可。

經本

療火燒悶絕不識人。以新尿冷飲之及冷水和蜜飲之口噤絞開與之。  
療因回祿煙薰致死者。古今醫鑑 生蘿蔔搗汁頻咽。并嚼塗火瘡。

醫古  
鑑今

附免烟薰死法

法  
集醫  
要林

居民

可。一束蘿蔔嚼汁下咽而甦。又炭煙熏人往往致死。含蘿蔔一片著口中。煙氣不能毒人。或預曝乾爲末備用亦可。或新水擂爛乾蘿蔔飲之亦

李樓怪症方

症李方樓怪

**退烟散** 驗本朝金方  
**預服免烟薰死。**

四

烟散。驗本朝金。預服免烟薰死。蒿雀數個去腸實硃砂末浸蘿菔自然汁一宿取出內瓦器中鹽泥固濟煅存性研末每服五七分白湯及冷



水下又療產後血暈。○又法葡萄多食免死。

成膏爲  
備尤良。

療笑死壽域神方 凡口有微氣心下溫者用食鹽成塊者二兩火燒令通赤候冷研細以河水一大椀同炒至二五沸放溫分三次服之後以鵝翎探於喉中吐去熱痰三五升後服黃連解毒湯三二服則笑自定人可活矣案張子和喜和美療 不休半年用此法。醫統云。黃連解毒湯。加半夏竹瀝薑汁。療喜笑不休。極效。 ○喜笑欲死者鍼列缺二穴在手大指後臂上三寸及大陵二穴在掌後橫紋中鍼三分立效。

療入井塚悶冒方外臺 取其水灑人面令飲之又以灌其頭及身體卽活若無水取他水用也。

又方壽世保元 以水噀其面并含水調雄黃末一二錢入水噀之。

又方本經驗 急解患人衣偃臥溼地上以醋噀其面蓋以草薦半時許卽甦。

救暈鍼法鍼灸聚英 假令鍼肝經氣暈以補肝經鍼入復甦○甘草一二錢水煎灌

下本經驗

又方玉機義徵 暈鍼着奪命穴救之男左女右取之不回却再取右女亦然此穴正

在手膊上側筋骨陷中。蝦蟆兒上自肩至肘。正在當中。

醫學綱目云。在曲澤上一尺。針入三分。

鍼量者。神氣虛也。不可起鍼。以鍼補之。急用袖掩病人口鼻回氣。內與熱湯飲

之。卽甦良久。再鍼甚者。鍼手膊上側陷中。卽蝦蟆肉上惺惺穴。或三里。卽甦。

若起鍼壞人。

門入

入浴量倒。本朝經驗以冷水噀面及澆周身。苦酒一鍾灌口鼻中。或醒後。卽者蘇子。

降氣湯調辰砂末飲之。

芩朮湯三因治暑溼鬱發。或入浴量倒。口眼喎邪。手足顛曳。皆溼溫類也。

附子

茯苓

白朮

乾薑

澤瀉

桂心

右等分水煎服。

凡人暴死。多是疔毒。急取燈遍照其身。若是小瘡。卽是其毒。宜急用萬靈奪命

丹之類。

瘡醫大全門○

中惡門

朱犀散

得

治中惡中忤鬼氣。其證暮夜或登廁或出郊野或遊空冷屋室或人所不至之地忽然眼見鬼物鼻口吸着惡氣驀然倒地四肢厥冷兩手握拳。

鼻口出清血性命逡巡須臾不救此證與尸厥同但腹不鳴心脇俱緩凡切勿移動其屍卽令親戚圍繞燒麝香安息香樟木之類直候醒知事方可移歸。

犀角末

錢五

麝香

硃砂

錢半

右爲末每服二錢井水調下如無前藥用雄黃末服一錢煎桃枝湯調灌。

附金匱方

走馬湯療中惡心痛腹脹大便不通。

杏仁

錢二枚

巴豆

錢二枚

右二味以綿纏搘令碎熱湯二合捻取白汁飲之當下老小量之通治飛戶

鬼擊。

又方外臺仰臥以物塞兩耳以兩個竹筒納死人鼻中使兩人痛吹之塞口傍無

令氣得出半日所死人噫噫勿復吹也。

又方後肘灸兩足大拇指上甲後聚毛中各灸二七壯卽愈○又方灸右肩高骨上隨年壯良。

中惡之證。因冒犯不正之氣忽然手足逆冷。肌膚粟起。頭面青黑。精神不守。或錯言妄語。牙緊口噤。或頭旋暈倒。昏不知人。卽是卒厥客忤。飛尸鬼擊。弔死問喪。入廟登塚。多有此病。蘇合香圓灌之。中方見風候稍甦。服調氣平胃散。

白豆蔻

丁香

檀香

木香

各二

藿香

甘草

各八

砂仁

四兩

蒼朮

八兩

厚朴

陳皮

各二

右姜棗水煎入鹽一捻。

五絕死門

療五絕死方。千金夫五絕者。一曰自縊。二曰墻壁壓迮。三曰溺水。四曰斃寐。五曰產乳絕。皆取半夏一兩細下篩吹。一大豆許納鼻中。卽活心下溫者。一日亦

