

本經逢原卷二

長洲石頑張 璐路玉父纂述

芳草部

當歸 甘辛溫無毒。蜀產者力剛可攻。秦產者力柔可補。凡治本病酒制。有痰薑汁制。白者爲粉歸。性劣不入補劑。本經主欬逆上氣。溫瘧寒熱。灑灑在皮膚中。婦人漏下絕子。諸惡瘡瘍。金瘡。煮汁飲之。發明 當歸氣味俱厚。可升可降。入手少陰足太陰厥陰血分。凡血受病及諸病夜甚。必須用之。本經主欬逆上氣。溫瘧寒熱。洒洒。婦人漏下絕子。皆取辛溫潤血之功。產後惡血上衝。亦必用之。別錄溫中止痛。甄權治下痢腹痛。女人瀝血腰痛。好古治衝脈爲病。逆氣裏急。帶脈爲病。腹痛。腰溶溶若坐水中。其功專於破惡血。養新血。潤腸胃。榮筋骨。澤皮膚。理癰疽。排膿止痛。蓋血壅而不流則痛。當歸甘溫。能和營血。辛溫能散內寒。使氣血各有所歸。入手少陰。心主血也。入足太陰。脾裏血也。入足厥陰。肝藏血也。身能養血。尾能行血。同人參黃耆。則補氣而生血。同牽牛大黃。則行氣而瀉血。同桂附吳萸。則熱。同大黃芒硝。則寒。血虛以人參赤脂爲佐。血熱以生地條芩爲佐。仲景治陽邪陷陰。手足厥寒。脈細欲絕。用當歸四逆湯。於桂枝湯加當歸細辛通草。以通其血脈。卽下痢脈大。氣不歸附。亦用此湯以歸附之。凡血虛發熱者。宜當歸

本經逢原卷二

長洲石頑張 璐路玉父纂述

芳草部

當歸 甘辛溫無毒。蜀產者力剛可攻。秦產者力柔可補。凡治本病酒制。有痰薑汁制。白者爲粉歸。性劣不入補劑。本經主欬逆上氣。溫瘧寒熱。灑灑在皮膚中。婦人漏下絕子。諸惡瘡瘍。金瘡。煮汁飲之。發明 當歸氣味俱厚。可升可降。入手少陰足太陰厥陰血分。凡血受病及諸病夜甚。必須用之。本經主欬逆上氣。溫瘧寒熱。洒洒。婦人漏下絕子。皆取辛溫潤血之功。產後惡血上衝。亦必用之。別錄溫中止痛。甄權治下痢腹痛。女人瀝血腰痛。好古治衝脈爲病。逆氣裏急。帶脈爲病。腹痛。腰溶溶若坐水中。其功專於破惡血。養新血。潤腸胃。榮筋骨。澤皮膚。理癰疽。排膿止痛。蓋血壅而不流則痛。當歸甘溫。能和營血。辛溫能散內寒。使氣血各有所歸。入手少陰。心主血也。入足太陰。脾裏血也。入足厥陰。肝藏血也。身能養血。尾能行血。同人參黃耆。則補氣而生血。同牽牛大黃。則行氣而瀉血。同桂附吳萸。則熱。同大黃芒硝。則寒。血虛以人參赤脂爲佐。血熱以生地條芩爲佐。仲景治陽邪陷陰。手足厥寒。脈細欲絕。用當歸四逆湯。於桂枝湯加當歸細辛通草。以通其血脈。卽下痢脈大。氣不歸附。亦用此湯以歸附之。凡血虛發熱者。宜當歸

補血湯。方用當歸三錢。黃耆一兩。作三服。心下刺痛者。一味當歸酒煎服。專主血分諸病。海藏言當歸血藥。何本經治欬逆上氣。按當歸辛散。乃血中氣藥。故欬逆上氣。有陰虛陽無所附者。用血藥補陰。則血和而氣降矣。凡衝任督帶病。皆不可少。惟泄瀉家痰飲家禁用。

芎藭

綱目名
川芎

辛溫無毒。蜀產者。味辛而甘。爲上。他處產者。氣味辛烈。爲下。反藜蘆。葉名麋蕪。本經主

中風入腦頭痛。寒痹筋攣。緩急金瘡。婦人血閉無子。發明 芎藭辛溫。上升入肝經。行衝脈。血中理氣

藥也。故本經治中風入腦頭痛等證。取其辛散血分諸邪也。好古言搜肝氣補肝血。潤肝燥補風虛。又治

一切風氣血氣。及面上遊風。目疾多淚。上行頭目。下行血海。故四物湯用之者。皆搜肝經之風。治少陽厥

陰頭痛。及血虛頭痛之聖藥。助清陽之氣。去濕氣在頭。頭痛必用之藥。血痢已通。而痛不止。乃陰虧氣鬱

藥中加芎藭。氣行血調。其痛立止。靈苑方驗胎法。以生芎藭末。艾湯服一錢匕。腹中微動者爲胎。千金方

治子死腹中。以芎藭末酒調方寸匙。須臾二三服立出。凡骨蒸盜汗。陰虛火炎。欬嗽吐逆。及氣弱之人。不

可服。其性辛散。令真氣走泄。而陰愈虛也。

撫芎 辛溫無毒。產江左撫州。中心有孔者是。發明 撫芎升散。專於開鬱寬胸。通行經絡。鬱在中焦。

則胸膈痞滿作痛。須撫芎開提其氣以升之。氣升則鬱自降。故撫芎總解諸鬱。直達三焦。爲通陰陽氣血

之便。然久服耗氣。令人暴亡。

蛇牀 苦辛溫無毒。本經主男子陰痿濕癢。婦人陰中腫痛。除痹氣。利關節。癰癩惡瘡。發明 蛇牀

辛香性溫。專入右腎命門。少陽三焦氣分。本經列之上品。不獨助男子壯火。且能散婦人鬱抑。非妙達本經精義。不能得從治之法也。但腎火易動。陽強精不固者勿服。

藁本 辛苦溫無毒。香而燥者良。臭而潤者勿用。本經主婦人疝瘕。陰中寒腫痛。腹中急。除風頭痛。長

肌膚悅顏色。發明 藁本性升屬陽。為足太陽寒鬱經中。頭項顛頂痛。及大寒犯腦。連齒頰痛之專藥。

女人陰腫疝瘕。督脈為病。脊強而厥。亦多用之。霧露之邪。中於上焦。須兼木香。風客於胃。泄瀉脾胃藥中

宜加用之。今人只知藁本為治顛頂頭腦之藥。而本經治婦人疝瘕。腹中急。陰中寒等證。皆太陽經寒濕

為病。亦屬客邪內犯之候。故用藁本去風除濕。則中外之疾皆痊。豈特除風頭痛而已哉。云長肌肉悅顏

色者。外用作面脂之類是也。但頭痛挾內熱。春夏溫病熱病。頭痛口渴。及產後血虛火炎頭痛。皆不可服。

白芷 即都梁香 辛苦溫無毒。本經主女人漏下赤白。血閉陰腫。寒熱頭風。侵目淚出。長肌膚。潤澤顏色。可

作面脂。發明 白芷辛香升發。行手陽明。性溫氣厚。行足陽明。芳香上達。入手太陰。為解利陽明風熱

頭痛。及寒熱頭風。侵目淚出之要藥。其所主之病。不離三經。如寒熱頭風。肩稜骨痛。頭目齒痛。三經之風

熱也。漏下赤白癰疽。頭面皮膚風痺燥癢。三經之濕熱也。風熱者辛以散之。濕熱者溫以除之。都梁丸治崩漏赤白。深得本經之旨。性善祛風。女人漏下赤白。皆風入胞門所致。辛香入脾。故又能溫散血閉陰腫。及寒熱頭風。使目淚出。總取辛散利竅之功。其長肌膚潤澤顏色者。則有排膿長肉之力。所以外科用之。痘疹起脹。連皮腫者。於解毒藥內用之。預杜將來發癰之患。今人用治腸癰。有敗膿淋露不已。腥穢殊甚。遂致臍腹冷痛。須此排膿。膿盡乃以他藥補之。燒烟辟蟲蛇。爲末新汲水調頻灌。解蛇毒內攻。和膽礬麝香。搽蛇傷潰爛。但性溫而升。味苦而散。故嘔吐因於熱者。漏下赤白因於火者。勿用。癰疽潰後。亦宜漸減。以其能耗胃氣也。

白芍藥 酸苦平微寒無毒。入補脾藥酒炒。入止血藥醋炒。入和營藥。及下痢後重。血熱癰毒藥。並酒洗生用。入血虛水腫腹脹藥。桂酒制用。反藜蘆。本經主邪氣腹痛。除血痹。利小便。益氣。發明 白芍藥酸寒。斂津液而護營血。收陰氣而瀉邪熱。蓋瀉肝之邪熱。所以補脾之陰。卽本經主邪氣腹痛。益氣之謂。故仲景以爲補營首藥。入肝脾血分。及陽維寒熱。帶脈腹痛。補中下二焦。能於土中瀉水。爲血痢必用之藥。然須兼桂用之。方得斂中寓散之義。建中湯之妙。用人所不知。蓋瀉痢皆太陰之病。建中專主太陰腹痛也。其治血痹。黃耆桂枝五物湯中用之。非深達本經妙理者不能也。又得炙甘草治腹中急痛。同白朮

補脾同芎藭瀉肝。從人參補血虛。從黃連止瀉痢。同薑棗溫經散濕。在用者各得其宜耳。凡人陽氣虛衰。陰氣散漫。患腹脹滿急。於補中益氣藥中。加白芍藥一味以收陰。則陽虛不受陰制之脹。得陽藥便消矣。然氣虛內寒者不可用。古云減芍藥以避中寒。誠不可忽。產後不可用。以其酸寒瀉肝。伐生發之氣也。小便不利者禁用。以膀胱得酸收斂愈祕也。而真武湯中。又用以利小便者。深得本經之旨。蓋真武湯本治少陰精傷。而證見虛寒。非太陽膀胱壅閉之候。以其能益陰滋血。培養津液。小便自行。非通利也。至於桂枝湯中用以護營血。使邪不得內犯。建中湯中用以培土藏。而治陽邪內陷腹痛。此皆仲景用藥之微妙。端不外本經之義。其餘血痹破堅積治寒熱疝瘕止痛利小便。皆指赤者而言。與白芍無預。因本經未分赤白。故一貫例之。

赤芍藥 酸苦微寒無毒。酒洗用。本經除血痹破堅積寒熱疝瘕止痛利小便。發明 赤芍藥性專下氣。故止痛不減當歸。蘇恭以爲赤者利小便下氣。白者止痛和血。端不出本經除血痹破堅積止痛利小便之旨。其主寒熱疝瘕者。善行血中之滯也。故有瘀血留著作痛者宜之。非若白者酸寒收斂也。其治血痹利小便之功。赤白皆得應用。要在配合之神。乃著奇勩耳。

牡丹皮 苦辛平無毒。酒洗去鹼土。曝乾。勿見火。本經主寒熱中風痙癎驚癇邪氣除癥堅瘀血留舍。

腸胃五藏療癰瘡。發明 牡丹皮入手足少陰厥陰。治血中伏火。故相火勝腎。無汗骨蒸爲專藥。本經主寒熱中風。癰癧驚癇等證。以其味辛氣竄。能開發陷伏之邪外散。惟自汗多者勿用。爲能走泄津液也。瘡疹初起勿用。爲其性專散血。不無根脚散闊之慮。王安道云。志不足者。足少陰病也。故仲景胃氣丸用之。後人惟知黃柏治相火。不知丹皮之功更勝也。又癰堅瘀血。留舍腸胃五藏。及陰虛吐血。衄血必用之。藥以能行瘀血。而又能安好血。有破積生新。引血歸經之功。故犀角地黃湯用之。凡婦人血崩。及經行過期不淨。屬虛寒者禁用。又赤者利血。白兼補氣。亦如赤白芍藥之義。諸家言其性寒。安有辛香而寒者乎。木香 辛苦溫無毒。形如枯骨。味苦色淡黃者良。味鹹色黑勿用。生用理氣。煨熟止瀉。本經主邪氣辟毒疫。強志止淋露。發明 木香氣香味厚。不獨沉而下降。蓋能理胃以下氣滯。乃三焦氣分之藥。兼入肺脾肝三經。能升降諸氣。故上焦氣滯。膈鬱宜之者。金鬱則泄之也。然雖入肺而肺燥氣上者。良非所宜。其中焦氣滯不運宜之者。脾胃喜芳香也。下焦氣滯後重宜之者。塞者通之也。若治中脘氣滯不運。心腹疼痛。以檳榔佐之。使氣下則結痛下散矣。本經辟疫毒邪氣。強志止淋露。以其辛燥助陽。善開陰經伏匿之邪。大明治心腹一切氣。膀胱冷痛。嘔逆反胃。霍亂瀉痢。健脾消食安胎。甄權治九種心痛。積年冷氣瘧癖。癰塊脹痛。壅氣上衝。煩悶羸劣。女人血氣刺痛不可忍。然香燥而偏於陽。肺虛有熱。血枯而燥。及陰火

衝上者勿服。

甘松香 甘溫無毒。發明 甘松芳香升竅。能開脾鬱。少加脾胃藥中。甚醒脾氣。主惡氣。卒心腹痛滿。

風疳齒齬。得白芷白附子。良。脚氣膝腫。煎湯淋洗效。

山柰 辛溫無毒。發明 山柰芳香入陽明。暖胃。辟瘴癘惡氣。治心腹冷氣痛。寒濕霍亂。風蟲牙痛。皆

芳香正氣之力也。

高良薑 辛大溫無毒。煨熟用。子名紅荳蔻。發明 良薑辛熱。純陽上升。入足陽明太陰二經。爲客寒

所犯。則逆冷霍亂。腹痛諸病生焉。辛溫暖脾胃而逐寒邪。則胃中冷逆自除。霍亂腹痛自愈。甄權治腹內

久冷氣痛。去風冷痺弱。大明主轉筋瀉利反胃。解酒毒消食。蘇頌治惡心嘔清水。皆取暖胃溫中散寒之

功也。而寒疝小腹掣痛。須同茴香用之。產後下焦虛寒。瘀血不行。小腹結痛者。加用之。若胃火作嘔。傷暑

霍亂禁用。爲其溫燥也。○紅荳蔻辛溫。主水瀉霍亂。心腹絞痛。止嘔進食。大補命門相火。故正元丹中用

之。然能動火。傷目致衄。不宜久服。

草豆蔻 辛溫無毒。麩裏煨熟去麩用。發明 草豆蔻性溫。入脾胃二經。東垣曰。風寒客邪。在胃口

之上。當心疼痛者。宜之。丹溪曰。草豆蔻性溫。能散滯氣。若明知口食寒物。胃脘作疼。或濕鬱成病者。用之



神效。若熱鬱者不可用。恐積溫成熱也。然多用能助脾熱。傷肺損目。故陰虛血燥者忌之。

草果亦名豆蔻 辛溫。溫無毒。去殼生用。發明 草果與草豆蔻總是一類。其草果治病。取其辛熱浮散。能

入太陰陽明。除寒燥濕。開鬱化食。利膈上痰。解麪濕魚肉諸毒。與知母同用。治瘴瘧寒熱。取其一陰一陽。

無偏勝之害。蓋草果治太陰獨勝之寒。知母治陽明獨勝之火也。然瘧亦有不由於風瘴氣。而實邪不盛。

者忌服。凡濕熱痰滯。傷暑暴注。洩赤口乾者禁用。

白豆蔻俗名穀蔻 辛溫無毒。忌見火。去淨隔膜。不爾令人隔滿。凡草果草豆蔻縮砂皆然。不獨白豆蔻也。

發明 白豆蔻辛香上升。入脾肺二經。散肺中滯氣。治脾虛瘧疾。嘔吐寒熱。能消能磨。流行三焦。營衛一

轉。諸證自平。古方治胃冷積氣。嘔逆反胃。消穀下氣。寬膈進食。解酒毒。皆相宜也。若火升作嘔。蘊熱作痛。

者勿服。

縮砂密俗名砂仁 辛溫。溫無毒。發明 縮砂屬土。醒脾調胃。為脾胃肺腎大小腸膀胱七經之氣藥。能引

諸藥歸宿丹田。治脾虛泄瀉。宿食不消。瀉痢白沫。腹中虛痛。寒飲脹痞。噎膈嘔吐。和中行氣。止痛安胎。用

之悉效。同熱地茯苓。納氣歸腎。同檀香豆蔻。下氣安肺。得陳皮白朮。和氣益脾。惟新產婦忌之。恐氣驟行。

動血也。今人治血痢。亦多用之。若積欲盡時。良非所宜。又血虛火炎。欬嗽禁。用妊婦氣滯者宜服。若氣虛。



者多服。反耗其氣。多致難產。南人性喜條暢。食品每多用之。北人性喜潛藏。藥中亦罕用者。

益智子 辛溫無毒。去殼鹽水炒用。發明 益智行陽退陰。三焦命門氣弱者宜之。脾主智。此物能益

脾胃。理元氣。補腎虛。滑精。胃虛多唾。女人崩漏。治心氣不足。夢泄夜多小便。及冷氣腹痛。於土中益火也。

集驗方縮泉丸。治脬氣不足。方用益智子鹽炒去鹽。與烏藥等分爲末。酒煮山藥粉爲糊。丸如梧子大。空

心鹽湯下七十丸。丹方治夜多小便。取二十四枚。入鹽同煎。服之有驗。按益智功專補火。如血燥有火。漏

熱暴注。及因熱而遺濁。色黃乾結者。不可誤用也。

萆薢 辛大溫無毒。醋浸刮去皮子。免傷肺上氣。發明 萆薢辛熱浮散。爲頭疼鼻淵要藥。取其能入

陽明經。散浮熱也。性能溫中下氣。治霍亂水瀉。心腹滿者宜之。然辛熱耗散。能動脾胃之火。多用令人喘

欬。目昏。腸虛下重。以其走泄真氣也。

蒟蒻子名 辛溫無毒。發明 蒟蒻辛熱。能下氣溫中。破痰散結。氣解瘴癘。嶺南人以葉合檳榔食。取

其辛香。能破瘴癘之氣也。其子可以調羹。故謂之醬。萆薢之類也。

肉豆蔻俗名 辛溫無毒。糯米粉裹煨熟。用勿犯鐵。發明 肉豆蔻辛香。入手足陽明。溫中補脾。寬膨

脹。固大腸。爲小兒傷乳吐逆泄瀉之要藥。二神丸合補骨脂治腎瀉。蓋取補脾以治腎邪也。按脾土性喜

芳香。故肉果與脾胃最為相宜。以其能下氣者。脾胃得補。則健運。非若厚朴枳實之峻削也。熱鬱暴注。禁
用。以其辛溫性滯也。

補骨脂

俗名破故紙。字音相近之誤也。

苦辛大溫無毒。鹽酒浸焙乾用。與胡麻同炒良。忌薑薑羊肉諸血。

發明

補

骨脂屬火。收斂神明。能使心胞之火。與命門之火相通。使元陽堅固。骨髓充實。瀉以固脫也。胡桃屬水。潤燥養血。血屬陰惡燥。故油以潤之。佐補骨脂。有水火相生之妙。故局方青娥丸用之。孫思邈言。補腎不若補脾。許學士言。補脾不若補腎。腎氣虛弱。則陽氣衰劣。不能薰蒸脾胃。令人痞滿少食。譬如釜底無火。雖終日不熟。陽衰則飲食亦不能消化。濟生二神丸。治脾胃虛寒泄瀉。用補骨脂補腎。肉豆蔻補脾。加吳茱萸以平其肝。加水香以順其氣。使之斡旋。若精傷溺赤瀉痛者。去木香易五味子。腰膝痠疼。腎冷精流者。用之屢効。凡陰虛有火。夢泄溺血。大便閉結者。勿施。

薑黃 辛苦溫無毒。藏器曰。辛苦多。性熱不冷。或云大寒誤矣。有二種。蜀川生者。色黃。質嫩。有鬚折之

中空有眼。切之分為兩片者。為片子薑黃。江廣生者。質粗形扁如乾薑。僅可染色。不入湯藥。今藥肆混市。誤人。徒有耗氣之患。而無治療之功也。發明 薑黃鬱金蓬朮。三物形狀功用皆相近。但鬱金入心。專治心包之血。薑黃入脾。兼治血中之氣。蓬朮入肝。兼治氣中之血。為不同耳。古方三痹湯。用片子薑黃。治

風寒濕氣手臂痛。戴元禮曰。片子薑黃能入手臂治痛。其兼理血中之氣可知。能治癰疽癰疽。通經消腫。毒功力烈於鬱金。但血虛臂痛者服之。病必增劇。

鬱金 辛苦平無毒。本草以爲性寒誤矣。安有辛香而寒之理。蜀產者體圓尾銳。如蟬腹狀。發苗處有小孔。皮黃而帶黑。通身粗皺如梧桐子紋。每枚約重半錢。折開質堅色黃。中帶紫黑。嗅之微香。不烈者真。若大小不等。色黃皮起細橫紋。有鬚如線。折之中空質柔。內外皆黃。其氣烈者。卽片子薑黃也。體圓首尾相似。通身橫紋。發苗處無小孔。折開氣烈觸鼻者。染色薑黃中之小者也。蓬朮則大塊色青黑。最大者爲廣茂。與此不類。蘇恭不能分別。乃爲一物謬矣。發明 鬱金辛香不烈。先升後降。入心及包絡。治吐血衄血唾血血腥。破惡血血淋尿血。婦人經脈逆行。產後敗血衝心。及宿血心痛。並宜鬱金末加薑汁童便同服。其血自清。痰中帶血者加竹瀝。又鼻血上行者。加入四物湯。一婦患失心風癲十年。用鬱金四兩。佐明礬一兩爲丸。硃砂爲衣。纔服五十丸。心間如有物脫去。再服而蘇。以鬱金入心去惡血。明礬化頑痰。硃砂安神故也。又能化癰瘰爲水。嶺南蠱毒爲害。初覺胸腹痛。卽用升麻或膽礬吐之。若膈下急痛。以米湯調鬱金末三錢服之。卽瀉出惡物。或合升麻鬱金服之。不吐則下。此李巽岩爲雷州司理。鞠獄得此方。活人甚多。按以上諸治。其功皆在破宿生新。今世誤以爲諸血聖藥。病者不惜重費。醫者藉爲射利。咸以薑黃

代充爲害非淺。凡屬陰虛失血及陰火迫血上逆。咸爲切禁。

蓬莪茂

即蓬莪

苦辛溫無毒。入肝經。藥醋炒。入心脾藥麪裏煨熟。入四物湯調經。羊血或雞血拌炒。

明 蓬莪茂入肝破血。治婦人血氣結積痛。痰癖冷氣。跌撲損痛下血。及內損惡血。通肝經聚血。蓋此藥

專破氣中之血也。按蓬莪誠爲磨積之藥。但虛人得之。積不去而真已竭。更可虞也。須得參朮健運。補中

寓瀉。乃得力耳。

荆三稜 苦平無毒。生荆楚地。故名荆三稜。真者絕少。今世所用。皆草三稜也。醋炒用之。發明 三稜

肝經氣分藥也。能破血中之氣。散血結。通肝經積血。主寒癖結塊。破產後惡血。血結腹痛。通月水。墮胎。以

其力峻。故難久服。有人病癥瘕腹脹。用三稜莪。酒煨煎服。下一黑物如魚而愈。按潔古云。三稜能瀉真

氣。虛者勿用。東垣破積諸方。皆與人參贊助。如專用剋削。脾胃愈虛。不能運行。其積亢逆益甚矣。

香附

即莎草根

辛微苦甘平無毒。產金華。光細者佳。入血分。補虛。童便浸炒。調氣。鹽水浸炒。行經絡。酒浸炒。

消積聚。醋浸炒。氣血不調。胸膈不利。則四者兼製。肥盛多痰。薑汁浸炒。止崩漏。血便製炒。黑走表藥中。則

生用之。發明 香附之氣平而不寒。香而能竄。乃足厥陰肝。手少陽三焦氣分主藥。兼入衝脈。開鬱氣。

消痰食。散風寒。行血氣。止諸痛。月候不調。胎產崩漏。多怒多憂者之要藥。治兩脇氣妨。心忪少氣。是血中

之氣藥也。蓋血不自行。隨氣而行。氣逆而鬱。則血亦凝滯。氣順則血亦隨之而和暢矣。生則上行胸膈。外達皮毛。故能散風寒。熱則下走肝腎。外徹腰足。故能調血氣。得參朮則益氣。得歸地則調血。得木香則滯和中。得沉香則升降諸氣。得芎藭蒼朮則總解諸鬱。得山梔黃連則降火清熱。得茯苓則交心腎。得茴香補骨脂則引氣歸元。得厚朴半夏則決壅消脹。得紫蘇葱白則解散邪氣。得三稜莪朮則消癥積塊。得艾葉則治血氣。煖子宮。乃氣病之總司。女科之主帥也。惟經水先期而淡。及失氣無聲無臭者。勿用。血氣本虛。更與利氣。則行之愈速矣。

茉莉花 辛熱無毒。根熱有毒。發明 茉莉花古方罕用。近世白痢藥中用之。取其芳香散陳氣也。其根性熱有大毒。以酒磨一寸服。卽昏迷一日。乃醒。服二三寸。二三日醒。惟接骨脫臼。用以傅之。則不知痛也。

排草香 辛溫無毒。發明 芳香之氣皆可辟臭去邪惡氣。鬼魅邪精。天行時氣。並宜燒之。水煮洗水腫浮氣。與生薑芥子煎湯浴風瘡効。

藿香 辛微溫無毒。廣產者良。但葉甚少。土人每以排草葉僞充。最難辨別。須於莖上擇去色綠未經黴壞者方効。發明 藿香入手足太陰。芳香之氣助脾醒胃。故能止嘔逆。開胃進食。溫中快氣。去瘴氣。止

霍亂治心腹痛。凡時行疫癘。山嵐瘴瘴。用此醒脾健胃。則邪氣自無容而愈矣。但陰虛火旺。胃虛作嘔。內無留滯者。不可用。恐反傷正氣。引邪內入。江浙土產者。伐胃消食。其莖能耗氣。用者審之。

薰香

即零陵香

甘平無毒。廣產者良。雲陽產者氣濁。不堪入藥。

發明

薰香辛散上達。故心痛惡氣。齒痛

鼻塞。皆用之。單用治鼻中瘕肉。鼻鼾。香以養鼻也。多服作喘。爲能耗散真氣也。

蘭香

辛溫無毒。菜部移此。瀕湖綱目。芳草部有蘭草。菜部有蘭香。名曰羅勒。種類不同。因攷正之。按蘭

有三種。一種曰蘭草。其氣濃濁。卽今之省頭草也。一種曰蘭香。植之庭砌。二十步內。卽聞香。俗名香草。以

子能去目翳。故又名瞿子草。一種名羅勒。莖葉較蘭香稍粗大。形雖極類。而氣輩濁。以嫩時可食。僅入菜

部。不堪入藥。

本經利水道。殺蟲毒。辟不祥。久服益氣。輕身不老。通神明。

發明

蘭氣芳香。能辟疫毒

惡氣。楚人以之爲佩。又能辟汗濕之氣。故又名辟汗香。入手足太陰陽明。力能調中消食。去惡氣。治嘔嘔

脾瘕。口中時時溢出甜水者。非此不除。按蘭性芳香辛溫。專走氣道。故能利水調肝和脾。其功倍於藿香。

善調嘔逆。散積久陳鬱之氣。素問云。五味入口。藏於胃。以行其津氣。津液在脾。令人口甘。此肥美所發也。

其氣上溢。轉爲消渴。治之以蘭。除陳氣也。東垣治消渴生津。飲用蘭葉。蓋本於此。又治牙疼口臭。有神功。

丸亦用蘭香。云如無以藿香代之。近世有誤認幽蘭爲蘭香者。大可噴飯。觀本經利水殺蟲毒辟不祥之

治豈幽蘭能之乎。古方治癰風蘭香散。去其散肺胃中之濕熱蟲毒也。普濟方治反胃。蘭香和甘蔗汁服之。錢氏治小兒鼻疳赤爛。蘭葉燒灰二錢。銅綠半錢。輕粉二字爲末。日傳三次卽愈。○子治目瞽及塵物入目。以三五顆內目中。少頃其子濕脹。與物俱出。又主暴得赤眼後生瞽膜。用蘭香子一粒入瞽內。閉目少頃。連膜俱出。蓋此子得濕卽脹。故能染惹眵淚浮膜爾。然目中不可著一塵。而此可納三五顆。亦不妨礙。又小兒食肥甘口臭齒黑。名曰崩砂。漸至齲爛。名曰潰槽。又或出血。名曰息露。重則齒落。名曰腐根。用蘭香子末輕粉各一錢。蜜陀僧煨赤。醋淬研末半兩和勻。每以少許傅齒及齲上。內服甘露飲立效。○時珍曰。蘭香須三月棗葉生時種之。乃生。否則不生。常以魚腥水泥溝水冷泥水澆之。則香而茂。不宜糞水。糞則萎。其子大如棗而褐色不光。七月收之。種時防蟻。濕則有脂浮脹。須以枯炭末掩之。

澤蘭 苦甘微溫無毒。取葉酒洗用。本經主金瘡癰腫瘡膿。發明 澤蘭入足太陰厥陰血分。專治

產後血敗。流於腰股。拘攣疼痛。破宿血。消癥瘕。除水腫。身面四肢浮腫。本經主金瘡癰腫瘡膿。皆取散血之功。爲產科之要藥。更以芎歸童便佐之。功效勝於益母。

馬蘭 辛平無毒。赤莖者良。發明 馬蘭入陽明血分。與澤蘭功用相近。故能破宿生新。丹方治婦人淋濁痔漏有效。喉痹腫痛。以馬蘭根葉搗汁。入米醋滴鼻孔。或灌喉中。取痰自開。絞腸痧腹痛。以馬蘭細

嚼嗽汁立安。水腫溺滴。馬蘭一握。鹽豉小麥各一撮。酒水煎服效。蛇傷。搗汁和醋擦之。皆取散血解毒也。

香薷 辛微溫無毒。江西白花者良。發明 香薷辛溫。先升後降。故熱服能發散暑邪。冷飲則解熱利

小便。治水甚捷。世醫治暑病。以香薷飲爲首藥。然暑有乘涼飲冷。致陽氣爲陰邪所遏。遂病發熱惡寒頭

痛。煩躁口渴。或吐。或瀉。或霍亂者。宜用此發越陽氣散水和脾。若飲食不節。勞役作喪之人。傷暑發熱大

渴。煩渴喘促者。乃勞倦內傷之證。必用清暑益氣。如大熱大渴。又宜人參白虎之類。以瀉火益元。更有汗

出如雨。吐瀉脫元。四肢清冷。脈微欲脫者。又須大順漿水散等方救之。若用香薷飲。是重虛其表。頃刻脫

亡矣。今人不知。槩用沉冷代茶。若元氣虛人服之。往往致病。蓋香薷乃夏月解表之藥。如冬月之用麻黃

氣虛者。豈可漫用。深師香薷丸。治通身水腫。以香薷熬膏。丸白朮末。日三夜一服。米飲下之效。

爵牀 俗名赤眼 老母草 鹹寒無毒 本經主腰痛。不得措牀。俛仰艱難。除熱。可作湯浴。發明 爵牀善通

血脈。蘇恭言療血脈下氣。杖瘡搗汁塗之立瘥。觀本經諸品。不出活血舒筋之用也。

荊芥 又名 假蘇 辛微溫無毒。產後止血。童便制黑用。凡食河豚及一切無鱗魚與驢肉俱忌之。食黃鱔魚後

服之。令人吐血。惟地漿可解。與蟹同食動風。本經主寒熱鼠瘻瘰癧生瘡。破結聚氣。下瘀血除濕疽。

發明 荊芥穗入手太陰足厥陰氣分。其功長於祛經絡中之風熱。觀本經所主。皆是搜經中風熱痰血。