



婦人方上 凡九類

求子第一 論六首

方一十五首  
轉女為男法三首

論曰夫婦人之別有方者以其胎妊生產崩傷之異故也是以婦人之病比之男子十倍難療經言婦人者衆陰所集常與濕居十四已上陰氣浮溢百想經心內傷五臟外損姿顏月水去留前後互瘀血停凝中道斷絕其中傷墮不可具論矣然五臟虛實交錯惡血內漏氣脈損竭或飲食無度損傷非一或瘡癰未愈便合陰陽或使利於懸廁之上風從下入便成十二痼疾所以婦人別立方也若是四時節氣為病虛實冷熱為患者故與丈夫同也惟懷胎妊而挾病者避其毒藥耳其雜病與丈夫同則散在諸卷中可得而知也然而女人嗜慾多於丈夫感病倍於男子加以慈戀愛憐嫉妒憂恚染著堅牢情不自抑所以為病根深癢之難癢故養生之家特須教子女學習此三卷婦人方令其精曉即於倉卒之秋何憂畏也夫四德者女子立身之樞機產育者婦人性命之長務若不通明於此則何以免於天枉者哉故傳母之徒亦不可不學常宜繕寫一本懷挾隨身以防不虞也論曰人之情性皆願善已而疾不及人至於學問則隨情逐物墮於事業詎肯專一追求至理莫不虛棄光陰沒齒無益夫婚姻養育者人倫之本王化之基聖人設教備論厥旨後生莫能精曉臨事之日惛爾若愚是則徒願賢已而疾不及人之謬也斯實不達賢已之趣而妄徇虛聲以終無用今具述求子之法以昭後嗣同志之士或可覽焉論曰夫欲求子者當先知夫妻本命五行相生及與德合并本命不在子休廢死墓中者則求子必得若其本命五行相克及與刑殺衝破并在子休廢死墓中者則求子了不可得慎無措意縱或得者於後終亦累人若其相生并遇福德者仍須依法如方避諸禁忌則所誕兒子盡善盡美難以具陳禁忌法受胎時日推主卷論曰凡人無子當為夫妻俱有五勞七傷虛羸百病所致故有絕嗣之患夫治之之法男服七子散

女服紫石門冬圓及坐藥盪胞湯無不有子也。

七子散 治丈夫風虛目暗精氣衰少無子補不足方

五味子 鍾乳粉

牡荆子

菟絲子

車前

子 蒜莢子 石斛 乾地黃 薯蕷

杜仲 鹿茸

遠志各八錢

附子

蛇床子

芎藭各六錢

山萸

天雄 人參 茶荳 黃耆 牛膝各五錢

桂心十錢

旋覆子十錢

巴戟天十二錢

右二十四味治下篤

酒服方寸如日二不知增至二七以知為度禁如藥法不能酒者蜜和圓服亦可

一方加覆盆子八錢求子法一依後房中篇

衍義

萬類稟乎乾健務資化生千金體乎造物首推廣嗣廣嗣一門又以七子散為基始專主丈夫

風虛目暗精氣衰少夫所謂風虛者肝氣內虛而顯風木之象目暗者腎氣不充水精不能上注於目

也故欲求廣嗣先培根本此方專為慾勤精薄陽氣不振者設參耆鹿茸方中君主精不足者補之以

味也鍾乳雄附方中主帥形不足者溫之以氣也參芪溫厚非雄附不能激之鍾乳剽悍非鹿茸無以

濡之已戰旋苓五味山萸菟絲薯蕷杜仲牛膝乃參耆之臣輔蒜莢蛇床桂心遠志則雄附之寮佐然

無陰則陽無以化地黃芎藭不特化氣成形并化胎息蘊毒制劑之妙無以喻之至於牡荆專主風虛

車前職司氣化壯荆勢紛石斛監之車前力薄茯苓助之以其裏既濟之功克紹廣嗣之劫尤為慾勤

精薄之金鏽第溫補助陽不過為廣嗣之一端設陰精內涸陽氣未漓雄附似可勿用地黃何妨量加

灼燬不能施化者復有急於子嗣愈補則氣愈壅愈溫則陽愈痿又須二陳平胃滋腎洗滌體室則生

生之機自裕如矣讀古人方須要識古人手眼如上等法足補七子散之未逮也

朴消盪胞湯 治婦人立身已來全不產及斷緒久不產三十年者方

朴消

牡丹

當歸

大黃

桃仁生用各三錢

厚朴

桔梗

人參

赤芍

茯苓

桂心

甘草

牛膝

橘皮各二錢

附子六錢

蟲蟲

水蛭各十

右十七味㕮咀以清酒水各五升合煮取三升

日三夜一分四服每服相去三時更服

服即止如大悶不堪可服酢飯冷漿一口即止然恐去惡物不盡不大得藥力若能忍服盡大好一日後仍著導藥千金翼不用桔梗甘草

行義

土中有石則草不生。渠中有阜則水積阻。婦人立身不產。斷緒不孕。皆子藏有疾之故。非峻用決渠開荒力量。雖日從事。調經丸泥補天術耳。方中硝黃蠅蛭。決渠之旋鑿也。桂心附子。鎮荒之力士也。參茯苓。開疆之糧餉也。桔梗厚朴。藥中宣使。病在下取之上也。其餘牡丹芍藥等味。皆供驅役之流。此方專滌胞門積血。故以抵當為主。而兼下瘀血。湯桃核承氣之製。其力專矣。猶恐積垢難動。入需參附之大加直搗。長驅何憚。堅疊不破耶。服後痘取微汗。不獨迅掃諸內。并以開發元府。宣通中外。化機勃發。生氣裕如。但藥力過峻。須防瞑眩。乃預擬酸收之法。可無倉卒之虞。然必天陰臍下疼痛。方為瘀血之確徵。而婦人不孕。詎止一端。多有坤體肥盛。濕壅子藏。不能攝精者。亦有土氣瘠薄。火灼精枯。不能敷化者。亦有交接過勞。闢閭廢弛。而失閉藏之令者。不特上方無預。導法尤難槩施。夫病有常變。藥有變通。若以常法治變。則與圓柄方鑿何異哉。

治全不產及斷緒服前朴消湯後著坐導藥方

皂莢

萸肉千金翼作苦旅

當歸各一兩

細辛

五味子

乾薑

各二兩

大黃

礬石

戎鹽

千金翼作草薢

三分

蜀椒

各半兩

十味為末

以絹袋盛

大如指

長三寸

盛藥令滿

內

婦人陰中坐臥任意。勿行走急。小便時去之。更安所者。一日一度。必下青黃冷汁。汁盡即止。可幸御自有子。若未見病出。亦可至十日安之一。本別有導藥。研霜各半兩。此藥為服朴消湯。恐去冷惡物出不盡。以導藥下之。值天陰冷不疼。不須著導藥。亦有著鹽為導藥者。然不如此藥。其服朴硝湯後。即安導藥。經一日。乃服紫石門冬丸。

行義

坐導之法。乃蜜煎膽導土瓜根導之變法。東垣方中亦常有之。然有其藥而無其用。姑存以備

立法可也。

紫石門冬圓 治全不產及斷緒方 紫石英

天門冬各三兩

當歸 茜草 紫葳 卷柏 桂心

烏

頭 乾地黃 牡蒙千金翼作牡荆  
外臺作牡蒙 禹餘糧

石斛 辛夷 人參 桑寄生

續斷 細辛 厚朴

乾薑 食茱萸 牡丹 牛膝各三兩

柏子仁 薯蕷

烏賊骨 甘草各一兩半

右二十六味為末蜜

和丸如梧子大酒服十九日三漸增至三十九以腹中熱為度不禁房室夫行不在不可服禁如藥法比來服者不至盡劑即有娠

衍義

天地絪溫萬物化生化生之機務在水上之精純自然庶無繁茂方中人參甘草芍藥地黃山藥寄生川斷牡丹調養氣血之味庸所易知其石英餘糧溫固下元且佐桂薑烏萸毋乃失之過熱天

冬卷柏性稟至陰如何可任廣嗣之用因諦本經天門冬有強骨髓之說別錄言冷而能補既權治一切惡氣不潔之疾卷柏主女子陰中寒熱痛癥瘕血閉絕子乃知二味配合石英餘糧有既濟陰陽之妙其溫養氣血之味上法具矣而溯源窮源又須子藏精純生生之氣方得裕如細辛辛夷專清子藏風氣烏賊牛膝紫葳牡蒙專散胞門瘀積石斛專清胃氣厚朴專泄腸垢柏子仁專滋心腎益肝氣久服令人潤澤美色以婦人之病每多風襲胞門血汙子藏故細辛以下諸味千金恆有之此方較補益門中紫石英天門冬大都繫藥彼以風冷在子宮子常墮落此以立身不虛斷緒不孕子藏原無固冷故不需石南雲母輩峻溫也

白薇圓 主令婦人有子方 白薇 細辛 防風 人參 泰椒 白斂一作桂心 牛膝 泰艽

蕪荑 沙參 芳藥 五味子 白僵蠶 牡丹 蟬蠧各一兩 乾漆

柏子仁

乾薑

卷柏

附子

芳薑各三兩 十銖桃仁 紫石英各一兩 鐘乳 乾地黃 白石英各二兩

蠶蠧半兩

水蛭

蟲蟲五十枚吳茱萸

十八錢

麻布叩帳頭燒

一尺

右三十二味為末密和丸如梧子大酒服十五丸日再稍加至三十九當

龍骨

生地

熟地

芍藥

當歸

甘草

白芷

川芎

荆芥

桔梗

人參各一錢。蒲黃、細辛各二錢。橘皮半兩。右二十八味為末蜜和丸如梧子大酒服十五丸。日再漸增至四十九以知為度亦可至五十九。慎猪雞生冷醉滑魚蒜驥馬牛肉等覺有娠即停三月正擇食時可食牛肝及心。至四月五月不須但不可故殺令子短壽遇得者大良。

衍義

本經白薇專主風熱。不言婦人諸治。金匱安中益氣竹皮丸治婦人產中虛煩嘔逆雖主胎產

實治風熱也。而別錄有療傷中淋露下水氣等說。所以婦人胎產方多用之。同芍藥治婦人胎前產後遺尿。斯非利水之驗歟。此白薇丸前後二方。一主血結胞門。子戶不淨不能成孕。故用蟲蟲水蛭蟻蟎。鼠婦乾漆桃仁等。一派峻攻積血之藥。參入石英參附桂薑椒萸大溫子藏。佐以芎藭牛膝牡丹芍藥和血之味。白薇沙參卷柏柏仁化諸辛熱。細辛防風秦艽蕪荑散諸風氣。白斂清理帶下。鍾蠶滌除風痰。五味收斂陰精復頭暈者。取繼續宗祧之義。兼能破除瘀血也。又方專主上熱下冷。子宮虛寒。不能攝精於前方。除去破血峻劑。僅用十味配入餘糧。石脂龍骨蛇床遠志覆盆。佐石英人參薑椒桂心以固下冷。地黃門冬車前石膏茯苓橘皮。佐卷柏白薇以清上熱。藁本白芷細辛。佐卷柏澤蘭以散風熱。芎藭歸蒲黃。佐桃仁以散血滯。雖不若前方之專行破血。溝渠之中。豈無瘀垢存焉。此千金立法之綱旨也。

金城太守白薇圓

治月水不利閉塞絕產十八年服此藥二十八日有子方

白薇細辛各三人參

杜蘅

古今錄實

牡蒙

厚朴

半夏

白僵蠶

當歸

紫苑

八錢

牛膝

沙參

乾薑

秦艽

雨半蜀椒附子

防風各一

右十七味為末蜜和丸如梧子大先食服三丸不知可增至四五丸。此

藥不可常服覺有娠即止用之

大驗

崔氏有桔梗丹

衍義

此方較前二方稍平。僅取前方中參附椒薑以溫血氣。白薇沙參以化辛熱。辛防秦艽以祛血室之風。牛膝當歸以和衝脈之血。僵蠶以滌子戶風痰。一切攻血之藥與入方固脫之劑總無預焉。加

杜衡者。師甄權之破留血也。加牡蒙紫苑者。法本經之下逆氣。及胸中寒熱結氣也。逆氣下結氣散而血行無滯。風氣去。疾氣陰而子藏安和。故用半夏厚朴鱗蠶專行清理風痰濕滯。并上二方為鼎峙三法。隨人稟氣病氣而為取裁。破血如無首方。固脫莫若次法。搜滌脂膩。此方為最。所以服之匝月。便能有子。

論曰。古者求子多用慶雲散。承澤丸。今代人絕不用此。雖未試驗。其法可重。故述之。

慶雲散

治丈夫陽氣不足。不能施化。施化無成方。覆盆子 五味子 格一兔然子 二升天雄 一兩石

斛

白术各三桑寄生四兩 天門冬二兩 茶石英二兩 右九味治下篩。先食酒服方寸匕日三素不

耐冷者去寄生加細辛四兩

陽氣不少而無子者去石斛加檀榔十五枚良

承澤圓

治婦人下焦三十六疾不孕。絕產方。梅核仁 辛夷各一葛上亭長七枚 漫疏三兩 薑本一

兩

澤蘭子 五合 右六味為末。蜜丸如大豆。先食服二丸。日三不知。稍增之。若腹中無堅癖積聚者去

亭長加通草一兩。惡甘者和藥先以苦酒搜散。乃內少蜜和為丸。

衍義

慶雲者。慶雲龍之徵兆。承澤者。承雨露之沾私也。慶雲丸以茶石英專溫榮血。天雄峻燥精氣。

佐以覆盆五味免煥。溫補下元。寄生主治腰痛。天冬能強腎氣。石斛強陰益精。白术固津氣而利腰脾。間血。恐英雄二味之性過烈。乃以天冬石斛寄生濡之。覆盆五味免煥輔之。白术培土以發育萬物。扶陽施化之功盡矣。若素不耐寒。則去寄生而加細辛。以鼓生陽之氣。陽本不衰。當退石斛而進檀榔。以祛濁濕之垢。其法之可重。端在乎此。承澤圓專破子藏積血。子藏屬衝脉。緊附厥陰而主風木。故取梅仁之酸平。以泄厥陰風熱。則亭長方得振破血之威。辛夷藁本沒疏三味。本經一治寒熱風頭腦痛。一主婦人陰中寒腫痛。一止遺溺利水道。更用澤蘭之子。統理婦人三十六病。一舉而內外風氣悉除。胞戶積血盡掃。獨是梅仁之旨。難以領悉。觀本草治例。吳普言。明日益氣。孟說言。降煩熱。目非肝腎所

大黃圓

治帶下百病無子服藥十日下血二十日下長蟲及青黃汁二十日病除五十日肥白方

黃碎如米豆  
熬令黑

柴胡

朴硝煅乾薑各一兩

蜀椒二兩

茯苓大一枚

右七味為末蜜和丸如桐子大先食服七丸米飲下加至十九以知為度五日微下

行義

此治婦人帶下百病無子故用大黃朴硝熬煅以散積血即用乾薑蜀椒以溫子藏柴胡升發

生氣芎鬱清理榮血茯苓引領硝黃專行滲道與後養胎令易產方蒸大黃丸用法相仿

吉祥圓

治女人積年不孕方天麻 槩榦 牡丹 茯苓 乾地黃 桂心各一兩 五味子 桃花

白术

芎鬱各二兩 盆子一斗 桃仁一百 兔頭子 楠實子各一兩

心苦酒下五丸日中一服晚一服

衍義

桃花令人好顏色柳絮能除面熱黑斯亦聞人之所需其地黃芎鬱椿實養血壯筋兔頭盆

五味補精益氣

牡丹桂心桃仁和榮暖宮茯苓白术天麻清痰逐濕飲用苦酒取酸收以歸子藏也

硝石大黃丸

治十二癰癧及婦人帶下絕產無子并服寒食藥而腹中有癧者當先服大丸下之乃服

寒食藥不下水穀但下病耳不至令人虛極方見十三卷中

秦椒圓

治婦人絕產生來未產盪滌腑臟使玉門受子精方秦椒 天雄各十元參 人參 白斂

菟婦

白芷 黃耆 桂梗 露蜂房 白僵蠶 桃仁 蟬螬 白薇 細辛 蒸黃各一兩 牡蒙

沙參

防風 甘草 牡丹皮 牛膝 卷柏 五味子 芳藥 桂心 大黃 石斛 白术各

鉢柏子仁

茯苓 當歸 乾薑各一兩 漢蘭 乾地黃 芎鬱各一兩 乾漆 紫石英 白石英

附子各二兩

鍾乳二兩 水蛭七十枚 蚊蟲一百枚 麻布叩復頭燒

服十九日再稍加至二十九若有所去如葷汁鼻涕此是病出覺有異即停

**衍義** 此卽第一方白薇圓之立法。方中附子不遠，益以天雄、白朮、蟲蟲丸，婦不遠，益以蜂房，能治崩中漏下五色。又解鍾乳白朮相反之毒。蘇頌所謂下乳石毒也。

灸法

婦人絕子灸然谷五十壯，在內踝前直下一寸。婦人絕子不生，胞門閉塞，灸關元三十壯報之。婦人妊子不成，若墮落腹痛，漏見赤，灸胞門五十壯。關元左邊二寸是也，右邊二寸名子戶。婦人絕嗣不生，灸氣門穴，在關元傍三寸，各百壯。婦人子藏閉塞，不受精，灸胞門五十壯。婦人絕嗣不生，漏赤，白灸東門十壯。三報穴在橫骨當陰上際。論曰：陰陽調和，二氣相感，陽施陰化，是以有娠而三陰所會，則多生女。但妊娠二月，名曰始膏，精氣成於胞裏。至於三月，名曰始胎，血脉不流，象形而變，未有定儀。見物而化，是時男女未分，故未滿三月者可依藥方術轉之，令生男也。

丹參九 治婦人始覺有孕，養胎并轉女為男方

丹參 川斷

芍藥

白膠

柏子仁

甘

草各二

人參 茜草

乾薑各三

吳茱萸 十銖

橘皮

當歸各一兩

白芷

冠纓燒灰各一兩

乾地黃一兩

蕪

美鉢十八

大卵一具

東門上雄雞頭一枚

右十九味為末，蜜和丸如梧子大酒服十九日再稍加至二

十九丸

衍義

陰陽造化之機，得之資始，轉女為男之說，得不無疑。此方出之于金量，非誕妄。方中理中四物，

培養血氣，止蕩丹續祛風和榮。白膠有散瘀止血之功，柏仁有除風潤燥之力。用犬卵者，取其資胎元陽，雞頭者，專取東方生氣。冠纓沾日月光華，為男子章身之具。用以入藥，以類感也。然必未滿三月，混沌未分，服之庶克有濟。常見雞抱卵時，以斧置窠，令刃向下，則匹離盡。術之靈幻，又不得不信也。

又方 取原蠶屎一作十枚，井花水服之，日三〇。又方 取弓弩絃一枚，縫囊盛帶之，要女者帶雌黃。○又方 以斧一柄，於產婦臥腰下，滿百日去之。○又方 取雄黃一兩，縫囊盛帶之，要女者帶雌黃。○又方 以斧一柄，於產婦臥。

論曰。何以知婦人妊娠脉平而虛者。乳子法也。經云。陰搏陽別謂之有子。此是血氣和調。陽施陰化也。診其手少陰脉動甚者。妊子也。少陰心脉也。心主血脉。又腎名胞。明子户。尺中腎脉也。尺中之脉。按之不絕。法妊娠也。三部脉沉浮正等。按之無絕者。有娠也。妊娠初時寸微小。呼吸五至。三月而尺數也。妊娠四月。欲知男女者。左疾為男。右疾為女。左右俱疾為產二子。又法左手沉實為男。右手浮大為女。左右手俱沉實。猥生二男。俱浮大猥生二女。尺脉若左偏大為男。右偏大為女。左右俱大。產二子。大者如實狀。又法左手尺中浮大者男。右手尺中沉細者女。若來而斷絕者。月水不利。又法左右尺俱浮為產二男。不然女作男生。俱沉為產二女。不爾。男作女生。又法得太陰脉為男。得太陽脉為女。太陰脉沉。太陽脉浮。又遣妊娠人面南行。還復呼之。左迴首者是男。右迴首者是女。又婦人妊娠。其夫左乳房有核是男。右乳房有核是女。妊娠欲知將產者。懷妊離經。其脉浮設復痛引腰脊為今出也。但離經者不病也。又法欲生其脉離經。夜半覺痛。日中則生也。論曰。凡婦人虛羸血氣不足。腎氣又弱。或當風飲冷太過。心下有淡水者。欲有胎而喜病阻。所謂欲有胎者。其人月水尚來。顏色肌膚如常。但苦沈重。憤悶不欲飲食。人不知其患所在。脉理順時平和。則是欲有娠也。如此經二月日後。使覺不通。則結胎也。阻病者。患心中憤悶。頭重眼眩。四肢沉重。懈惰不欲執作。惡聞食氣。欲噉鹹酸果實。多卧少起。世謂惡食。其至三四月日已上。皆大劇吐逆。不能自勝舉也。此由經血既閉。水漬於藏。藏氣不宣通。故心煩憤悶。氣逆而嘔吐也。血脉不通。經絡否澀。則四肢沉重。挾風則頭目眩也。覺如此候者。便宜服半夏茯苓湯。數劑後。將茯苓丸。淡水消除便欲食也。既得食力體強。氣盛力足。養胎母便健矣。古今治阻病方有十數首。不問虛實冷熱。食少殆死者活於此方。

半夏茯苓湯 治妊娠阻病。心中憤悶。空煩吐逆。惡聞食氣。頭眩體重。四肢百節疼煩沉重。多臥少起。惡寒汗出。痰極黃瘦方。半夏 生薑各三錢。乾地黃 茯苓各八錢。橘皮 旋覆花 細辛 人參 芍藥

芎、葛、桔梗、甘草各二錢。右十二味㕮咀以水一斗者取三升分三服。若病阻積月日不得治及服藥冷熱失候，病變客熱煩渴口生瘡者去橘皮細辛加前胡知母各十二錢。若變冷下痢者去地黃加桂心十二錢。若食少胃中虛生熱大便閉塞小便赤少者去地黃加大黃十八錢黃芩六錢餘依方服一劑得下後消息看氣力冷熱增損方調定更服一劑湯便急服茯苓丸令能食使強健也。忌生熟醋滑油膩松菜海藻。

衍義

妊娠惡阻良由母氣不充精微稟於胎息水穀之氣不能孚化蘊積而為痰涎汪洋汎於心下而致嘔逆困殆在胎息將成時吸取母氣過甚則其阻彌劇調適之法惟以健運豁痰為首務方用人參鼓舞二陳之製以運痰止嘔兼旋覆桔梗以升散結氣芎芍地黃以保護榮血用細辛者協濟芎地以開血分經脉竅隧之邪也。偶服後煩熱下痢或二便閉塞是必兼理客氣其加桂心加大黃當效。前大黃圓及後方茯苓丸之製龐安常言桂不傷胎且熬令黑則專散氣而無壯火食氣之患大黃熬黑但能泄熱而無苦寒傷中之慮世俗每謂半夏辛散胎未成形時為之功禁若妊娠肥盛多痰者不去其痰則胎不安。覆瘡多火者不清其火則胎不穩時師咸謂黃芩白朮為安胎專藥孰知半夏大黃桂心有安胎妙用乎。歷觀千金諸方每以大黃同薑桂任補益之用人參協硝黃佐克敵之功不由千金之門何以求應變之策耶。

茯苓圓

治妊娠阻病患心中煩悶頭眩重憎聞飲食氣便嘔逆吐悶顛倒四肢垂弱不自勝持服之即

效先服半夏茯苓湯兩劑後服此方

茯苓

半夏

桂心

乾薑

兩

白朮

二兩

人參

一兩

葛根

甘草

枳實

各二

右十味為末蜜和丸如梧子大飲服二十九漸加至三十九日三用後

乾薑半夏橘皮白朮葛根  
只五味妊娠忌桂枝故禁

衍義

此方合理中六君枳朮桂苓等湯統以健脾運痰為務妙用尤在葛根一味鼓舞胃中清陽之

青竹茹湯 治妊娠惡阻嘔吐不下食方 青竹茹

橘皮八味茶 生薑兩 半夏珠

右五味

哎咀以水六升煮取二升半分三服

青竹茹

治妊娠惡阻嘔吐不下食方

青竹茹

橘皮八味茶 生薑兩 半夏珠

右五味

衍義 二陳湯滌痰止逆之專藥也。橘嫌甘草之助滿，乃易竹茹之涼潤，既清膈上稠痰，復解胎息蘊

熱，一舉而兩得之矣。

橘皮湯

治妊娠嘔吐不下食方 橘皮

竹茹

人參

白朮各十

生薑一兩

厚朴十二

右六味哎

橘皮湯

治妊娠嘔吐不下食方 橘皮

竹茹

人參

白朮各十

生薑一兩

厚朴十二

右六味哎

咀以水七升煮取二升半分三服不瘥重作衍義此本金匱橘皮竹茹湯於中裁去大棗甘草加入白朮厚朴變止嘔其機用之靈活如此惡阻諸治無逾以上數法也

養胎第三

論二首 禁忌一首 逐月養胎二十首

方三十三首

論曰：舊說凡受胎三月，逐物變化，稟質未定，故妊娠三月，欲得觀犀象猛獸珠玉寶物，欲得見賢人君子，盛德大師，觀禮樂鐘鼓俎豆軍旅陳設，焚燒名香，口誦詩書，古今嚴誠，居處簡靜，割不正，不食席不正，不坐，彈琴瑟，調心神，和性情，節嗜慾，庶事清淨，生子皆良長，壽忠孝仁義聰慧無疾，斯蓋文王胎教也。論曰：兒在胎日月未滿，陰陽未備，腑臟骨節皆未成足，故自初訖於將產，飲食居處皆有禁忌。妊娠食羊肝令子多厄，食山羊肉令子多病，妊娠食驢馬肉令子延月，食驥肉難產，妊娠食兔肉令子無聲音，并缺脅，妊娠食雞子及乾鯉魚令子多瘡，妊娠食雞肉糯米令子多寸白蟲，妊娠食櫈并鴨子令子倒出心寒，妊娠食鵝肉并豆醬令子滿面多黑子，妊娠食雀肉飲酒令子心淫情亂，不畏羞恥，妊娠食鱉令子項短，妊娠食冰漿絕胎，妊娠勿向非常地大小便必半產殺人。

徐之才逐月養胎方

妊娠一月名始胚，飲食精熟，酸美受御，宜食大麥母食腥辛，是謂綫正，妊娠一月，足厥陰脉養不可針

千金要方

卷二

民國四年石印

灸其經如大腸行間五里中都等穴是也足厥陰內屬於肝。肝主筋及血。一月之時。血行否澀。不為力事。寢必安靜。無令恐畏。妊娠一月。陰陽新合。為胎寒多為痛熱。多卒驚舉。重腰痛。腹滿胞急。卒有所下。當預安之。宜服烏雌雞丸。

烏雌雞湯方

烏母雞一隻治茯苓

阿膠兩

生茱萸一升

麥門冬五合

人參

芍藥

白朮各三兩

草生薑各一兩

右十味㕮咀以水一斗二升煮雞取汁六升去雞下藥煎取三升內酒三升并膠烊

盡取三升放溫每服一升日三

衍義

足厥陰稟東方生發之氣。合衝脈而主血海。專司胎息化機。設不慎而見腰痛腹滿胞急。卒有所下。不得不藉血肉之味以安之。雞屬巽而主肝血。取其性以助母氣。黑以滋腎血也。然血肉性緩。非

藉參苓虎草陽生之力。則胎氣豈能速應其用。茱萸門冬各有二義。茱萸辛溫。不特化茱萸之辛熱。并以解氤氳之穢毒。比皆人所未知。生薑醇酒以鼓舞諸藥之性耳。然胎氣傷在一月之內。烏知不為經病而漫用安胎之劑耶。必因有所觸而卒有所下。故宜急安以保貞固。設本婦素稟血熱。則茱萸又難禁用。胎息本嫌下瀉。其門冬惡可漫施。先輩立法。不過舉其大義。安能一一盡合人之資稟感觸變態乎。然能彙通以後逐月治例。應亦無出其右也。

補胎湯

若曾傷一月胎者。當預服此方。

細辛一兩

防風

乾地黃

白朮各二兩

生薑四兩

吳茱萸

太麥各五升

烏梅一升

右八味㕮咀以水七升煮取二升半分三服先食服多寒者倍細辛茱萸熟多

渴者去之。加天花粉二兩。若有所思去大麥加柏子仁三合。一方有人參一兩。

衍義

補胎者。補胎氣之滲漏。非補胎氣之不足也。胎始一月。雖未見其不安。然前曾傷在一月。當力為之預防。通推所墜之肉。若子藏不淨。何能受孕。今既能孕。諒非中有宿病也。惟本婦稟體過豐。濕痰侵犯子藏。稟體過癆。血熱不能滋養。而致不安者耳。

長大不慮其鼓之上逆也。試觀五月以後治例，自可默識矣。

妊娠二月名始膏，無食卒脾居處必靜。男子勿勞百節，皆痛是為胎始結。妊娠二月足少陽脈養不可針灸其經。如胆竅却塹付湯絕骨足少陽內屬於胆主精二月之時兒精成於胞裏當慎護驚動也。妊娠二月始陰陽蹺經，有寒多壞不成，有熱即萎悴。中風寒有所動搖，心滿臍下懸急，腰背強痛，卒有所下乍寒乍熱，宜服艾葉湯。

艾葉湯方 艾葉 丹參 當歸 麻黃各二兩 人參 阿膠各三兩 生薑四分 甘草六兩 大棗十二枚 右九味㕮咀以酒三升水一斗煮減半去滓，內膠煎取三升分三服。一方用烏母雞一隻宿肥者治如食法割頭取血，內三升酒中相和，次以水一斗二升先煮，取汁去雞內藥煎取三升分溫三服。

**衍義** 妊娠足少陽養胎時有所傷犯而卒有所下，且乍寒乍熱，有似乎中風寒狀，以證見心滿臍下懸急，腰背強痛，不得不以安胎為務。遂於膠、人參、歸、薑、丹、麻等一味，縱非風寒致病，亦可藉以開發肌腠，使內蘊之熱不致侵損胎息。雖其例下有中風寒三字，實非為風寒設也。麻黃在育龍續命方中，洵為發汗重劑，在此方與後菊花湯中，不過借以宣散蘊熱之使味耳。

黃連湯 有曾傷二月胎者，當預服此方。川連 人參各一兩 吳茱萸五合 生薑三兩 生地五兩一方用阿膠 右五味㕮咀以酢漿七升煮取三升分四服，日三夜一十日一修合。若頗覺不安加烏梅一升，加烏梅者不用酢漿，直用清水耳。一方用當歸半兩。

**衍義** 妊娠惡阻，皆由胎急內吸母氣，母之胃弱，不能敷布水精而為嘔逆，以懷孕兩月正當少陽養胎之時，少陽為陰陽交界之限，裏寒欲出，膈熱阻拒，所以嘔惡。因前曾傷兩月之胎，恐其復端前轍，計

維左金丸中茱萸以溫下脫之寒。川連以化膈上之熱。胃氣不足人參助之。子氣不安地黃護之。更取生薑辛散開豁疾癥。涎酢漿酸收不令上涌。倘服後覺不安必是本婦營氣不勝。固閉即當改用烏梅。兼開胃氣一舉而兩得之矣。然地黃滯膈。嘔家所禁。而此用之無礙。且得留連諸藥其建止逆之功為治妊娠惡阻。頂門之針而方下所主鐵毫不露。洵大靈機之不可輕泄如此。

妊娠三月名始胎。當此之時未有定儀。見物而化。欲生男者操弓矢。欲生女者弄珠璣。欲子美好數祝。鑿玉。欲子賢良端坐清虛。是謂外象而內感者也。妊娠三月。手心主內。屬於心。無悲哀思慮驚動。妊娠三月為定形。有寒大便青。有熱小便難。不赤則黃。卒驚恐憂愁嗔怒喜顛仆動於經脈。腹滿繞脅苦痛或腰背痛卒有所下。宜服雄雞湯。

雄雞湯方

雄雞一隻治如食法

黃芩

白朮

生薑各一兩麥冬五合白芍四兩大棗十二枚擘

甘草

人參

茯苓

升分三服

一日令盡當溫臥

一方無黃芩。生薑用當歸川芎各二兩。

行義

阿膠各二兩

右十一味咬咀以水一斗三升煮雞減半出雞內藥煮取半內清酒三升并膠煎取三

升分三服

一日令盡當溫臥

一方無黃芩。生薑用當歸川芎各二兩。

茱萸之辛熟易入黃芩之苦寒。使包絡之大不致內擾。而胎息安矣。用棗者所以助薑發諸藥性也。

荻神湯

若曾傷三月胎者當預服此方

荻神丹參

龍骨各一兩

阿膠

當歸

甘草

人參各二兩

升分三服

一日令盡當溫臥

一方無黃芩。生薑用當歸川芎各二兩。

大棗各二兩赤小草二十

右九味咬咀以酢漿一斗煮取三升分四服先食服七日後服一劑腰痛

者加桑寄生二兩深師有蘿白二兩麻子仁一升

衍義

此湯治曾傷三月之胎故於調補氣血藥中用龍骨入肝以斂其固脫。赤小草歸心以承制其

妊娠四月始受水精以成血脈。食宜穇梗羹宜魚雁。是謂盛血氣以通耳目而行經絡。

妊娠四月。手少火可無消爍胎氣之虞矣。

頭項強痛寒熱或驚動身軀腰背腹痛往來有時胎上迫胸心煩不得安卒有所下宜服菊花湯

菊花湯方

菊花一枚大麥冬一升大棗十二枚

人參半兩甘草當歸各二兩

麻黃阿膠各二兩

半夏四兩

生薑五兩

右十味㕮咀以水八升煮減半內清酒三升并膠煎取三升分二服溫卧當汗以粉粉之

護風寒四五日

一方用烏雌雞一隻煮水煎服

衍義

胎息四月始受水精以成血脈養胎屬乎少陽火氣用事最易損墮若寒鬱大邪惡阻彌甚熱

蒸子藏漫數異常然胎已成形未必便下必卒受風寒或有所驚動勢難叵測不得不於安胎劑中兼麻黃一味以開泄之雖與前艾葉湯並用麻黃其間輕重迥殊餘味大都相類彼以胎未具體固宜艾葉丹參之溫以助之此以相火養胎又需麥冬菊花之清以潤之其用半夏者專滌胞門垢膩無慮辛散傷胎也倘服後汗大出以粉粉之立法雖爾設本婦力難勝任但當師事其法奚必株守其方予嘗以柴蘇代麻黃既可散邪又可安胎未嘗不信手合轍也

調中湯 若曾傷四月胎者當預服此方  
白芍 生薑各四兩厚朴 枳實 生李根白皮 白朮 柴胡各二兩 繢斷 川芎 甘草各一兩  
當歸半兩 烏梅一升 右十二味㕮咀以水一斗煮取三升分四服

日三夜一八日後復服一劑

衍義

調中者調土中之墩阜坎陷也土為萬物之母一息不調便生疾苦况曾傷四月之孕至此時能無坎陷乎固之之法阜則削之陷則培之方中枳實厚朴削平墩阜之削也白朮甘草運平坎陷之削也芎歸芍續疏通泉脈之劑也柴胡李根一升清陽一降逆氣生薑烏梅一宣上壅一固下脫務令中州之氣無過不及以平為期則胎息之運動綽有餘地孰謂立方之名無深意存焉

妊娠五月始受火精以成其氣臥息晏起沐浴浣火深其居處厚其衣服朝吸天光以避寒殃其食稻麥其羹牛羊和以茱萸調以五味是謂養氣以定五臟妊娠五月足太陰脈養不可針灸其經如隱白大都公孫商

邱三陰交漏谷陰後泉等穴是也足太陰內輸於脾。五月之時兒四肢皆成無大饑無甚飽無食乾燥無自炙熱無太倦。妊娠五月多熱苦頭眩心亂嘔吐有寒苦腹滿痛小便數卒有恐怖四肢疼痛寒熱胎動無常處腹痛悶欲仆卒有所下宜服阿膠湯。

阿膠湯方 河膠四兩 人參一兩 生薑六兩 當歸 白芍 甘草 黃芩各二錢 旋覆花二合 吴茱萸七合 麥冬一升 右十味㕮咀以水九升煮藥減半內清酒三升并膠微火煎取三升半分四服日三夜一先食服使愈不瘥再服 一方用烏母雞一隻割取咽血內酒中以水煮雞以前藥減半內酒并膠煎取三升半分四服

**衍義** 妊娠五月雖屬足太陰養胎然胎息始受火精而能運動務宜養氣以定五臟設有觸動而卒有所下則宜大固氣血以安之方中諸藥皆平調氣血之劑惟旋覆一味不可不講本經治結氣別錄消胸上痰結既權開胃止嘔逆仲景治心下痞堅噫氣不除同葱白新絳治婦人半產漏下合諸治推之則覆花之用可瞭然矣大抵婦人經漏胎息之病元氣雖虛未有不挾風氣痰濕瘀積者觀柏子仁圓五石澤蘭丸等方自明

安中丸 有曾傷五月胎者當預服此方 黃芩一兩 當歸 川芎 乾地黃 人參各二兩 甘草 芍藥各三 生薑六兩 麥冬一升 五味子 大麻仁錢五粒 大棗五十枚 右十二味㕮咀以水七升清酒五升煮取三升半分四服日三夜一七日復服一劑

**衍義** 前調中湯預調曾傷四月之胎此安中湯預安曾傷五月之胎夫調之與安大費斟酌調則有平治之權安則無越削之理彼以脾有蘊積故宜枳實厚朴以清之此以素虧津液又須生脈四物以濡之用麻仁者必妊娠素有脾約之故然麻仁在此方與麻仁丸中不同設非脾約似可勿用若中有宿滯雖當五月調中何妨倘素羸虧弱縱在四月安中竟與勿疑規矩不出方圓之外也