



太陽

傷風
傷寒
兩傷
方

尚論後篇
而

尙論後篇卷之三諸方目錄

太陽傷風諸方

計十五方除重

太陽傷寒方

計三十九方除重附

太陽兩傷方

計十方除重

尙論張仲景傷寒

論太陽本經諸方脉症卷之三

西昌喻昌嘉言甫著

黎川陳宰誠伯常重梓

尙論諸方大意

仲景一百一十三方用本草九十一種耳仲景

上迦神農本經藥三百六十五種効法周天三

百六十五度之數應三不而合四時妙義開天

也仲景取述神農本經藥品纔九十一種入傷

寒論中輔相裁成有合六經之大綱者有合六

經之一目者蓋神農百病兼收而仲景則由六

經以例百病。所以於上古本經取裁九十一種。用之不盡萬世而後。星日炳然。聖之又聖者矣。梁陶隱君別錄。倍之爲七百三十種。迨唐本圖經證類。宋嘉佑政和旁搜編錄。於是旁門捷徑。各自成名者多矣。而仲景宮牆生色。間出英賢。數十輩。尤爲不孤。識大識小。總寸二十七。百四十六種。病雖百灰。藥無纖漏。天下後世永賴焉。然一千七百四十六種。顯現億兆。如同一日。昭式乃至。漸推漸廣。觀察盡矣。何獨仲景九十一種。賢哲挺生。莫識厥旨。昌也。晚進無識。手集神。

農本經竊以傷寒論中藥品為主其晉唐以後諸賢發揮易寒論全方有得者亦一一錄出而昌亦少步從諸方之後總欲門下好學隨證問藥一曰燎然無檢書之苦難是慰耳

太陽經風傷衛方

辨中風證用桂枝湯解肌大綱總法

桂枝湯方

桂枝 三兩 去皮 芍藥 三兩 味苦 甘草 二兩 味辛 熟 酸微寒

炙味 生薑 三兩 切 大棗 十二枚 味甘 潤

右五味咬咀以水七升微火煮取三升去滓適寒

溫服一升服已須臾。歔熱稀粥一升餘。以助藥力。
溫覆令一時許。遍身漿漿微似有汗者。益佳。不可
令如水淋漓。病必不除。若一服汗出。病差。停後服。
不必盡劑。若不汗。更服。依前法。又不汗。後服小促。
役其間。半日許。令三服盡。若病重者。一日一夜服。
周時觀之。服一劑盡。病證猶在者。更作服。若汗不
出者。乃服至二三劑。禁生冷粘滑肉麵五辛酒酪
臭惡等物。

太陽中風。陽浮而陰弱。陽浮者。熱自發。陰弱者。汗自
出。當發惡寒。淅淅惡風。翕翕發熱。宜桂枝湯。

仲景原

風之傷人也。頭先受之。故令頭痛。風在表則表實。故令發熱。風爲陽氣。亦爲陽。同類相從。則傷衛外之氣。衛傷則無以固衛津液。故令汗出。其惡風者。衛氣不能衛也。其脈緩者。衛氣不能鼓也。上件皆太陽症。故曰太陽中風。桂枝辛甘。辛則能解肌。甘則能實表。內經曰。辛甘發散爲陽。故用之以治風。然惡其走泄陰氣。故用芍藥之酸以收之。佐以生薑甘草大棗。此發散而兼和裏之意。是方也。惟表邪乃可用之。若陽邪去表入裏。裏作燥渴二便秘結。此宜承氣之時也。而誤用之。則反矣。昌按承氣

之誤庸者固然而工者悞在微細仲景諄切不似此項逐條本文詳玩始獲

凡桂枝湯病症者常自汗出小便不數手足溫和或手足指稍露之則微冷覆之則溫渾身熱微煩而又憎寒始可行之若病者無汗小便不數手足溫和或手足逆身冷不惡寒反惡熱或飲酒後慎不可行桂枝湯也脉緊必無汗有汗不可悞作桂枝症此脉與症仲景說得甚明後人看不透所以不敢用此方假令寸口脉微名曰陽不足陰氣上入陽中則洒淅惡寒也尺脉弱名曰陰不足陽氣

下陷入陰中則發熱也。此謂元氣受病而然也。又曰陽微則惡寒。陰微則發熱。醫以汗之使陽氣微。又大下之令陰氣弱。此謂醫所使也。大抵陰不足陽往從之。故陽內隔而發熱。陽不足陰往乘之。故陰上入陽中則惡寒。舉此二端。明白易曉。何憚而不用桂枝湯哉。

仲景治表虛製此湯。桂枝味辛熱發散助陽。體輕本乎天者。親上。故桂枝爲君。芍藥甘草佐之。如陽脈清。陰脈弦。腹中急痛。乃製小建中湯。以芍藥爲君。桂枝甘草佐之。一則治其表虛。一則治其裏虛。

故各有主用也。

以桂枝易肉桂。治傷寒腹痛。神品藥也。如夏中熱腹疼。少加黃芩。去桂。痛立止。桂於春夏二時爲禁藥。

按經云。桂枝人咽。陽盛則斃。春夏發者爲禁藥也。桂能動血。血熱者爲禁藥也。未得桂而死。肝不足者爲禁藥也。

桂枝湯有禁用三法。

仲景本文并昌論

汗後水氣且逆。有禁更汗增滿一法。

本文并昌論

中風病。主用桂枝湯解肌和營衛七法。

本文并昌論

或問桂枝湯發字之義曰一桂枝耳或云發汗或云當得汗解或云當發汗更發汗宜桂枝湯者數方是用桂枝發汗也復云無汗不得用桂枝又曰汗家不得重發汗又曰發汗過多者都用桂枝甘草湯是閉汗也一藥二用如何說得仲景發汗與本草出汗之義相通爲一答曰本草云桂味辛甘熱無毒能爲百藥之長通血脈止煩出汗者是調血而汗自出也仲景云藏無他病發熱自汗者此衛氣不和也又曰自汗者爲營氣和營氣和則外不諧以衛氣不與營氣和諧也營氣和則愈故皆

用桂枝湯調和營衛。營衛既和，則汗自出矣。風邪由此而解，非桂枝能於腠理發出汗也。以其固閉營血，衛氣自和，邪無容地而出矣。其實則閉汗孔也。昧者不解閉汗之意，凡是病者俱用桂枝湯發汗，若與中風自汗者合，效如桴鼓。因見其取効而病愈，則曰此桂枝發出汗也。遂不問傷寒無汗者，亦與桂枝湯，悞之甚矣。故仲景言無汗不得服桂枝，是閉汗孔也。又曰發汗多人手，胷心心悸，發得按者，用桂枝甘草湯，是亦閉汗孔也。又曰汗家不得重發汗，若桂枝湯發汗，是重發汗也。凡桂枝條

下言發字當認作出字是汗自然出也非若麻黃能開腠理而發出汗也本草出汗二字上文有通血脈一句是非三焦衛氣皮毛中藥是爲營血中藥也如是則出汗二字當認作營衛和自然汗出非桂開腠理而發出汗也故後人用桂治虛汗讀者當逆察其意則可矣噫神農作於前仲景述於後前聖後聖其揆一矣

不解肌或悞汗病邪入裏用五苓兩解表裏二法一法水逆用之多服煖水汗出愈一法脉浮小便不利微熱消渴者用之

五苓散方

猪苓

十八銖
去皮

茯苓

十八銖

澤瀉

一兩
六銖

白朮

十八銖

桂

半兩

右五味爲散，以白飲和服，方寸匕，日三多服，煖水

汗出愈。

不解肌而悞發大汗，其變逆有救，亡陽漏風二法。

一法真武

一法桂枝加附子湯

真武湯方

此本少陰經之神方，并加減法，而太陽上篇

先錄之至太陽下篇尤宜緊要先同錄此

茯苓 三兩 芍藥 三兩 生薑 三兩切

白朮 二兩 附子 一枚炮去皮破八片

右五味以水八升煮取三升去滓溫服七合日三服

桂枝加附子湯

於桂枝湯內加附子一枚餘依桂枝湯法

不解肌而用燒鍼取汗寒入核起炙核止變一法

桂枝加桂湯更加桂

於桂枝湯方內更加桂枝二兩

中風肌未解不可下宜用桂枝湯解外一法

桂枝湯

方見前

不解肌反悞下邪不服者於前下藥內更加桂枝湯一法

卽桂枝大黃湯之互詞因上衝陽位故兩解之也、不上衝者不用此力

不解肌反悞下心痞用溫補藥兩解表裏一法

桂枝人參湯

卽理中加桂枝而易其名也

桂枝

四兩 去皮

甘草

四兩 炙

白朮

三兩

人參

三兩

乾薑

三兩

右五味以水九升先煎四味取五升內桂枝更煮取三升去滓溫服一升日再服夜一服

或問大柴胡瀉也桂枝人參湯補也何爲皆治下利心下痞鞭曰此非裏熱乃下之早因作痞裏虛協熱而利表又不解故與桂枝人參湯和裏解表若夫傷寒發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐而下利者表和而裏病也以心下痞鞭故爲實當以大柴胡下之二者心下痞鞭雖同而虛實之症有別故