

第七冊

時行癆疫病案
時行痘疫病案

全國名醫驗案類編

上海大東書局印行



南京中医药大学图书馆版权所有

當國代

名醫驗案類編目錄

二集 八大傳染病案

第十一卷 時行痢疫病案

急性疫痢案

陳務齋

急性疫痢案

王經邦

急性疫痢案

何拯華

五色疫痢案

何拯華

熱毒赤痢案

張錫純

熱毒赤痢案

莊虞卿

伏熱赤痢案

周小農



南京中医药大学图书馆版权

暑毒赤痢案

錢蘇齋

暑毒赤痢案

丁佑之

伏暑赤痢案

何拯華

赤痢轉虛案

吳宗熙

疫痢末期案

劉萬年



南京中医药大学图书馆版权所有

代當
全國名醫驗案類編

二集 八大傳染病案

第十一卷 時行痢疫病案

○急性疫痢案

〔病者〕林衡。年五十餘歲。

〔病名〕急性疫痢。（傳染病） 西名赤痢。

〔原因〕素因不攝衛生。過食辛燥。臟腑鬱熱。腸胃發炎。誘因天氣不佳。微菌飛

揚空氣不潔。由口鼻吸受。直接傳染。

〔症候〕驟然惡寒發熱。頭痛口渴。四肢煩疼。腹中絞痛。大便下赤白痢。前急後重。日夜達數十次。繼則全體大熱不休。噤口粥飯不能下咽。食量全缺。

陳務齋住梧州四
方井街



口渴連連飲水不能制止。排便之後，生劇烈之疼痛。肛門灼熱，下痢則
加多二倍。日夜達一百餘次。排泄之物絕無糞色。俱是赤多白少。赤者
係稀量之血。水白者脂膏之類。肌肉消瘦。形體枯黑。脣焦而烈。齒黑而
枯。面黑目赤。氣逆喘急。熱臭非常。晝夜不眠。勢甚猛烈。

〔診斷〕診左脈沈伏。右脈浮數已極。體溫升騰達一百零四度。舌苔黑燥。起刺
脈症合參。乃急性傳染病之赤痢症也。查閱前醫數方。或用驅風解表。
喻氏倉廩湯加減。以助其炎燥。或用清潤之劑。仲景黃芩湯加味。而緩
不濟急。遂致釀成危急不治之症。余見一息尚存。豈能坐視。不得不立

方援救。

〔療法〕急用大承氣湯加味。取生軍、芒硝、桃仁、滑石。推蕩大腸而除鬱熱。爲君。
石膏粉葛、平陽明熱。燥生津解肌。爲臣。黃柏、山梔、銀花、生地、白芍。瀉心
肝。伏火涼血。敗毒爲佐。厚樸枳實下氣寬中。而除急重。爲使。一服後則

平平無加無減。將方每味再加倍。連二服後。則痛渴痢略減。將方每味再加二倍。連三服後。則瀉稀量膠黃之糞數次。然後燥渴大減。急重已除。赤痢減少。日夜達數十次。食能下咽。略能睡眠。診脈左右弦數。又用清熱解毒厚腸湯。取生軍石膏山梔粉葛黃連銀花錦地羅白芍甘草木香地榆歸身生地去臓腑鬱熱涼血敗毒平肝潤燥理氣厚腸連五服後。則燥渴更減。赤痢已除。惟瀉黃白膠潺。日夜尙有十餘次。食量略進。診脈緩滑而弱。又用參歸蓮子湯。取其補氣生津活血潤燥運脾健胃。厚腸去濕。連數服後。則燥渴已平。而瀉痢更減。惟腹尙有微痛。診脈滑滯。又用急止痛瀉丸。取其運脾理氣平肝厚腸降逆。去濕利水導滯。

【處方】大承氣湯加減方

生大黃 六錢

川厚樸 三錢

元明粉 四錢

川枳實 三錢

生石膏 八錢
研細

生葛根 二錢

滑石粉 四錢
包煎

光桃仁 三錢

生白芍

八錢

川黃柏

三錢

金銀花

三錢

鮮生地

一兩

焦山梔

三錢

煎服後將各味加倍

後再將各味加二倍

【次方】清熱敗毒厚腸湯

生大黃

五錢

生石膏

八錢

焦山梔

四錢

生葛根

二錢

川黃連

三錢

大歸身

錢半

生白芍

八錢

金銀花

三錢

錦地羅

三錢

廣木香

一錢

粉甘草

一錢

地榆炭

錢半

鮮生地

八錢

煎服

【三方】參歸蓮子湯

西洋參

三錢

當歸身

二錢

生白芍

三錢

開蓮米

四錢

淮山藥

五錢

雲茯苓

四錢

阿膠珠

二錢

炒薏仁

六錢

雲查肉

三錢

南芡實

五錢

閩澤瀉

二錢

粉甘草

錢半

煎服

【四方】急止痛瀉丸



川黃連

五錢

廣本香

三錢

延胡索

三錢

生白芍

四錢

茅蒼朮

一錢

雲茯苓

六錢

川鬱金

三錢

藿香梗

二錢

製香附

二錢

良薑片

一錢

川厚樸

二錢

粉甘草

一錢

瞿粟殼

四錢

閩澤瀉

四錢

共爲細末。蜜丸每重一錢。用好濃茶送服二丸。

【效果】十日燥平渴止。痢減急重。除食量略進。二十日痢止。食進元氣已復。

【說明】是年乙卯。噤口痢疾由此而起。死亡者不少。所起症狀無異。各人原因不同。而症有差異。施治不對症者。而症變亂複雜。多莫能救。是役余所治者不下數百人。療法亦不外如是。隨症加減。亦無不愈。

廉按此疫痢中之胃腸炎。其症最急而重。故凡赤痢、赤白痢、五色痢等起病之初。屬於實熱性質者。則由病原菌所釀成之病毒。充滿於腸內。宜先之以通利劑。掃蕩腹內之鬱毒。而後以調理劑作後療法。乃爲至當之順。



序。若不先掃盪病毒，而惟下痢之是恐，先防遏之，則死於腹滿熱盛苦悶之下，是卽由逆治致逆症者也。此時之逆症與實症相一致，今觀此案，可知其因症方藥之所以然矣。

○急性疫痢案

陳務齋

住梧州四
方井街

【病者】陳偉明女士，年十二歲，廣西容縣住鄉學界體壯。

【病名】急性疫痢。

【原因】素因飲食不節，膩滯太過，消化不良，積蓄腸胃，誘因往探姻戚，適痢疾流行，微菌飛揚，空氣不潔，防衛不慎，傳染而來。

【症候】驟然腹中絞痛大作，大便屢次下痢，前急後重，日夜達百餘次，排便之後，生劇烈之疼痛，肛門灼熱，口渴連連，飲水不能制止，食物不能下咽，排泄之便絕無糞色，俱是赤多白少，赤者稀量之，血水白者，乃脂肪膏油之類，面色黑緊，脣焦齒枯，舌苔黃厚，邊尖赤起，刺晝夜不能安眠，全

體大熱不休。瞬息不絕。勢甚急逼。危在旦夕。

【診斷】左右六脈浮弦數極。一吸已動七星。（見真人脈法）脈症合參。傳染。

病中之赤痢症也。查閱前醫之方。多用耗散之藥。耗其津。劫其血。損其氣。則焦躁異常。肺胃氣逆。津液枯竭。渴飲不止。腸胃炎熱已極。則噤日不能食。至成危急不治之症。余於此症略多經驗。不得不力圖救濟。

【療法】速用大承氣湯加桃仁、黃柏、銀花粉、葛石膏、生地。取推蕩大腸急下存津涼血。敗毒平胃清熱。服連三劑後急重已除。赤痢略減。燥渴略平。食量略進。診脈浮數退去。轉爲滑弱。又用參歸蓮子湯。取其補氣生津活血潤燥。運脾健胃。厚腸去濕。連服五劑後。食量更進。下痢更減。精神略好。元氣稍復。診脈微滑。又用急止痛瀉丸。取其運脾理氣。平肝厚腸。降逆去濕。利水導滯。

【處方】大承氣湯加減

生大黃

六錢

川厚樸

三錢

金銀花

三錢

芒硝

四錢

粉葛

四錢

光杏仁

三錢

川枳實

四錢

鮮生地

八錢

生石膏

八錢
研細

川黃柏

三錢

〔次方〕參歸蓮子湯

高麗參

錢半

當歸身

二錢

生白芍

三錢

開蓮子

四錢

淮山藥

五錢

雲茯苓

四錢

阿膠珠

二錢

炒薏苡

六錢

雲查肉

三錢

南芡實

五錢

閩澤瀉

二錢

粉甘草

一錢

〔三方〕急止痛瀉丸

川黃連

五錢

廣木香

三錢

延胡索

三錢

生白芍

四錢

茅蒼朮

四錢

雲茯苓

六錢

川鬱金

三錢

藿香梗

二錢

製香附

五錢

良薑片

二錢

川厚樸

三錢

瞿粟殼

四錢

閩澤瀉

四錢

粉甘草

二錢

煎服



十四味共爲細末，煉蜜爲丸，每重一錢，辰砂爲衣，每服一丸至二丸，用好濃熱茶送下。

【效果】五日痢減，急重除，米量略進。十五日食量更進，燥渴已除。二十日痢止，痛除，食量大進。元氣已復。後其家人老少患此症者，十之八九。余俱用此方法，十愈八九。而鄰村傳染此症者，則十中死七八。絕鮮生活，可謂慘矣。

廉按吾國所謂疫痢，內經謂之奇恒痢，卽德日醫所謂赤痢也，爲八大傳染病之一。據西醫研究所得，實地經驗，其病毒非菌則蟲，約有二種：一爲菌毒赤痢，一爲變蟲形赤痢。大旨以清熱解毒，防腐生肌等法爲主治，兼用血清注射，及灌腸法以佐之。此案遵內經通因通用之法，卽日本醫衍德醫之法，謂赤痢初期，腸中毒熱，腫疼，當務去腸內之刺戟，流通糞便，以防病勢之上進，爲治赤痢療法第一義。故病有上進之象，當相機而投以

下劑但下劑易增進患者之衰弱不可不謹慎用之至滋腸及注腸不但足以疏通其積滯且有緩解裏急後重之效是以用之最宜與陳案療法大致相同然就余所經驗傳染性赤痢亦有不宜用硝黃蕩滌者只可清血解毒滑以去着如犀角地黃湯合五仁湯加醋炒芫花重用貫仲三兩地漿水煎藥亦多奏效醫不執藥隨宜而施神而明之存乎其人耳

●急性疫痢案

王經邦住天台
柵門樓

【病者】車昌前年二十七歲業商住天台南鄉花桃莊

【病名】急性疫痢

【原因】暑穢水毒互結腸胃均從火化醞釀成疫

【症候】下痢純紅腹痛裏急後重晝夜百餘次溺短赤濁

【診斷】脈六部洪數搏指按之有神舌紅苔黃脈症合參此乃暑毒挾穢蘊蓄於內若不急治防驟有腐腸之變端也

〔療法〕以貫仲、銀花、玉樞丹解毒。痢爲君。芩連柏清熱爲臣。荷葉生芍消暑歟。

血爲佐。玉泉竹葉涼解大渴爲使也。

〔處方〕青子芩 三錢 川黃連 二錢 生川柏 錢半 生白芍 八錢

淡竹葉 三錢

鮮荷葉 一錢

玉泉散 二錢
荷葉包

玉樞丹 五粒
研細

煎湯代水

先用生貫仲

一兩 濟銀花 八錢

〔效果〕一劑病減大半。再劑大勢已平原方畧減用量加鮮生地一兩。鮮石斛五錢。清養胃陰而痊。

廉按此時疫赤痢也。俗稱爛腸瘻。前喻西昌治此症重用生大黃四兩。黃連甘草各二兩。以猛藥直攻腸胃。此案但以平劑清解疫毒。方亦穩健着力切合病情。貫仲玉樞丹尤爲解毒辟穀之要藥。

●急性疫痢案

〔病者〕王傳榮年八十歲業農住紹興東關鎮。

何拯華

紹興同善局



北京中医药大学图书馆版权所有

【病名】急性疫痢。

【原因】仲秋久晴無雨。天氣燥熱。疫痢流行。感染時氣而陡發。

【症候】身熱口渴。臍腹大痛。如刺如割。裏急後重。下利頻併。或腸垢帶血。或純下鮮血。日夜數十度。或百餘次。面赤脣紅。吐酸嘔苦。胸腹如焚。按之灼

手小溲赤澀。點滴而痛。

【診斷】脈右洪數。左弦勁舌紅刺如楊梅狀。苔黃燥。如刺此由血分熱毒與積滯相併。內攻腸胃。劫奪血液。下趨即內經所謂腸澼。下血。身熱者死。亦卽吳又可所謂下痢膿血。更加發熱而渴。心腹痞滿。嘔而不食。此疫痢兼症最爲危急是也。

【療法】若以痢勢太頻。妄用提澀。或但用涼歟。必至腸胃腐爛而斃。卽以查麵檳榔香連芩芍銀花炭等普通治痢之法以治此種毒痢。亦必胃腸液涸而亡。惟有仿吳氏急症急攻之法。用檳芍順氣湯加減。日夜連服二



三劑純服。頭煎以先下其疫毒。

【處方】花檳榔

二錢

赤白芍

各五錢

青子芩

三錢

小枳實

二錢

生甘草

一錢

元明粉

三錢

拌炒生錦紋

六錢

先用鮮貫仲

一兩

銀花

五錢

煎湯代水。

【次診】次日復診。赤痢次數已減。其半腹痛亦漸輕減。嘔吐酸苦亦除。惟身仍熱。胸腹依然灼手。黃苔雖退。舌轉紫紅。起刺捫之少津脈。左弦勁已減。轉爲沉數。此胃腸血液漸傷。而疫毒尙未肅清也。議以拔萃犀角地黃湯加玉樞丹涼血瀉火。撲滅毒菌。以救濟之。

【次方】犀角粉

一錢

鮮生地

四兩搗汁冲

青子芩

二錢

小川連

一錢

生錦紋

酒洗三錢

生西草

一錢

生白芍

一兩

玉樞丹

五粒研細藥湯調下

【三診】痢雖十減七八。而腹中切痛常常。後重所便之物多如爛炙。且有腐敗之臭。深恐腸中腐爛。病勢尙在險途。幸而脈勢稍柔。舌紫漸轉紅活。姑

以解毒生化湯加鮮生地金汁化腐生肌滋陰消毒以救腸中之潰爛，

【三方】金銀花

一兩

生白芍

八錢

生西草

錢半

參三七

二錢

鮮生地

四兩搗
汁沖

陳金汁

二兩

鴉膽子

去皮揀成實者四十九粒用龍眼肉一顆包七粒以七七之數爲劑

【四診】下痢次數僅五六次赤色已淡夾有膿毒黑垢切痛後重已除胃亦知饑思食惟舌色淡紅而乾乃陰液大虧之候議以大劑增液救陰以其來勢暴烈一身津液隨之奔竭待下痢止然後生津養血則枯槁一時難回今脈勢既減則火邪俱退不治痢而痢自止豈可泥滯潤之藥而不急用乎用增液湯合參燕麥冬湯以善其後。

【四方】大生地

六錢

元參

四錢

提麥冬

三錢

西洋參

錢半

光暹燕

二錢

奎冰糖

三錢

【效果】連服四劑下痢盡止但遺些少白沫胃已能進稀粥後用四君子湯加麥冬石斛調理旬餘方能消穀而痊。