

卷
伍伍肆
壹拾玖

第十七本

新
增
全圖足本醫宗金鑑

海上

書新啟

行發



御纂醫宗金鑑卷四十九

編輯婦科心法要訣

乳證門

乳汁不行證治

加味四物湯

產後血虛乳汁少四物花粉不留行木通猪蹄湯熬服葱白煎湯乳房淋註

產後乳汁不行因去血過多血少不行者宜四物湯加花粉王不留行木通猪蹄熬湯煎藥服外用葱白煎湯時時淋洗乳房以通其氣

湧泉散

氣脈壅塞乳脹痛湧泉散用白丁香王不留行天花粉漏蘆殭蠶猪蹄湯註
產後乳汁不行因瘀血停留氣脈壅滯者其乳必脹痛宜用湧泉散即白丁香王不留行花粉漏蘆殭蠶猪蹄湯煎服也

乳汁自湧證治

兔懷散

麥芽煎

產後乳汁暴湧出十全大補倍參耆食少乳多欲迴乳兔懷紅花芍膝歸無兒



食乳乳欲斷妙麥芽湯頻服宜〔註〕產後乳汁暴湧不止者乃氣血大虛宜平全大補湯倍用人參黃耆若食少乳多欲迴其乳者宜免懷散即紅花赤芍牛膝歸尾也若無兒食乳欲斷乳者用麥芽炒熟熬湯作茶飲之

乳證總括

乳房忽然紅腫痛往來寒熱乳癰成乳被兒吹因結核堅硬不通吹乳名初起結核不腫痛年深內潰乳巖形乳頭生瘡名妬乳細長垂痛乳懸稱〔註〕婦人乳房忽然紅腫堅硬疼痛憎寒壯熱頭痛者此欲成乳癰也若乳兒之時乳被兒口中氣吹以致乳管不通結核者名曰吹乳更有乳內結核如圍棋子不腫不痛但堅硬不散日久內潰者謂之乳巖其證甚凶若乳頭生小細瘡痛者為妬乳若瘀血上攻乳房忽然細小下垂長過於腹此名乳懸惟產後有之

乳癰證治

消毒飲

乳癰初起消毒飲青芷歸柴浙貝宣花粉銀花蠶草節寒熱荆防羌獨添膿成皂刺穿山甲潰後益氣養榮煎〔註〕乳癰乃陽明厥陰二經風熱壅盛初起宜服消毒飲即青皮白芷當歸柴胡浙貝母花粉金銀花殭蠶甘草節也若兼憎

寒壯熱者加荊芥防風羌活獨活以解散之若服後不消其膿已成者宜加皂角刺穿山甲以穿發之若潰後氣血虛者宜益氣養榮湯培補之他如潰久膿清不斂又須急服大劑參耆桂附矣

益氣養榮湯

方見前首
卷黨方內

吹乳證治

枯萑散

外敷法

吹乳結核枯萑散乳沒歸甘用酒熬更加皂刺名立效已成膿潰未成消外敷星夏蠶芷刺草烏為末蜜葱調〔註〕吹乳結核不散者當早消之久則成癰宜用枯萑散即枯萑實乳香沒藥當歸甘草酒熬服也若服後不散者加皂角刺名立效散膿成者潰未成者消外用南星半夏殭蠶白芷皂角刺草烏為末用葱汁合蜜調敷

乳巖證治

十六味流氣飲

青皮甘草散

乳巖鬱怒損肝脾流氣飲歸芍參耆芍防蘇芷枳桔草槆榔烏朴桂通隨外熨木香生地餅青皮甘草服無時潰後不愈須培補十全八珍或歸脾〔註〕乳巖



之證初起結核如圍棋子大不痛不癢五七年或十餘年從內潰破嵌空玲瓏洞竅深陷有如山巖故名乳巖皆緣抑鬱不舒或性急多怒損傷肝脾所致宜速服十六味流氣飲其方即當歸白芍人參黃耆川芎防風蘇葉白芷枳殼桂梗甘草檳榔烏藥厚樸官桂木通外以木香生地搗餅以熱器熨之且不時以青皮甘草為末煎濃薑湯調服戒七情遠葷味解開鬱怒方始能愈若潰後久不愈惟宜培補其氣血或十全大補湯八珍湯歸脾湯選用之

十全大補湯

八珍湯

歸脾湯

方俱見首卷

妬乳乳懸證治

鹿角散

連翹散

妬乳甘草鹿角散雞子黃調炙敷之連翹散防升元芍斂射硝黃甘杏宜瘀血上攻乳懸證芍歸湯飲薰鼻施不應單麻貼頂上乳收即去莫遲遲註乳頭生瘡謂之妬乳宜鹿角散敷之即鹿角甘草為末雞子黃調銅器內炙敷之內服連翹散即防風升麻元參白芍白斂射干芒硝大黃甘草杏仁也若產後瘀血上攻兩乳細長下垂過腹者謂之乳懸宜濃煎芍歸湯不時飲之以其餘藥薰鼻則瘀散乳即上升如不上者更以單麻仁搗貼頂心收即去之

芎歸飲

即佛手散
方見首卷

乳證門彙方

消毒飲

青皮

白芷

當歸

柴胡

浙貝母

殭蠶

花粉

金銀花

甘草節

各等分

共剉末水煎服

栝蒌散

栝蒌

乳香

沒藥

當歸

甘草

各等分

以上為末酒煎服

加皂角剉
各立效散

十六味流氣飲

當歸

白芍

人參

黃耆

各二錢

川芎

防風

蘇葉

白芷

枳殼

桔梗

各一錢

甘草

檳榔

各五分

烏藥

厚朴

官桂

木通

各八分

共剉為末每服五錢水煎服

青皮甘草散

青皮

甘草

各一錢

共為末煎濃薑湯調服

鹿角散

鹿角

甘草

各等分

共為末雞子黃調銅器內炙敷之

連翹散

防風

元參

各二錢

白欬

芒硝

大黃

射干

各一錢

升麻

五分

白芍

一錢

甘草

五分

杏仁

粒二十

以上劉薑水煎服

加味四物湯

當歸

白芍

熟地

川芎

花粉

王不留行

炒

木通

各二錢

以上七味猪蹄熬湯煎服

湧泉散

白丁香

王不留行

花粉

漏蘆

各二錢

用猪蹄湯煎服

兔懷散

紅花

赤芍

歸尾

牛膝

各二錢

共剉末水煎服

麥芽煎

麥芽

三兩

水煎作茶飲

前陰諸證門

陰腫證治

龍膽瀉肝湯

薰洗法

騰熨法

婦人疝瘕兩拗痛玉門腫脹墜而疼溼熱龍膽瀉肝治導赤車前澤瀉芩當歸
梔子龍膽草氣虛下陷補中升艾防大戟熬湯洗枳實陳皮炒熟騰註婦人
子戶腫脹墜痛及兩拗疼痛者謂之疝瘕乃肝心二經火盛溼熱下流所致宜
服龍膽瀉肝湯其方即導赤散生地木通甘草再加車前子澤瀉黃芩當歸黑

梔子龍膽草也若因中氣素虛下陷重墜者用補中益氣湯以升舉之外用蘄艾防風大戟熬湯薰洗更以枳實陳皮二味為末炒熱騰之其腫自消而痛自定也

陰痛證治

加味道遙散

乳香四物敷法

陰中痛名小戶嫁痛極手足不能舒內服加味道遙散四物乳香搗餅敷婦人陰中作痛名小戶嫁痛痛極往往手足不能伸舒由鬱熱傷損肝脾溼熱下注所致宜內服道遙散加丹皮梔子外以四物湯料合乳香搗餅納陰中其痛即定

道遙散

四物湯

俱見首卷

陰癢證治

桃仁雄黃膏

溼熱生蟲陰戶癢內服道遙龍膽方桃仁膏合雄黃末雞肝切片納中央註婦人陰癢多因溼熱生蟲甚則肢體倦怠小便淋漓宜服道遙散龍膽瀉肝湯外以桃仁研膏合雄黃末雞肝切片蘸藥納戶中其蟲一聞肝腥皆鑽肝內吮食將肝提出其病即愈



逍遙散

方見首卷

龍膽瀉肝湯

方見前陰腫條

陰挺證治

蛇床洗法

藜蘆敷法

陰挺下脫即癰疔突物如蛇如菌形溼熱腫痛溺赤數氣虛重墜便長清氣虛補中青梔入溼熱龍膽瀉肝尋外熬蛇床烏梅洗猪油藜蘆敷自升詳婦人陰挺或胞絡傷損或因分娩用力太過或因氣虛下陷溼熱下注陰中突出一物如蛇或如菌如雞冠者即古之癰疔類也屬熱者必腫痛小便赤數宜龍膽瀉肝湯屬虛者必重墜小便清長宜補中益氣湯加青皮梔子外用蛇床子烏梅熬水薰洗之更以猪油調藜蘆末敷之無不愈者

逍遙散

方見首卷

龍膽瀉肝湯

方見前陰腫條

陰瘡證治

加味四物湯

蜜蝕成瘡膿水滴時疼時癢蟲行同少腹脹悶溺赤瀝食少體倦晡熱烘四物柴梔丹膽草潰腐逍遙墜補中註婦人陰瘡名曰蜜蝕由七情鬱火傷損肝脾氣血凝滯溼熱下注久而蟲生蟲蝕成瘡膿水淋漓時疼時癢有若蟲行少腹



脹悶溺赤頻數食少體倦內熱晡熱經候不調赤白帶下種種證見宜分治之
腫痛者四物湯加柴胡梔子龍膽草若潰爛出水而痛者用加味逍遙散若重
墜者用補中益氣湯

加味逍遙散

方見前
陰痛條

四物湯

補中益氣湯

方俱見
首卷

陰痔證治

烏頭薰法

陰中突肉名陰痔或名茄子疾俗稱黃水易治白難治烏頭存性醋熬薰內服
逍遙與龍膽補中歸脾酌量行〔註〕婦人陰中有肉突出者名曰陰痔俗稱茄
子疾也流黃水者易治流白水者難治用烏頭燒存性釀醋熬薰內服逍遙散
補中益氣湯歸脾湯量其虛實酌而行之

逍遙散

歸脾湯

補中益氣湯

方俱見
首卷

陰冷證治

溫中坐藥

陰冷風寒客子臟桂附地黃丸最宜遠志乾薑蛇床子吳萸為末裹納中〔註〕
婦人陰冷皆由風寒乘虛客於子臟久之血凝氣滯多變他證且艱於受孕宜



桂附地黃丸

方見首卷

陰吹證治

膏髮煎

胃氣下泄陰吹喧金匱方用膏髮煎猪膏亂髮同煎服導從溺去法通元氣虛下陷大補治升提下陷升柴添註婦人陰吹者陰中時時氣出有聲如穀道轉矢氣狀金匱謂由穀氣實胃氣下泄用膏髮煎即猪膏煎亂髮服也導病從小便而出其法甚奧若氣血大虛中氣下陷者宜十全大補湯加升麻柴胡以升提之十全大補湯

方見首卷

交接出血證治

加味歸脾湯

桂心釜墨散

交接出血傷心脾伏龍肝末入歸脾千金桂心釜底墨酒服方寸匕相宜註婦人每交接輒出血者由傷損心脾二經也宜用歸脾湯加伏龍肝煎服或用千金方中桂心釜底墨二味為末酒沖服方寸匕自愈前陰諸證門彙方

龍膽瀉肝湯

生地 一錢

木通

車前子 各一錢五分

澤瀉

黃芩 各二錢

當歸 二錢

黑梔仁

龍膽草 各一錢

生甘草 五分

加燈草一團水煎服

洗方

防風 三錢

蘄艾 一團

大戟 一錢

共三味熬湯

薰洗

騰方

枳實

廣皮 各等分

共為末炒熱騰之

敷方

四物湯 一料

乳香 一錢

共搗餅納戶中其痛即定

桃仁雄黃膏

桃仁 五錢研膏

雄黃 三錢末

以上二味研勻用雞肫肝切

片蘸藥納戶中其蟲即攢入肝而瘡自止

陰挺洗法

蛇床子 五錢

烏梅 九枚

共二味熬湯乘熱薰洗

敷方

藜蘆 為末

用猪脂油調敷自收

陰痔薰法

烏梅

用醃醋熬薰自消

溫中坐藥方

遠志

乾薑

吳茱萸

蛇床子 各等分

以上為末綿裹納戶內一日二次換

膏髮煎

婦人亂髮 一團

用猪膏熬化服之小便利則



愈

桂心釜墨散

桂心

釜底墨各等

以上二味為末酒服方寸匕

雜證門

熱入血室

加味小柴胡湯

熱入血室經適斷邪熱乘虛血室安寒熱有時如瘧狀小柴胡加歸地丹註
金匱云婦人中風七八日續來寒熱發作有時經水適斷此為熱入血室其血
必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之此言邪熱未盡值經來乘虛入於
血室之間而潛藏之故令血結而寒熱有時如瘧狀也血室肝主之肝與膽為
表裏膽因肝受邪而病寒熱故用小柴胡湯主之也加當歸生地丹皮者所以
清血分之熱也

小柴胡湯

方見首卷柴胡
四物湯註中

熱入血室經適來晝日明了夜譫妄無犯胃氣上二焦熱隨血去自無恙

註

金匱云婦人傷寒發熱經水適來晝日明了夜則譫語如見鬼狀此為熱入血
室治之無犯胃氣及上二焦必自愈也此言熱雖入於血室然經行不斷則熱



不留結勿謂譫妄遂以硝黃犯其胃氣刺傷榮血小柴和解犯上二焦但俟其熱隨血去病必自愈傷寒論曰血自下下者愈此之謂也

刺期門法

清熱行血湯

熱入血室成結胸下血譫語頭汗出二者皆當刺期門或取或泄隨其實清熱行血桃紅丹靈脂地草穿山亦〔註〕金匱云婦人中風發熱惡寒經水適來得七八日熱除脈遲身涼胸脇滿如結胸狀譫語者此為熱入血室也當刺期門隨其實而取之又云陽明病下血譫語者此為熱入血室但頭汗出當刺期門隨其實而泄之澹然汗出者愈此二條一言適來即斷血結在裏為實證一言陽明病亦有熱入血室但下血頭汗出為不同故為熱入血室亦由肝實故均謂當刺期門也不能刺者以清熱行血湯治之其方即桃仁紅花丹皮五靈脂生地甘草穿山甲赤芍也合四證觀之大抵有寒熱如瘧之證方可用小柴胡否則或不藥自愈或刺期門而清熱行血以隨其實而瀉之此仲景心法也不得概以小柴胡治之也

血分水分總括

經水先閉後病腫任衝寒濕血壅經先發水腫後經閉水溢皮膚泛濫行血分

難醫水易治二者詳參要辨明〔註〕婦人經水先閉後病腫者乃寒濕傷於衝任血壅經隧也名曰血分若先病腫而後經閉者乃土不制水水邪泛濫溢於皮膚也名曰水分血分難治水分易治二者須詳細辨之

血分證治

加味小調經散

血分血壅不能行四肢浮腫病非輕但使經通腫自散紅丹膝入小調經〔註〕血分腫乃血壅不行流於四肢故令浮腫此不必治腫但調其經經通其腫自消宜小調經散加紅花丹皮牛膝治之

小調經散

方見三卷浮腫

水分證治

先腫後閉名水分停飲膀胱氣不行水消腫退經自至茯苓導水效通神〔註〕水分腫乃水飲內停膀胱之氣化不行水溢皮膚故令浮腫經閉也此但宜治水水消腫退其經自通用茯苓導水湯治之

茯苓導水湯

方見胎前門子腫條

夢與鬼交證治



北京中醫藥大學圖書館藏

加味歸脾湯

獨笑獨悲畏人見神虛夜夢鬼邪侵歸脾湯調辰砂珀定志清心魂魄寧註
婦人七情內傷虧損心脾神無所護鬼邪干正魂魄不寧故夢鬼交獨笑獨悲
如有對忤是其候也宜用歸脾湯調辰砂琥珀末服之則志定心清魂魄定而
無邪夢矣

歸脾湯

方見首卷

梅核氣證治

半夏厚朴湯

婦人咽中如炙嚮或如梅核結咽間半夏厚朴湯最效半朴蘇茯苓薑引煎註
千金方云咽中帖帖如有炙肉吐之不出吞之不下即所謂咽中如有炙嚮也
俗名梅核氣蓋因內傷七情外傷寒冷所致宜用金匱半夏厚朴湯主之即半
夏厚朴蘇茯苓生薑煎也

血風瘡證治

加味逍遙散

偏身瘡癰如丹毒瘡痛無時搔作瘡血風風濕兼血燥加味逍遙連地方愈後

白屑肌膚強血虛不潤養榮湯註婦人血風瘡證偏身起瘡癰如丹毒狀或
癢或痛搔之則成瘡由風溼血燥所致宜用加味逍遙散加黃連生地如瘡結
痂而愈復起白屑肌膚強硬者乃血少不潤也宜服益氣養榮湯

加味逍遙散

方見前
陰痛條

益氣養榮湯

方見
首卷

瘡證治

桂附地黄丸

憂思鬱怒肝脾損溼熱瘡生兩脇間外屬三陽為易治內屬三陰治每難初起
紅腫敗毒散膿水淋漓補中煎晡熱陰虛宜六味食少畏寒桂附丸註婦人
憂思鬱怒傷損肝脾或飲食不調損其胃氣則溼熱下注更被寒溼外邪所客
則必兩脇生瘡外屬足三陽經尚屬易治若生於內屬足三陰經每多難
愈初起紅腫宜人參敗毒散潰後膿水淋漓宜補中益氣湯若更晡熱是為陰虧
宜兼服六味地黄丸若食少體倦畏寒則為真陽不足宜服桂附地黄丸即六
味地黄丸加肉桂附子也

人參敗毒散

方見
後痢條

補中益氣湯

方見
首卷
崩漏條

六味地黄丸

方見
首卷

足跟痛證治



南京中醫藥大學圖書館藏