

綠

士材三書

三



病機沙篆卷五

雲間李中梓士材父著述

吳門尤乘生洲父增補

中風

風之爲言中也。肥人氣居於表。中氣必虛。土不生金。金氣漸薄。肝無所畏。風木乃淫。復來乘土。中氣益敗。乘其中虛。外邪襲之。則爲真中。西北方風高。往往有之。若但因中虛。不犯外邪。則爲類中。東南方柔弱。往往有之。

內經曰。風者百病之長。又曰。風者善行而數變。故客於脈。則爲厲風。客於藏府之俞。則爲偏風。風氣循風府而上。則爲腦風。自腦戶而合於太陽。則爲目風。飲酒見風汗出。則爲漏風。入房汗

出當風則爲內風。入於腸胃則爲腸風。外客腠理則爲泄風。  
正風邪風各不相同。經云：正風者從一方來，卽合時之正氣。  
其中人也淺合而自去邪風者冲後來者也。謂之虛邪，則  
中人也深不能自去。

經曰：暴疾卒死皆屬於火。東垣以卒然昏仆責之氣虛。蓋火即  
氣氣卽火同物而異名者也。當卒仆之時以竹瀝薑汁灌蘇合  
香丸或三生飲加人參竹瀝薑汁灌之。如抉口不開進藥且緩  
以細辛皂角爲末吹鼻取嚏卽甦無嚏者不治。

痰涎壅盛者宜與吐之。用牙皂四枚明礬一兩各爲細末和匀。  
輕者五分重者三分溫水調灌此名稀涎散服之不大嘔吐。但  
微微令涎自口角流出卽醒或橘紅一斤煎湯數碗多灌取吐。

○口開心絕。手撒脾絕。眼合肝絕。遺尿腎絕。聲如鼾者肺絕。虛極而陽脫也。五症不全見者。速以大劑參芪尤附。并急下關元氣海。可數十中之一。

髮直吐沫。搖頭上擗。面赤如粧。汗出如珠。皆死症矣。

經曰。虛邪偏客於身者。其人慄慄。稍衰則真氣去。邪氣獨留。發爲偏枯。又曰。身偏不用爲痛。言不變志。不亂病在分腠之間。益其不足。損其有餘。乃可復也。卽中府症名曰癥之爲病也。身無痛處。但四肢不收。志亂不甚。其言微知可治。甚則不能言。不可治也。卽中藏症外有六經形症。則以小續命湯加減。及疎風湯治之。小續命亦麻黃桂枝之變。麻桂二湯施於溫熱之症。必致殺人。不可執也。後列。

太陽經無汗惡寒者。麻黃防風。杏仁甘草有汗惡風者。桂枝防風芍藥。甘草。陽明經無汗身熱不惡寒者。白芷石膏知母甘草。有汗身熱不惡風者。葛根桂枝黃芩甘草。如在太陰經則無身涼。乾薑附子。麻黃防風少陰經則有汗無熱。桂枝附子甘草。麻黃杏仁防風。若無此四經之症。或在少陽厥陰柴胡防風。活甘草連翹。如止症真中者。分表裏施治而在裏者。則便溺阻隔。宜三化湯枳實厚朴。羌活大黃。若表裏俱見者。先與解表而後攻裏。若外邪已解。內邪已除。而語言蹇澁半身不遂。未能即愈。以六君子湯加羌防歸地芍藥秦艽久久服之。營衛自和。即古所云大藥是也。再加麻黃。卽一旬之微汗。加大黃。卽一旬之微利。如望春太寒之後。加半夏人參柴胡木通迎而奪少陽之。

氣也。如望夏穀雨之後，加石膏知母黃芩，迎而奪陽明之氣也。  
如季夏濕土主令，加防己白朮茯苓勝脾土之濕也。如望  
暑之後，加厚朴藿香，官桂迎而奪太陰之氣也。望冬霜降，  
加桂附當歸，勝少陰之寒也。

治風之法，不過解表、攻裏、行中道三法盡矣。然風氣不齊，稟賦  
各別，七情異起，六氣殊傷，活法處治不可膠執也。

古人用牛黃丸至寶丹，活命金丹，品類皆辛香走藏，爲斬關奪  
門之將，原爲中藏之閉症設也。牛黃入脾治肉，麝香入腎治骨，  
冰片入肝治筋，此惟邪氣深入者，乃爲出矣。若施之于中府，氣  
虛脫絕之症，反掌殺人如人，既入井而又下石，安得不立斃乎。  
類中之症，其卒倒偏枯，語言蹇濁，痰涎壅盛，皆與真中風相類。

故曰類中但無六經形症爲異耳此惟中氣虛憊故虛風內燭所致東垣主虛誠爲合論河間主火丹溪主痰其言各殊而不知其虛也故無根之火發焉惟其處也故逆上之痰生焉東垣舉基本河間丹溪道其標似異而實同也心火涼膈散肝火柴胡湯水虛火炎六味地黃湯類中之卒倒偏枯症類雖有多種總由真氣不周充血液因而逆流也參芪君之歸地佐之更以秦艽菝葜竹瀕人乳薑汁梨汁最爲穩當

強直拘  
弦煩渴

凡治中風須分陰陽陰中者其色青或黑或白痰喘昏迷眩冒多汗甚者手足厥冷陽中者面赤唇焦牙關緊急上視

強直拘  
弦煩渴

凡人大指次指麻木不仁三年之內必患中風須預防之宜慎起居節飲食遠房障調性情更以十全大補湯加羌活久服

之經歲不輒則潛移默奪弭矣若用古法天麻丸愈風  
丹。開其玄府。漏其真液。適足以招風。取中耳。預防云乎哉。  
口禁。不開足陽明額頰之脈偏急。則口禁不能開。肝風乘目。故  
也。皂角乳香黃芪防風煎湯薰之。須大作湯液如蒸如霧。乃得  
力耳。再以南星冰片爲細末。擦其牙根。或藜蘆鬱金爲末。搐鼻。  
或明礬一兩。飛鹽五錢研勻擦牙。又可將錢許綿裹安牙盡處。  
又法甘草五寸截作五段。麻油浸透火炙。抉口令咬之。約人行  
十里許。又換一截。從此灌藥爲便。

口眼喎邪。耳鼻常悶。故風生焉。口鼻常動。故風搖焉。  
血液衰耗。無以榮筋。故筋脈拘急。口目爲僻。皆急不能卒視。人參  
黃芪當歸白芍升麻秦艽葛根防風鈞藤紅花蘇木水煎和酒

服外用桂枝三兩酒煎濃汁。以故布浸之乘熱左盃揭右右盃揭左再以乳香二兩皂角一兩挫拌勻燒烟薰之。

語言蹇澀經曰足太陰之脈貫舌本散舌下病則舌強又是少陰之正直者係舌本又曰內奪而厥則爲瘡瘍又腎脈之氣不上循喉嚨挾舌本則不能言用地黃飲子地黃巴戟菟絲子桑螵蛸桂枝附子薄荷麥冬五味子茯苓遠志石斛脾土不足痰涎壅盛言蹇澀者六君子湯加南星木香乾葛枳壳遠志升桔扶熱者山梔連芩花粉薄荷

四肢不舉其脈緩大有力者土太過虛平胃五苓散主之其脈細小無力者土不及也補中益氣湯主之隨症加減身體疼痛挾濕熱者當歸拈痛湯羌防升葛知柏草附澤茵陳及苦參入



參二水當歸并湯名拈痛有奇勲。挾寒者。鉄彈丸。乳沒各一兩。  
鳥頭泡去皮。靈脂酒淘淨。加射精荷宜挾虛者。十全大補湯。  
秦艽身重氣虛也。補中八味治之。周身盡痛者。蠲癥湯歸脾湯。  
黃與羌活甘草黃芪薑棗煎。身重之症時師止知燥濕而不知補虛。按素問示從容論篇。歷言肝虛腎虛脾虛皆令人體重  
煩冤是以身重乃虛症也不止于濕可盡耳。

痰涎壅塞星香二陳爲主。蓋治痰以順氣爲先。挾虛者加參芪。  
竹瀝挾寒者桂附。姜汁養正丹。鎮安元氣下墜痰涎實者。星香  
湯送下。虛者大君子湯送下。

遺尿不禁脾虛下陷者。補中益氣湯。加益智。腎虛不能收攝者。  
地黃飲子合參麥散。

善飢多食風木太過凌虛中州脾土受攻求助於食法當瀉肝安脾則復其常矣。青皮芍藥柴胡山楂人參白朮甘草桔梗當隨時審症而爲之變通也。

神氣昏冒痰涎逆衝於上心主被障故昏不知人此係中癥而非中府閉症而非脫症宜牛黃丸清心肺等治之人參麥冬茯神胆星山藥白朮甘草羚羊角犀角雄黃朱砂牛黃冰射金箔大棗打膏加蜜爲丸或金聖保命丹管仲一兩生地七錢大黃五錢青黛板藍根各三錢朱砂雄黃川鬱金薄荷各一錢五分珍珠冰片各一錢五分射一錢煉蜜丸金箔爲衣煎丸宜大君子湯加南星木香菖蒲遠志玉竹瀝薑汁服之又有厥逆昏迷因醉飽過度而得名曰食中莫作中風中氣治之。

外治急救涎潮方。凡男婦卒然中倒，涎濺於心，不省人事。當時即扶入室中，令其正坐，用好醋斤許，燬入炭火中熏之。分其水入口鼻。其涎自歸經。其人漸醒，切不可用薑湯及滴水入。水一入，逆其痰涎，乘繫於心，成痼疾矣。

史國公酒方。治左癱右瘓，四肢預麻，骨節痠痛，一切寒濕風氣，及腎虛是膝無力並冒服之。當歸、羌活、虎脛、骨防風、鱉甲、秦艽、萆薢、牛膝、杜仲、桑寄生各二兩，枸杞一兩，白芷根八兩，無灰酒一斗，絹袋盛藥，入酒浸十日，重湯煮三番，又罇五日，服之。無聞頗  
收效驗

痛加木香筋急加木瓜凡中寒之人先宜與溫木若遽與熱木及近火卽死

中氣七情所傷氣逆痰潮卒然昏仆與中風相類但中風多痰涎脈浮應人迎中氣身冷無痰涎脈沉應氣口以氣藥治風則可風藥治氣則不可急以蘇合丸灌之候甦用八味順氣散白朮茯苓人參甘草青皮陳皮烏藥白芷加香附薄荷或木香調氣散有痰者星香散如其人本虛痰氣上逆關格不通宜養正丹水銀硃砂鉛硫四味等分用鐵器熔鉛入水銀以柳木杵和匀次下硃砂再和匀不見星入硫急研成汁有焰用醋灑之候冷細研糯米糊丸如菉豆大若作中風治之誤矣經曰無故而嗜脈不至者不治自止謂氣逆也氣復自愈當與厥症

互看如因風寒者藿香正氣散白芷茯苓紫蘇腹皮藿香夏枯白朮牛夏陳皮桔梗甘草薑棗煎服

中暑困在暑月其症卒暴面垢冷汗出手足微冷昏暈或吐或瀉或喘或滿以來復丹治之硝石同硫一兩爲末入磁器內搗火熔柳條攬用火不可太旺恐傷藥力再研極細名曰二氣丹加大陰玄精石水飛五靈脂水飛青皮橘紅各二兩先用青皮橘紅靈脂爲末次入玄精及二氣末好醋打糊爲丸如豌豆大每服三十丸或蘇合丸用白朮犀角木香香附檀香沉香朱砂冰糖詞子煨去皮射香丁香薄荷安息用酒熬膏龍腦熏陸香另研蘇合油各一兩右除安息膏蘇合油煉蜜和劑以上共爲末丸如芡子大以蠟固匱用時取出湯調灌之卽甦稍甦再以

香薷扁豆厚朴陳皮煎服此症外陽而內陰故用辛溫取其通  
中熱。僵仆勿與涼水及涼物如寒氣一逼卽死。宜安置於透  
暖處取路上熱土放其臍上作窩令人溺尿於中或用大黃研  
爛同熱土爲湯去渣灌之或將日晒熱瓦熨其人心腹及脊  
勞役動作之人多得之。

中暑靜而逸者得之陰症也頭疼惡寒拘急肢節痛煩心無汗  
無大熱宜大順散乾薑甘艸杏仁厚朴香薷動而得之爲中熱  
陽症也身熱煩躁惡熱大渴多汗無氣以動宜蒼朮白虎湯蒼  
朮石膏知母甘草粳米虛人以補中益氣湯爲主虛人有房勞  
者禁香薷。

中暑忽然不省人事宜炙百會中脘三里脾俞合谷人中陰谷

三陰交斟酌炙或針亦可

胃暑大熱霍亂吐瀉百勞委中合谷曲池三里平宣等尤酌  
左右癱瘓痺厥偏枯半身不遂筋掣痰涎針灸肩頸合谷曲池  
環跳風市足三里絕骨昆仑陽陵泉

中風痰涎壅盛聲如牽鋸服藥不下者宜灸關元丹田二穴多  
灸之爲妙

忽然中風不知人事宜針十宣穴出血卽醒乃十指頭端井穴  
預防中風灸法用風池百會曲池合谷肩頸風市足三里絕骨  
環跳已上等穴炙之大妙

大麻風針法炙法及服藥方法另有專書秘本

○虛勞

病證少采卷之五虛勞

黃帝曰。陽虛生外寒。不知其由然也。岐伯曰。陽受氣於上焦。以溫皮膚分肉之間。寒氣在外則上焦不通。上焦不通則寒氣留於外。故寒慄。

帝曰。陰虛生內熱。奈何。岐伯曰。有所勞倦。形氣衰少。穀氣不盛。上焦不行。下腕不通。胃氣熱。熱氣薰胸中。故內熱。

帝曰。陽盛生外熱。奈何。岐伯曰。上焦不通利。則皮膚緻密。腠理秘塞。玄府不通。衛氣不得泄越。故外熱。

帝曰。陰盛生內寒。奈何。岐伯曰。厥氣上逆。寒氣積于胸中而不瀉。不瀉則溫氣去。寒氣獨畱。則血凝泣澁。泣澁則脈不通。其脈盛大以濶。故中寒。

夫人之生也。陰血爲營。陽氣爲衛。二者運行而無壅滯。病安從

