

聖濟總錄

吳錫璜著

已 4

86245

大德重校聖濟總錄卷第一百六十六

產後門

產後大小便不通

論曰內經謂大腸與膀胱受五藏濁氣名曰傳化之府此不能久留輸寫者也婦人大小腸本挾熱者既產之後血氣暴竭津液內涸燥熱相搏大小腸祕澀不能傳導故大小便俱不通也

治產後大小便不通茯苓丸方

赤茯苓

去黑皮

赤芍藥

當歸

切焙

人參

枳殼

去瓢麩炒

白朮

炒

大麻人

別研如膏各半兩

大黃

剉炒三兩

右八味搗羅七味為末與麻人研勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸煎茅根湯下以利為度

治產後風氣壅結大小便不通赤芍藥丸方

赤芍藥

一兩一分

桂

去粗皮一兩

瞿麥

取穗三分

大黃

剉炒一兩半

檳榔

剉

當歸

切炒

羌活

去蘆頭各二兩

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸米飲下以利為度

治產後因腫滿小腹急脹大小便不通木香丸方

木香

炮一兩

牽牛子

二兩微炒別搗羅為末入

防己

陳橘皮

去白炒各一兩半

檳榔

剉

訶梨勒

炮去核

羚羊角

鎔各一兩

右七味搗羅為末鍊蜜和杵令熟丸如梧桐子大每服二十九丸煎生薑橘皮湯下以利為度

治產後大小便不通榆白皮湯方

榆白皮

剉碎四兩桂皮去粗皮

當歸

切炒

甘草

炙

滑石

略一兩

右五味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓食前溫服以利為度

治產後大小便不通葱膠湯方

葱白

握一握

牛膠

一片廣二寸長四寸

右二味剉碎以水三升和煮消盡去滓頓服

治產後冷熱不調大小便不通木香煮散方

木香

炮為末

青黛

研各二兩

右二味再研令勻每服二錢匕水半盞麻油少許同煎十餘沸和滓溫服之

少頃即通未通再服

治產後藏府壅滯腸胃燥溢大小便秘三脫散方

大腹皮剉

紫蘇莖葉

沉香

木瓜切焙

羌活去蘆頭各一兩

白朮

芎藭

木香

甘草剉

陳橘皮去白焙

檳榔

剉裏眼熟去麩各參分

右一十一味搗為粗散每服三錢匕水一盞煎至六分去滓溫服不拘時

治產後大小便不通腹脹氣急芍藥湯方

赤芍藥

芒消別研

杏人去皮尖雙人熬炒各一兩

大麻人三分研如膏

大黃剉

當歸切炒各二兩

右六味將四味粗搗篩入大麻人同研令勻每服三錢匕水一盞半煎至八

分去滓下芒消末半錢匕溫服以利為度

治產後大小便不通臍下妨悶兼痛石韋湯方

石韋去毛

赤芍藥各一兩

當歸剉炒

赤茯苓去黑皮 瞿麥取穗各一兩半

冬葵子

炒二分 大黃生剉

右七味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服以利為度

治產後關格閉塞大小便不通大黃丸方

大黃二兩 剉炒

芒消一兩 別研

黃芩去黑心

赤芍藥

杏人去皮尖雙

赤茯苓去黑皮

生乾地黄焙各一兩半

右七味搗羅為末鍊蜜和杵丸如梧桐子大每服二十九丸食前煎粟米飲下以利為度

治產後大小便不通六七日腹中有燥屎寒熱煩悶氣短汗出腹滿濡藏湯方

生葛根

五兩切無生者用乾葛二兩

大黃半兩 剉炒

右二味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服以利為度

治產後內熱大小便不通此胡湯方

此胡去苗

黃芩去黑心

陳橘皮湯浸去白切炒

澤瀉

羚羊角鎔各三分

梔子人

赤茯苓去黑皮各一兩

石膏碎

芒消別研各一兩半

右九味粗搗篩八味每服三錢匕水一盞半煎至八分去滓下芒消末半錢

匕更煎一沸溫服

治產後大小便不通梔子人湯方

梔子人

石膏碎

黃芩圖小

澤瀉

此胡去苗

赤芍藥剉

姜薤各一兩半

車前葉切半

右八味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓食前溫服以利為度

治產後胸膈噎塞心下痞堅行滯氣消飲食通大小便木香丸方

木香

二兩

牽牛子

二十四兩炒香別搗取末一十二兩

華澄茄

補骨脂

炒

檳榔

酸栗米飯裏濕紙煨熟去飯各四兩

右五味搗四味為末與牽牛末和勻漸滴井華水和丸如菉豆大每服四十

丸茶湯熟水食後任下

治產後大小便不通臍下疼痛兼腹滿急脹檳榔散方

檳榔

剉半兩

桂

去粗皮

芎藭

獨活

去蘆頭

木香

各半兩

大黃

剉炒

郁李人

去皮尖雙人別研

赤茯苓

去黑皮各一兩

右八味搗羅為散每服二錢匕食前溫水調下以利為度

治產後大小便不通并服瀉藥腹脹氣喘方

鹽

半斤炒令變色

右一味先以漿水一斗半煎沸下鹽末在湯中攪和傾盆中看冷熱通手即

入盆中坐浸腰腹須臾便通湯或漸冷即入新熱湯投之常令稍熱人困即

扶起少頃又浸

治產後大小便秘澁不通飲方

木通剉

冬葵根

剉各三分陳橘皮湯浸去白焙

黃芩去心黑

甘草剉

當歸切焙

蒲黃

微炒

瞿麥穗各半兩

右八味粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服日再

產後乳汁不下

論曰新產水血俱下暴傷津液氣脉未順所以乳汁不下也若能調其衝任治手太陰少陽之經不足則乳脉自然流行若其經虛氣脉閉而不通雖強治之亦無益也

治產後乳無汁石鍾乳湯方

石鍾乳

細研為粉

白石脂

各一分木通

消石

一分

桔梗

炒二兩

右五味剉碎如麻豆大每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服不拘時

治產後乳不流行下妳如聖散方

地膽草

枯樓根

萬莖子

右三味等分搗羅為散每服二錢匕溫葱酒調下日三四服

治產後乳無汁漏蘆湯方

漏蘆去蘆頭

木通各一兩

鍾乳半兩

右三味搗剉如麻豆大每服三錢匕水一盞黍米半合同煎候米熟濾去滓

溫服不拘時

治產後乳汁不下木通湯方

木通

鍾乳各一兩

漏蘆去蘆頭

桔樓根

甘草各一兩

右五味擣剉如麻豆大每服三錢匕水一盞半黍米一撮同煎候米熟去滓

溫服不拘時

治產後乳汁不下桔梗湯方

桔梗一兩炒

漏蘆去蘆頭

鍾乳粉

各半兩 蟬螬三分炙乾

右四味粗擣篩每服三錢匕水一盞煎六分去滓溫服不拘時

治產後乳汁少或不下木通飲方

木通剉一兩半

甘草炙

枳殼

去瓢 熟炒

芍藥

漏蘆去蘆頭

桑根白皮

剉

黃芩

去黑心

淡竹葉

切一握

右八味粗擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治產後乳汁少或不下豬蹄湯方

豬蹄

四隻以水五升煮汁三升澄清

瞿麥

去梗

漏蘆

去蘆頭

木通

剉各一兩

右四味內三味粗搗篩每服三錢七豬蹄汁一盞煎七分去滓溫服不拘時

治產後乳無汁麥門冬散方

麥門冬

去心焙

鍾乳粉

理石

研

土瓜根

各半兩

蟻螬

七枚炙乾

乾棗

七枚去核炒

右六味搗羅為散每服三錢七濃煎木通湯調下不拘時服

治產後因病乳汁少或不下豬蹄湯方

母豬蹄

一俱細切

白油麻

二合洗細

蟻螬

七枚炙乾為末

右三味先將豬蹄用水五碗煮令熟入研了油麻再煮俱熟却入蟻螬末略

煮便傾出細絹濾澄清時煖一盞飲之不拘時

治乳汁不下王瓜酒方

右以王瓜不計多少用酒煮至爛熟飲酒嚼王瓜下其乳脉自通

治產後乳汁不下或汁少鬼箭湯方

鬼箭羽

五兩剉碎

右一味粗搗篩每服二錢七水一盞煎七分去滓溫服不拘時

治產後乳汁不下寄生湯方

桑寄生

三兩握
細剉

右一味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服不拘時

治產後乳汁不下或少栝樓酒方

栝樓

黃大者一
枚剉碎

右一味熟搗令爛用好酒五盞煎取三盞去滓每服一小盞煖服不拘時

治產後乳無汁露蜂房散方

露蜂房

三枚剉
碎略炒

右一味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下不拘時服

治產後乳無汁栝樓散方

栝樓根

五兩切
焙乾

右一味搗羅為散每服二錢匕以白粥飲調下溫酒亦得早晨日午至夜各一

治產後乳無汁魚矢散方

鯉魚頭

五枚剉碎
瓦上燒灰

右一味細研為散每服二錢匕以溫酒調下早晨午時夜臥各一

治產後乳汁少或不下王瓜根湯方

王瓜根

取汁五兩以水五碗同搗絞去滓不用

右一味取汁每服一盞入酒少許同煎七分溫服不拘時

治產後乳汁不下萬莖飲方

萬莖子

淘一合糯米

粳米各半合淘

右二味用甘草半兩煎汁一升研前三味瀝去滓分作三服服之立下

又方

木通

鍾乳

細研為粉

麥門冬

去心焙各半兩

右三味搗羅為散每服二錢匕食後溫酒調下日再

治乳無汁下乳漏蘆散方

漏蘆

三分

栝樓根

王瓜根

各一兩

木通

劉二兩

蟻螬

研三枚

右五味搗研勻每服二錢匕食後溫酒調下日再服

又方

母豬蹄

一隻

木通

三兩

右二味吹咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服并

取此汁作羹亦得

產後妬乳

論曰氣血流行則上為乳汁下為月水上下通達不失常度是謂平人宜通而塞則為痛熱氣復乘之則為腫向之流行者壅遏矣倘失調治則結鞭成核身體壯熱甚則憎風遂為乳癰世傳氣結乳開亦為妬乳者此也

治產後乳汁不泄結滯腫痛連翹湯方

連翹味開

射干

杏仁湯去皮尖
雙入炒

大黃剉炒

茈胡去苗

甘草炙剉

升麻

防己

芍藥

芒消研各
一兩

右一十味粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服不拘時

治產後妬乳汁不泄結成癰腫玄參湯方

玄參

芍藥

連翹去梗

防己

射干

升麻剉

芒消

白斂

大黃剉炒各
一兩

杏仁去皮尖雙入
炒四十枚

甘草炙三分

右一十一味粗搗篩每服三錢匕水一盞半煎一盞去滓溫服不拘時

治產後妬乳汁不通疎腫痛漏蘆散方

漏蘆去蘆頭

地錦

蔓荊實去皮

黃耆剉

當歸焙切

威靈仙去土各一兩

右六味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下不拘時服

治產後乳汁不泄結成癰腫熱痛升麻湯方

升麻

玄參

芍藥

生乾地黄焙

連翹

瞿麥

取穗各一兩

射干半兩

甘草

炙一分

右八味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓不拘時溫服

治產後妬乳塗傅方

野葛

芍藥

薤白

當歸

木通

各半兩

附子

用此一分春月不

右六味各細剉如豆大用醋浸半日後同煎沸即先煎猪脂八分一椀令烟

出次入亂髮一分洗去垢煎令消次入松脂一兩半蠟半兩再煎沸綿布濾

去滓瓷合盛冷則以故帛傅乳上乾則易之

治產後妬乳乳汁不泄蘊結成癰連翹湯方

連翹

大黃

畧炒各半兩

黃耆

剉一兩

犀角屑

芍藥

木通細剉

升麻

黃芩去黑心各三分 竹葉一握切

芒消半兩

右一十味粗搗篩每服三錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服不拘時

治產後妬乳壅結疼痛牡丹皮散方

牡丹皮

威靈仙洗焙

黃耆剉

桂去粗皮

大黃酒蒸切焙

當歸切焙各一兩

右六味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下不拘時服日三

治產後妬乳鹿角散方

鹿角半一兩

故靴頭二枚

右二味燒灰研細每服二錢匕煎當歸酒溫調下不拘時服

治產後妬乳欲成癰鐵粉散方

鐵粉研

細辛去苗葉

芎藭

人參

防風去

乾薑炮

黃芩去黑心

桂去粗皮

芍藥

肉苁蓉酒浸切焙各一兩

當歸切焙

甘草炙各二兩

右一十二味搗羅為散每服三錢匕酒調下日四五服或膿血敗壞自出為效

治產後妬乳或癰雞屎散方

羅尿炒藥一兩 麝香半錢細研

右二味為細散每服一錢匕煎荊芥酒溫調下不拘時服

治產後乳汁不泄結滯不消熱腫二灰散方

蔓荊實燒存性 皂莢刺燒存性各一兩

右二味合研為散每服二錢匕溫酒調下不拘時

治產後妬乳結腫不消熱痛傳乳方

升麻 木香 檀香各半兩

右三味各取成塊者逐味就沙盆內用酒少許帶濕磨三味相等即用鷺羽

刷傳乳上如乾以水潤之常令濕潤一日兩次傳之

治產後妬乳結滯成癰腫發熱疼痛槲皮湯洗方

槲皮三升細切

右一味以水一斗煮取七升通手便洗不拘時頻煖洗之

治產後妬乳成癰腫或已破膿血未散天麻草洗方

天麻草五兩細切

右一味以水一斗煮取七升去滓通手洗之不拘時頻煖洗

產後乳結核

論曰產後乳結核者以氣血虛弱風邪搏之乳脉凝滯故結而為核日久不差
蘊積生熱熱勝則腫甚則成癰也

治產後乳結核或成癰腫發熱疼痛枳殼湯方

枳殼

去瓢
麸炒

芍藥

人參

黃耆

剉

木通

剉

當歸

焙切

桂皮

粗

蒺藜子

炒去
角

雞骨

醋
炙

大黃

剉炒各
一兩

右一十味粗擣篩每服二錢七水一盞煎七分去滓溫服不拘時

治產後乳結核堅鞭疼痛當歸散方

當歸

焙切

芍藥

黃耆

剉

蒺藜子

炒去
角

雞骨

炙

附子

炮裂去
皮臍

枳實

去瓢
麸炒各二兩

桂皮

粗

人參

薏苡人

各一
兩

右一十味搗羅為散每服三錢七酒調服日三

治產後乳結核或堅鞭疼痛莽草散方

莽草葉

一兩

紫葛

大黃

各半
兩

赤小豆

二兩

右四味搗為末用醋調如糊傅結核上頻易之每易則先以熱葱湯洗

治產後乳腫熱痛外傳膏方

黃連

去須三分

大黃

生

鼠糞

炒各半兩

右三味搗羅為末用米糊調傅乳四邊頻易之每易先用熱葱湯洗

治產後乳結核及初結作癰服此麥門冬湯方

麥門冬

去心焙

黃芩

去黑心

黃耆

剉

芍藥

剉

赤茯苓

去黑皮

甘草

剉

木通

剉各兩

桑寄生

剉

防風

去義

人參

各三兩

右一十味吹咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半入棗二枚擘煎取一盞去

滓入沙糖一棗大令銷溫服不拘時候乳漸消滅即服後方天門冬丸

治產後乳結核天門冬丸方

天門冬

去心焙半兩

木通

剉

黃耆

剉

防風

去義

生乾地黄

焙

桑寄生

剉

人參

各一兩

羌活

去蘆頭

大黃

一兩

白芷

剉

升麻

各三分

澤蘭

去枝

茯神

去木

天雄

炮裂去

皮臍

黃芩

去黑心

枳實

去穢炒

五味子

各半兩

右一十七味搗羅為末鍊蜜為丸梧桐子大每服二十九加至三十九溫酒下日三

治產後乳結核疼痛或腫欲成癰外消膏方

伏龍肝

半兩

大黃

剉半兩

生薑

一分洗切研細