

普濟本事方

治胸膈悶塞作噎薰膈圓

麥門冬 水泄 去心

甘艸 炙各 半兩

人參 去 芳

桂心 不見 炙

細辛 去 葉

川椒 去目并合口 炒 地上出

遠志 去心 炒

附子 炮去 皮臍

乾薑 炮各 二錢

石細末煉蜜圓如雞頭大綿裹一圓含化食後日夜

三服

○膀胱疝氣小腸精漏

治膀胱疝氣外腎種脹痛不可忍念珠圓

乳香 乳鉢座水 盆中研

硃砂 各三 錢飛

黃蠟 兩

右乳香研細硃砂同研勻鎔蠟和圓分作一百單八

為雞頭作梧子

夏

腫

上有治諸症作痛

硝砂圓

香湯吞下頃年有人貨疝氣藥肩上海人我二字以
為招白日貨數千有一國醫多金得之用之良驗

木香

沉香

巴豆肉

全者各
一兩

銅青

半兩
研

青皮

二兩不
去白

硝砂

一分
研

右上一香青皮三味細剉同巴豆漫火炒令紫色為
度去巴豆為末入青硝二味研勻蒸餅和圓如梧子
大每服七圓至十圓鹽湯吞下日二三服空心食前服
治膀胱腫硬牽引疼痛及治小腸氣陰囊腫毛間水出

本草方

卷三

膀胱疝氣小腸精漏

十六

服鈴下荀子

灌

金鈴圓

金鈴子

肉五兩

茴香

炒

馬蘭花

炒

鬼絲子

酒浸曝乾用
帶糸子同服

海蛤

破故紙

炒香

海帶

淨洗各
三兩

木香

丁香

各一兩

右細末糊圓如梧子大每服二三十圓溫酒鹽湯下

空心食前

治小便難小腸脹不急治殺久

用葱白三斤細剉炒令熱以帕子裹分作兩處更替

慰臍下即通

按帕非單印香帕紅線絲類宜容之香粉
正宜通

治膀胱氣痛茴香散

荆三稜

各一兩二味炮熟剉

甘艸

半兩炙

右細末每服二錢熱酒調下強幼安云每發痛甚連日只下二服立定

頃在微城日欽尉宋荀甫膀胱氣作疼不可忍醫者以

剛劑與之疼愈甚小便不通三日矣臍下虛脹心悶

予因候之見其面赤黑脉洪大予曰投熱藥太過陰

陽痞塞氣不得通為之奈何宋尉尚手持四神丹數

粒云醫者謂痛不止更服之予曰若服此定斃後無

悔渠懇求治予適有五苓散一兩許分三服易其名

用連鬚葱一莖茴香一撮鹽一錢水一盞半煎七分
 令接續三服中夜下小便如墨汁者一二升臍下寬
 得睡翌日診之脉已平矣續用硃砂圓與之數日差
 太抵此疾因虛得之不可以虛而驟補藥經云邪之
 所湊其氣必虛留而不去其病則實故必先滌所蓄
 之邪然後補之是以諸方多借巴豆氣者謂此也

治遺精夢漏關鎖不固金鎖丹 亦名茴香圓

舶上茴香 炒

胡蘆巴

破故紙 炒

香

白龍骨

已上各一兩

木香

一兩半

胡桃肉

三七個研

羊石子

三對破開鹽半兩
 焙炙熱研如泥

羊石子外腎也

如梧子大每服三五十圓空心溫酒下

治經絡熱夢漏心忪恍惚膈熱清心圓

好黃蘗皮一兩爲細末用生腦子一錢同研勻煉蜜
圓梧子大每服十圓至十五圓濃煎麥門冬湯下大
智禪師方夢遺不可全作虛冷亦有經絡熱而得之
猪苓圓

右用半夏一兩破如豆大用末猪苓四兩先將一半
炒半夏黃色不令焦地上出火毒半日取半夏爲末
糊圓如梧子大候乾更用前猪苓末二兩炒微裂同

用不泄沙餅養之空心溫酒鹽湯下三四十圓常服
於申未間冷酒下此藥治夢遺夢遺有數種下元虛
憊精不禁者宜服茴香圓年壯氣盛久節淫慾經絡
壅滯者宜服清心圓有情慾動中經所謂所願不得
名曰白淫宜良方茯苓散正如餅中煎湯氣盛盈溢
者如餅中湯沸而溢慾動心邪者如餅之傾側而出
虛憊不禁者如餅中有罅而漏不可一槩用藥也又
有一說經曰腎氣閉即精泄素問云腎者作強之官
伎巧出焉又曰腎氣藏精蓋腎能攝精氣以生育人
倫者也或歛或散皆主於腎今也腎氣閉則一身之

爲此設此古方也。今盛行於時而人多莫測其用藥之意。蓋半夏有利性而猪苓導水蓋導腎氣使通之意也。予藥囊中嘗貯此藥。緩急以與人三五服皆隨手而驗。林監丞庶民亦數服而愈。

良方茯苓散

堅白茯苓不以多少爲細末。每服五錢。溫水調下。空心食前臨臥時服。一日四五服。

普濟本事方卷第三 終

不作丁香下同

○順氣木香散治氣不升降嘔逆惡心胸膈痞滿腸助

脹悶及酒食所傷噫氣吞酸心脾刺痛太便不調面

黃肌瘦不思飲食兼療婦人血氣刺痛及一切冷氣

繞臍撮痛今

良薑去芦炒

乾姜炮

茴香炒

陳皮支百

縮砂

肉桂去麋皮不見火

丁皮不見火

桔梗去芦炒

厚朴去麋皮姜製

蒼朮米泔浸

甘草炙各等分

去乾姜一皮厚朴加香附子青皮白和氣散

右細末每服二錢水一盞生姜三片棗二枚同煎八
分稍熱服不拘時候或入鹽少許沸湯點服常服寬
中和胃

○反胃嘔吐霍亂

治翻胃附子散

附子一枚極大者剉於磚上四面著火漸漸逼熱淬入生姜自然汁中再用火逼再淬約盡姜汁半碗焙乾末之每服二錢水一盞粟米少許同煎七分不過三服

鯽魚散

大鯽魚一箇去腸留膽納綠礬末填滿縫口以炭火

儀鸞
叔微述

灸令黃乾為末每服一錢陳米飲調下日三服

定嘔吐利膈枇杷葉散

枇杷葉 去毛

人參 去芦各一分

茯苓 去皮半兩

茅根 二分

半夏 三分湯浸七次

右細剉每服四錢水一盞半生姜七片漫火煎至七

分去滓入栝榔末半錢和勻服之廳老方

食後多吐欲作翻胃白朮散

澤瀉

白朮

茯苓 去皮各等分

右為細末每服一錢湯調溫服

治胃熱嘔吐竹茹湯

右麋末每服五錢水二盞生姜三片竹茹一彈大棗一箇同煎至一盞去滓溫服

胃熱者手足心熱政和中一宗人病傷寒得汗身涼數

日忽嘔吐藥與飲食俱不下醫者皆進丁香藿香滑

石等藥下嚙即吐予曰此正汗後餘熱留胃脘孫兆

竹茹湯政相當爾亟治藥與之即時愈良方槐花散

亦相類

治熱吐槐花散

皂角去皮燒

白礬熬

令沸定三字

本草
卷四
及胃嘔吐霍亂

槐花 炒黃 黑色

茸艸 灸

右四味等分爲末每服二錢白湯調下喜與李使君
曾病嘔每食訖輒吐如此兩月服反胃藥愈甚或謂
有痰飲投半夏旋覆之類亦皆不驗暮下藥判官授
此方服之即差又有一老青衣久病嘔與服之又差
大凡吐多是膈熱熱且生涎此藥能化胃膈熱涎特
有殊效

治霍亂吐瀉不止及轉筋諸藥不效者一粒治一人青
金丹

硫黃 研 兩

水銀 錢 八

冷醋類類洒候如鐵色法如青金塊方成刮下再研
如粉留少半為散餘以糝子尖三箇醋約半盞研稀
稠得所成膏和圓如鷄頭大朱為衣每服一圓煎下
香湯磨化下熱服如服散子下香湯調下一錢傷寒
陰陽乘伏用龍腦冷水磨下日二三服

治嘔吐不止香靈圓

丁子

好辰砂

研飛各六錢

五靈脂

揀如鼠屎者淘去沙石日下四錢

右香脂先細末後入砂再研勻狗膽或猪膽為圓如
雞頭大每服一圓生姜橘皮湯磨下