

外

少伊手錄

武林趙學敏串雅外編

完

串雅外編卷四

錢塘趙學敏恕軒纂

醫外

醫禽

鶴脛折斷 雀脛至脆易折若犯此者用

青竹比脛畧大截長三四寸手劈兩片地上掘白
頸蚯蚓數条舂泥土鋪青竹管內用線紮定仍用
数条啖之俟飯頃即如舊此萬金不傳之方

鶴病 飼蛇鼠及大麦煮喂之

南禽發風 如鸚鵡八哥白鵪鶉鸚鵡
不食尾尖上有一肉珠如豆大以鍼挑破之即立

愈

金雀

凡新補到金雀必欲以水洗其足令十分乾淨却
以舌于其頂上順舔數十舔然後置籠中如此水
不死此妙法也

鵠病

古牆中螺蛳朽壳并續隨子白果搗丸每飼十丸

愈

鴿性嗜豆菜豆性冷多食則病受烟火之氣則病
不見陽光即病不浴即病不得砂石即病熱病作
喘冷病下希熱治以鹽冷治以甘草

孔雀病

飼以鐵水即愈如盛夏患眼病以鷺翎筒管灌清
油少許清水洗之眼不開擘只啖小魚蝦及切菖
少許啖之貴涼冷勿與鹹醋食

鸚鵡生最畏寒冷則發顫如瘡而殂飼以餘甘則可

畫眉病

畫眉春蒼正在分對之時若入籠一年可矣即明
春照前分對之皆食不能食叫不能叫名發氣籠
內取出尾上驗擠出白水過數日叫口如初仍然
搥打

凡鳥喉啞用銅末一撮或古錢或訶子任用一件
水浸之飯其水愈

鷄子病

鷄子有病而不知何病

蜂蜜奶子油及鮮熟肉或小雞肉尤妙三樣和勻
食之即愈鷄子或在手腕或在棲木屢次氣喘憂
悶食少鮮肉後出糞黑臭因腹內有臭液或食惡
肉或食野艸之故宜用毛齒菟畧搗並奶子油羊
肉和為食之又方蘿卜汁煎三分太二止留一分
最甘者飲之間一日將此鵠給鷄子食之即愈而
憂悶反毛豎起者此方治之
凡試鷄子有病否先以將鷄子于豆下以肉高懸
引飛上食者無病否則有病或以銅末鉄末拌肉

與食如吃則五臟不佳又宰羊羔肺帶熱與食之
食肺而安必無恙食之不寧難化第二日有憂悶
狀則有病一出糞不間斷不攔在架上平安嘴抹
內翅自下而上其翅如擦油光潤大腿均平翅內
二脈平和以上皆無病之徵或因外熱而口開舌
顫喘氣或因內熱而目閉腳爪二伸一縮毛豎起
或因勞倦而口閉翅下垂鼻中呼氣一切皆有病
之徵若出糞綠色在架拳曲不起者乃死之預徵
也

了哥病 春月羽毛上生蟲多蛀死

吳茱萸煎湯放令浴之蛀蟲則死

黃頭病 黃頭有拔肚毛者

蛇殼焙燥研細拌粉內食之即愈

雞一切病

真麻油灌之

雞瘦

土硫黃研末拌食則肥

雞瘟

磨鉄漿染米食愈

雞水眼

白礬傳之

雞孝

芒硝一小塊灌之愈

鵲病

白膜蔽目者名水眼不治則瞎須常看

之若有此病飼以蚯蚓引即愈後又飼以蜘蛛蒼蠅

土蚕等物敗其毒而闢亦多狠

雞瘟

巴豆一粒搗碎香油調灌入口即愈
又方

菜豆粉水和成条喂数次愈



醫外

醫獸

馬症

熱虫噪黑汁鼻有膿啞喘水料不進

黃瓜姜根

貝母

吉梗

小青

吳藍

靛花

梔子仁

大黃

白蘚皮

黃芩

鬱金

各二兩

馬牙硝

黃柏

各四兩

研末

驗患

相當

及常要啞重

者藥三兩地黃半斤豆豉二合蔓青油四合合齊

煎藥啞之至晚飼大效虫噪重者用葶藶子合炒

合紫色搗如泥桑白皮一大握大棗去核

二升煮取一升入葶藶末調勻適寒溫而灌之間
日再灌重者不過三次若出嚏為鼻沫出梁腫出
起者不治

虫噪十年者醬清如胆汁者半合分兩服灌鼻內
每灌一二日將息不得連灌即損為也

急黃黑汗右割取上斷訖取舊靴頭皮水浸汁灌
之如不效用大黃當歸各一兩鹽半盞以水三盞
煎取半盞分兩服灌之如再不效針破為尾尖出

血即效

起卧胞轉及腸結用

細辛

防風

芍藥

各一兩

鹽一盞

水五盞

煎取半盞

分二服

灌後

灌前

用芒硝

兩

鬱金

寒水石

大青

各一兩

水五盞

煎半

以酒

油

各半盞攪勻

分二服

灌口

中妙

胞轉欲死

小兒尿

和水

灌之

立瘥

搗蒜

內小便

內小便

孔中深五寸亦可

類骨脹

羊蹄根

四十九

个燒灰

熨骨上

冷換之

冷換之

冷換之

冷換之

如無羊蹄根楊枝指大者炙熨之

後跨冷豉 葱姜各五兩水五盞煮取半和酒灌之

效

治馬蛆蹄槽下立處掘一尺方埋雞子許大圓石
子令立石上一二日愈

騎馬走上板用木于腹來公刮擦以手內後孔令
探糞出即愈探法剪公指甲以油塗手恐傷破馬
腸

治疥 黃豆炒焦用生麻油搗爛敷之先以醋泔
水洗净

又方 先以皂莢水或米泔水洗淨次用糯根末
和麻油塗令中間少空放虫不得多塗恐瘡大
又方 巴豆膩粉研細末麻油塗定日洗塗數日

妙

目暈

用霜後乳穀麩皮研末以一日兩度吹眼

中

治哮喘毛焦

大麻子揀淨一升飼之效

諸瘡

昆沙夜合花葉黃丹乳姜楨榔五倍子為

末先用鹽醬水洗後以麻油加輕粉敷

疥癩 杜蘅生搗搽或末敷亦可

又方 生胡麻汁灌之

又方 藜藿末水塗之妙

鼻內癩病 蕎麥粉灌仍以麥稈飼之

傷水 先燒人髮熏兩鼻後用川烏白芷胡椒

牙皂角等加麝少許研末以竹筒盛葯一字吹入

鼻中須臾打喷嚏清水出即放加瓜蒂煎治一切中

結病症

馬瘦 狗肉汁灌之