

醫巫伯松監生

外科證治全書卷四

環峯許克昌倫聲

同輯

巫伯松處方

木末畢

法蒼霖

發無定處證

疔瘡

楊梅瘡

結毒

遺毒

癰風

石疽

流注

癰發

惡核

癭瘤

疣

瘰癧

癰疽

痘毒

痘風瘡

痘癰

丹瘤

赤火瘡

天泡瘡

貓眼瘡

魚脊瘡

漆瘡

凍瘡

血風瘡

癰

疥瘡

瘡癰

傲冬瘡

癰

癰

瘡癰

葡萄疫

赤白遊風

癰疹

癰瘍風

紫白癰風

白疔

血箭

血瘰

五竅出血

血汗

痛風

小兒胎風

痒風

### 疔瘡

疔瘡者言其瘡形如丁蓋之狀也古方論疔有十種華元化論疔有五色千金方說疔有十三種以至外臺祕要治法神巧而其論相同然無非毒氣客于經絡及五臟內蘊熱毒初起或如小瘡或如水泡紫黃青黑無定色



痒痛麻木亦無定候多生于頭面肩臂手足等處令人  
煩燥悶亂或憎寒頭痛或嘔吐惡心或肢體拘急治宜  
鍼刺擠出惡血見好血而止取拔疔散絛入以膏掩之  
其有瘡頭陷拗而鍼刺不痛無血者則鍼瘡四旁必令  
血出藥從鍼孔絛入內服奪命丹或奪命湯汗之夫疔  
毒險證也其害最速生頭面耳鼻之間顯而易見生臂  
足衣遮之處隱而難明知覺早者朝醫夕愈遲者枉死  
甚多每每婦女而患暗疔者初時誤作傷寒至毒陷發  
腫神昏牙緊遂成走黃多致不救黃卽毒也疔毒內走  
攻心如在將昏之際亟用回疔散二錢白湯送服或以

奪命丹五丸爲末，葱汁調灌之。少頃大痛，痛則毒化，黃水痛止，病愈。

一手小臂足小骸生有紅絲如絲一條，延走者名紅絲疔。走至心腹或至喉內者，難救治，宜在紅絲始末兩端用鍼刺破出血，以洩其毒。亦以膏貼之，服藥如前。此疔皆因大喜大怒，氣血逆行所致，急刺出血後用浮萍草根敷之，立愈。

謹案醫宗金鑑作紅絲疔，不作紅綫，遵改。

一疔瘡用鍼刺出毒血，後服拔疔散。

治紅絲疔尤效。

紫花地丁

甘菊花

各一兩

水煎服二劑，而疔毒散三劑全愈。若

已潰爛亦用此方，但加當歸。

二兩

服之立愈。

一刀鑱疔形闊如韭葉長有寸餘肉色紫黑忌行鍼刺  
用生礬三錢 蔥白七根 共搗爛作七塊另以蔥湯逐  
塊送下蓋破取汗再飲蔥湯催之汁出爲度外取爛  
雞矢塗患上卽愈遲治走黃致命

一人患疔須臾半面腫不知疔患何處用蔥白七根 蜜

一兩 同搗敷之神效

### 奪命丹

乾蟾酥酒化 輕粉

麝香各五分 枯礬

寒水石煨 銅綠

製乳香

製沒藥各一錢

礞砂三錢

蝟牛二十一箇連殼研爲膏如無卽不用

右各研爲細末取蝸牛蟾酥研勻入諸藥杵丸綠豆大  
每服三丸用蔥白五寸搗爛安手心內裹丸于中另  
煎葱湯送下蓋被取汗如無汗約人行五里許再進  
一服多飲蔥湯催之汗出爲度

奪命湯

銀花

草河車

赤芍

各二錢

蟬蛻

僵蠶

防風

羌活

獨活

青皮

澤蘭

各一錢五分

黃連

甘草

各一錢

右水煎熱服暖臥取汗

回疔散



土蜂窩有子者一兩蛇蛻一條

右用泥裹火煨存性爲末研和聽用

拔疔散

硫黃

蟾酥等分

右爲細末蔥汁和蜜搗丸小米大宜帶長以便插入疔

瘡內

楊梅瘡

一名廣瘡因其毒出嶺南一名時瘡以時氣乖變邪氣湊襲之故一名翻花瘡因其纏綿不已形如棉花一名翻花楊梅因窠粒破爛肉反突于外色如黃蠟一名天泡



瘡因其夾溼而生白泡有形如赤豆嵌于肉內堅鞭如  
鐵名楊梅痘有形如風豆作痒名楊梅疹有先起紅暈  
後發斑點名楊梅斑有色紅作痒其圈大小不一二三  
相套名楊梅圈名形雖異要不出氣化精化二因氣化  
傳染者輕精化慾染者重氣化者或遇生此瘡之人鼻  
聞其臭或誤食其物或登圃受其不潔之氣脾肺受毒  
故先從上部見之皮膚作痒筋骨或疼或不疼瘡形小  
而且乾此不過在皮毛肌肉之間每日用換肌消毒散  
去木瓜加荆芥防風蟬衣汗之或更以龍膽瀉肝湯接  
服清去溼熱自當全愈精化者由交媾不潔精洩時毒

赤芍

連翹

各一錢

薄荷

一錢五分

生甘草

五分

右水煎食後服

辰砂定痛散

辰砂

五分

石膏

一兩

胡黃連

五錢

冰片

二分

右共研極細末生地汁調搽鼻中或麻油調亦可

鼻齩瘡

多生小兒鼻翅兩旁色紫斑爛膿汁浸淫痒而不痛乃肺

經風熱內服澤瀉散外搽青蛤散即愈

澤瀉散

澤瀉

鬱金

生山梔仁

生甘草

各一錢

外科諸治全書 卷二 五  
右水煎或爲末開水調服

青蛤散

蛤粉

石膏

各一兩

黃檗

生末

輕粉

各五錢

青黛

三錢

右共研細末先用香油調成塊次加涼水調稀塗瘡上

鼻淵

鼻流濁涕經年累月不止當別寒熱涕臭屬熱膽移熱于腦風寒伏鬱所致用奇授藿香丸涕清不臭覺腥者屬虛寒用八味地黃丸加川芎升麻蒼耳子所以用腎藥者腦屬腎也又有虛暈腦痛不出水者卽控腦砂有蟲

食腦中用天蘿散外以桃葉作枕枕之自愈

奇授藿香丸

藿香連枝葉

八兩

右研細末雄雞膽汁和丸如桐子大每服五錢食後蒼耳子湯下或清酒送下

天蘿散

絲瓜藤

近根處者  
燒存性

右爲末每服三錢食後清酒送下

八味地黃丸

通用  
四五五

鼻衄



陰虛火動氣逆于肝血隨鼻出不甚不足慮甚而久者與  
吐血無異治宜涼血行血用黃芩白芨各二兩水丸服  
之神效如不甚只用外治一用水紙搭鼻衝責其火在  
胃也一用涼水拊後頸責其火在膀胱也一用綫紮中  
指左衄紫左右衄紫右左右皆衄左右皆紫責其火在  
心胞絡也皆治鼻衄捷法

鼽鼻

鼻竅常塞不聞香臭用鐵鎖在石上磨取末豬脂調綿裹  
塞鼻內又方用乾薑爲末蜜調塞鼻

鼻毛癰

鼻毛一晝夜忽長一二尺漸粗圓如繩摘去更生痛不可  
忍因食豬羊血過多所致用硃砂乳香飯丸早晚水下  
十粒自落



耳部證治

銳毒

膿耳

停耳

聾耳

耳痔

耳菌

耳挺

耳疔

內傷耳痛

耳鳴

暴聾

旋耳瘡

耳衄

百蟲入耳

筋脈

耳中

腎氣通耳耳中病責在腎

手太陽小腸足少陽膽手少陽三焦脈

俱入耳中

耳前足陽明胃脈上耳前筋結耳前足少陽膽脈手少陽

三焦脈俱走耳前三焦脈從耳前屬目



耳後手太陽小腸筋足太陽膀胱筋俱走耳後完骨足陽  
明胃脈之支足少陽膽脈手少陽三焦脈俱過耳後

銳毒 一名耳後毒

發在耳後宜別陰陽治之患色白者案陰疽例治患色紅  
者案陽癰例治如發耳垂後名耳根毒辨治亦然

膿耳 停耳 聾耳

耳孔內時出膿曰膿耳赤腫潰爛流膿曰停耳膿溼結塊  
塞耳暴聾曰聾耳皆內火攻沖鬱聚不散歸芍地黃湯  
熟地易生地  
白芍易赤芍加山梔仁柴胡主之甚者用龍膽瀉肝湯  
加柴胡外俱用紅棉散