

景岳全書卷三十三貫集

雜證謨

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯 超 謙菴訂

疝氣

經義

骨空論曰任脉爲病男子內結七疝女子帶下瘕聚○督脉生病從少腹上衝心而痛不得前後爲衝疝

長刺節論曰病在少腹腹痛不得大小便病名曰疝得之寒刺

少腹兩股間刺腰髀骨間刺而多之盡炅病已

經脉篇曰足厥陰肝病丈夫癩疝婦人少腹腫○肝所生病爲

癩泄狐疝○足厥陰之別循臑上舉結於莖其氣逆則臑腫

卒疝實則挺長虛則暴癢取之所別也

繆刺論曰邪客於足厥陰之絡令人卒疝暴痛刺足大指爪甲

上與肉交者各一痛左取右右取左

脉解篇曰厥陰所謂癩疝婦人少腹腫也○陰亦盛而脉脹不

通故曰癩癰疝也

陰陽別論曰三陽爲病發寒熱其傳爲癩疝

經筋篇曰足陽明之筋病癩疝腹筋急○足太陰之筋病陰器
紐痛下引臍兩脇痛○足厥陰之筋病陰器不用傷於內則
不起傷於寒則陰縮入傷於熱則縱挺不收

邪氣臟腑病形篇曰小腸病者小腹痛腰脊控舉而痛時窘之
後

四時氣篇曰小腹控舉引腰脊上衝心邪在小腸者連舉系屬
于脊貫肝肺絡心系氣盛則厥逆上衝腸胃燠肝散于育結
于臍

玉機真藏論曰是故風者百病之長也弗治脾傳之腎病名曰

疝瘕少腹寬熱而痛出白一名曰蠱

本藏篇曰腎下則腰尻痛不可以俛仰爲狐疝

平人氣象論曰寸口脉沉而弱曰寒熱及疝瘕少腹痛○脉急曰疝瘕少腹痛

脉要精微論曰診得心脉而急病名心疝少腹當有形也

邪氣臟腑病形篇曰心脉微滑爲心疝引臍小腹鳴○肝脉滑甚爲癘疝○脾脉微大爲疝氣滑甚爲癘瘕瀉甚爲腸癘微瀉爲內癘多下膿血○腎脉滑甚爲癘瘕

大奇論曰腎脉大急沉肝脉大急沉皆爲疝○心脉搏滑急爲

心疝○肺脉沉搏爲肺疝○三陽急爲瘕三陰急爲疝

五臟生成論曰青脉之至也長而左右彈有積氣在心下支肤名曰肝痺得之寒與疝同法○黃脉之至也大而虛有積氣在腹中有厥氣名曰厥疝女子同法

四時刺逆從論曰厥陰滑則病狐疝風○少陰滑則病肺風疝○太陰滑則病脾風疝○陽明滑則病心風疝○太陽滑則病腎風疝○少陽滑則病肝風疝

至真要大論曰陽明司天丈夫癩疝婦人少腹腫○陽明之勝外發癩疝○太陽在泉民病少腹控挈引腰脊上衝心痛○

太陽之復少腹控辜引腰脊上衝心○太陰在泉主勝甚則
爲疝

論證 共三條

疝氣病者凡小復舉丸爲腫爲痛止作無時者皆是也但疝證
不一如內經所謂狐疝者以其出入不常也有言癰疝者以
其頑腫不仁也有衝疝者以其自少復上腫而痛也有厥疝
者以結氣在陰而氣逆爲疝也有疝瘦者以少腹冤熱而痛
出自一名曰蠱也有六經風疝者如四時刺逆從論所言者
是也有小腸疝者如邪氣臟腑病形篇所言者是也凡此七

者總皆疝之爲義狀疝之爲病不獨男子有之而婦人亦有之經曰有積氣在腹中有厥氣名曰厥疝女子同法又曰厥陰所謂癰疝婦人少腹腫也至若衝疝瘕之屬亦皆男婦之所同病者狀惟辜丸之病獨在男子而他則均當詳察也觀張子和曰夫遺溺閉瘕陰痿疝痺精滑白淫皆男子之病也若血涸不月月罷腰膝上熱足蹇噤乾瘕閉少腹有塊或定或移前陰突出後陰痔核皆女子之病也但女子不謂七疝而謂之瘕若年少而得之不計男子婦人皆無子此說誠非謬也然今人但言男子之疝而全不知婦人之疝殊失之矣

一疝氣所屬本非一經如內經所云在脉爲病男子內結七疝
女子帶下瘕聚督脉生病從少腹上衝心而痛不得前後爲
衝疝又曰脾傳之腎病名曰疝瘕又曰三陽爲病發寒熱其
傳爲癰疝又曰邪在小腸者連臑係屬於脊又曰邪客於足
厥陰之絡令人卒疝暴痛又如心肝脾肺腎五疝之脉各有
所辨此素問言諸經之疝也又經筋等篇言足陽明之筋病
癰疝腹筋急足太陰之筋病陰器紐痛下引臍兩脇痛足厥
陰之筋病陰器不用等義此靈樞言諸經之疝也自張子和
云疝有七前人論者其多其非靈樞素問銅人之言予皆不

取乃引靈樞之論曰足厥陰之筋聚於陰器故陽明與太陰之筋皆會於陰器惟厥陰主筋故爲疝者必本之厥陰此子和之意以疝爲筋病而筋主於肝故謂疝必厥陰似亦有理而實則不狀觀內經諸論之如前者謂非靈素之言而子和皆可不取乎且筋雖主於厥陰然散見諸經卽爲諸經之筋矣若病在諸經固可因筋而廢經乎矧如厥論曰前陰者宗筋之所聚太陰陽明之合也又痿論曰陰陽總宗筋之會會於氣街而陽明爲之長此亦可以不取乎狀則小腹前陰之經則厥陰少陰太陰陽明少陽太陽以至衝任督脉皆有所

涉今考銅人經治疝之法則諸經皆有俞穴若謂止屬厥陰則諸皆可廢矣卽子和亦歷指諸經之穴謂諸穴雖亦治疝然終非受疝之地此何說也自後丹溪遂因子和之言謂經有七疝寒水筋血氣狐癩也專主肝經與腎經絕無相干再至戴原禮又因丹溪之說云疝本屬厥陰之一經余嘗見俗說小腸膀胱下部氣者皆妄言也嗚呼此等義論皆後學逞億之見果堪信乎果堪法乎醫失真傳類多如此故非靈素銅人之言余誠不敢取也今錄銅人治疝穴法條列後章以便後人用證

一疝氣之病有寒證亦有熱證然必因先受寒濕或犯生冷以致邪聚陰分此其肇端之始則未有不因寒濕而致然者及其病鬱既久則鬱而成熱者有之或以陽臟之入火因邪聚而濕熱相資者亦有之故在內經言疝則寒熱皆有所論如曰病在少腹腹痛不得大小便病名曰疝得之寒曰陰亦盛而脉脹不通故曰癰癰疝也曰肝脾得之寒濕與疝同法曰太陽太陰陽明之勝復皆有疝氣是皆言疝之寒也又如曰脾風傳腎名曰疝瘦少腹冤熱而痛出白一名曰蠱曰足厥陰之筋病陰器不用傷於寒則陰縮入傷於熱則縱挺不收

是皆言疝之熱也此內經之言寒言熱未嘗偏廢者如此觀
丹溪曰自素問而下皆以爲寒蓋寒主收引經絡得寒則引
而不行所以作痛者然亦有踢水涉水終身不病此者無熱
在內故也大抵此證始於濕熱在經鬱而至久又得寒氣外
來不得疎散所以作痛若只作寒論恐未爲備此丹溪之論
如此故其治多從火而借用山梔黃栢之屬余則不能無言
也觀內經之言疝者如前原非只作寒論第言寒者較多於
熱亦自疝家之正理不可易也矧疝以寒邪入經所以爲痛
及其久也方爲鬱熱使其始不受寒何由致疝此寒爲本而

熱爲標也若謂始於濕熱在經又得邪氣外來所以作痛則
反以熱爲本而寒爲標矣豈其然乎至若踢水涉水終身不
痛者此雖有貴賤之分久暫之異朕必以陽氣內實而寒不
能犯者有之若謂無熱在內故寒自不入又豈其朕乎此致
病之因有不得不辨也是以內經之論凡至切至當者胡可
弗遵後世之談其多鑿多偏者安庸盡信再若治此之法固
不可必其爲寒又不可必其爲熱但治初受之邪必當以溫
經散寒行氣除濕爲主切不可早用寒涼致留邪氣則遺害
非淺及其久也則有始終以寒者有因寒鬱熱者有元陽受

傷而虛陷日甚者但當察其形氣病氣因病制方若果有熱證熱脉顯然外見者方可治以寒涼如無熱證可據而執云太抵痲由濕熱則無者生之有者甚之矣此習俗之通弊有不可不鑒也

論治 共十一條

凡治痲之法當察所由此雖以受寒受濕因而成痲然或以色慾或以勞損或以鬱怒或以飲食酒濕之後不知戒慎致受寒邪則以陰求陰流結於衝任血氣之海而下歸陰分遂成諸痲故其爲病則有遇寒而發者有鬱久成熱遇熱而發者

有鬱則氣逆遇鬱怒而發者有濕因寒滯遇濕而發者有疲極則傷筋遇勞苦而發者有虛邪在少陰厥陰遇色慾而發者有飲食之濕在陽明太陰遇酒酪而發者至其久也則正氣陷而不舉邪氣留而不去而爲癩爲水難於愈矣故治此者必當因其所因辨而治之則無不隨手可愈若茫然混然徒執一偏之見而至老不寤者卽與之談終無益也

一治疝必先治氣故病名亦曰疝氣非無謂也蓋寒有寒氣熱有熱氣濕有濕氣逆有逆氣氣在陽分則有氣中之氣氣在陰分則有血中之氣凡氣實者必須破氣氣虛者必須補氣

故治疝者必於諸證之中俱當兼用氣藥

一疝之暴痛或痛甚者必以氣逆宜先用荔香散○氣實多滯者宜寶鑑川棟散或天台烏藥散○非有實邪而寒勝者宜煖肝煎主之

一寒疝最能作痛多因觸胃寒邪或犯生冷所致凡喜煖畏寒脉弦細鼻尖手足多冷大小便無熱之類皆是也○寒微者

宜荔香散煖肝煎腎氣丸神應散丁香棟實丸之類主之○寒甚者宜醫林四神丸百一選方十補丸胡蘆巴丸沉香桂

附丸之類主之○一法以五積散加鹽炒吳茱萸小茴香各

一錢薑五片葱白五寸同煎空心熱服大治氣痛不可忍

一熱疝大能作痛凡火邪聚於陰分而爲痛者必有熱證熱脉或大便秘結或小水熱閉不通或爲脹爲滿而煩熱喜冷者是也宜大分清飲或茵陳飲加茴香川棟子之類或以加味通心飲葵子湯之類主之○又有腎本不虛而肝經濕熱火旺莖中作痛筋急縮或痛或痒或腫或挺縱不收白物如精隨溺而下者此筋疝也宜龍胆瀉肝湯主之

一濕疝多爲重墜脹滿狀亦有痛者宜以前寒熱證參而治之○有不痛而久墜不愈者是卽癰疝之屬單宜治濕理氣以