

證

因

脉

治

三



症因脉治目錄

瘧疾總論

外感瘧疾

寒瘧

風瘧內經名

陽明瘧瘧

溫瘧

即暑瘧

肺熱瘧瘧

腎經瘧

風發瘧

瘧瘧

內傷瘧疾

牡瘧

瘧母

食瘧

即胃瘧

三瘧

游瘧

附諸賢論

痢疾論

外感痢疾

寒濕

濕熱

燥熱

疫痢

有外感無內傷

內傷痢疾

七情傷

勞役

飲食

外感休息痢

內傷休息痢

霍亂論

外感霍亂

溫氣

風氣

熱氣

寒氣

內傷霍亂

痰飲

食氣

外感霍亂轉筋

內傷霍亂轉筋

外感霍亂煩渴

內傷霍亂煩渴

附乾霍亂即絞腸痧

附諸賢霍亂論

附諸賢轉筋論

附諸賢轉筋論

腹痛論  
外感腹痛

風寒  
暑濕  
燥火  
疝脹

附陽癰腹痛

小便不利論  
外感小便不利

運氣  
傷寒  
陰寒

內傷小便不利

熱結  
偏滲  
元氣虛

真陰虛  
真陽虛

大便結論

外感大便結

傷寒  
溫熱

內傷大便結

精熱  
氣秘  
血枯

內傷腹痛

熱積  
寒積

痰積  
酒積

血滯  
血虛

氣虛

食積

蟲積

氣凝



症因脉治

瘧疾總論

秦子曰瘧疾者先寒後熱發作有定期大約已午未三時者多  
若一日一作太陽少陽也間日而作陽明少陽也伸欠惡寒頭  
痛太陽也發熱口渴陽明也有寒有熱嘔而口苦少陽也日中  
三陽得令其病即發日夕三陽時令退而病解不比寒熱往來  
時寒時熱一日二三次發亦不比暑熱之症熱無停止按內經  
但有巨陽陽明二經而不及少陽然有寒有熱乃是少陽所主



余故補註少陽之脉少陽之治也以上三陽經瘧易愈若三日一發名曰三陰經瘧難愈今分別外感八條內傷三條又三瘧三條遊瘧一條

外感瘧疾

寒瘧 風瘧 陽明瘧 濕瘧  
肺熱瘧 瘧 腎瘧 風發瘧 瘧瘧

寒瘧

寒瘧之症內經云先寒後熱腰背頭項痛脊膂強呵欠呻吟始則寒極而戰動終則大熱而汗解發在午前者此太陽經瘧若目痛鼻乾寒慄鼓頷畧寒即熱發在午後者此陽明經瘧以上



二條乃內經寒邪傷營名寒瘧之症

寒瘧之因夏傷暑熱之氣入于皮膚之內腸胃之外營氣所舍之處又值早晚寒冷之邪外束暑熱至日中陽旺之時發泄不出後感寒邪近表是以先寒先感暑熱在裏是以後熱此先寒後熱之瘧作矣

寒瘧之脉浮大而緊太陽之邪長大洪寔陽明之瘧弦大之脉少陽之診

寒瘧之治在太陽者桂枝羌活湯在陽明者桂枝葛根湯在少

陽者桂枝柴胡湯三經俱見症者三方互用

桂枝羌活湯

治寒傷太陽寒多熱少無汗寒瘧

桂枝 羌活

防風

甘草

吐者加半夏曲

夏秋

口渴

引飲加石膏

桂枝葛根湯

治寒傷陽明寒多熱少有汗之瘧

葛根 白芍

桂枝

生姜

甘草

無汗加防風

頭痛

加羌活

夏秋口渴消水加石膏

桂枝柴胡湯

治寒傷太陽少陽寒多熱少之瘧



桂枝 柴胡

栝按前三方因寒傷之瘧寒多熱少故皆用桂枝原文云夏秋熱令必加石羔可見熱多寒少脉數口渴者切不可誤用矣

風傷衛瘧 內經亦名溫瘧

風瘧之症內經云風傷衛氣先熱後寒此言先後者言多少也言熱多寒少之瘧是以不曰惡寒而曰惡風自汗煩躁伸欠也不惡寒則寒少也發熱直至煩躁熱多也若頭痛背痛發于午

前者太陽也目痛鼻乾發于午後者陽明也發于寅卯者少陽也

風瘧之因內經云暑邪既伏秋氣收之汗出遇風與衛氣并居陰陽分爭內外相搏而風瘧作矣

風瘧之脉左脉浮緩太陽瘧也右脉洪長陽明瘧也左右皆弦少陽瘧也

風瘧之治瘧在太陽有汗桂枝石羔湯在陽明白芷石羔湯在少陽小柴胡湯三陽俱見症者準繩和餅湯



桂枝石羔湯 桂枝 知母 石羔 黃芩

無汗加防風 身痛加羌活柴胡

白芷石羔湯 治陽明經溫瘧

白芷 石羔 知母 家祕以升麻葛根易白芷惡寒加桂

枝無汗加防風柴胡身痛加羌活獨活

小柴胡湯 柴胡 黃芩 廣皮 甘草 人參

準繩和餅湯 治三陽經寒熱之瘧

柴胡 升麻 葛根 羌活 知母 石羔 黃芩 猪苓



山甲 甘草 廣皮 防風

此方用表藥五味升散表邪使鬱熱外發而惡寒自己用寒藥三味以清裏使裏得清而發熱自己用猪苓分別陰陽穿山甲以通經絡廣皮甘草二味助胃氣升降諸藥真良方也  
槓按前二方因熱多寒少之溫瘧故以知母石羔黃芩互用若寒多則涼藥不可用矣其後和解湯乃和解三陽之瘧也仲景治傷寒熱病表症多者用辛溫表散裏熱多者用寒涼清裏若表裏俱見症者用一半散表一半清裏以雙解之若疫凝食滯

者兼用化瘦消滯之藥可見治傷寒如是治瘧疾外感症皆如是也

陽明瘧瘧 內經名瘧 仲景名溫瘧

瘧瘧之症但熱不寒少氣煩冤手足熱而欲嘔吐面赤口渴雖熱已而六脉仍數大者內經曰熱傷陽明瘧瘧之症仲景發明內經陽明瘧瘧則曰身熱無寒骨節疼痛煩冤時嘔更其曰名曰溫瘧是也

瘧瘧之因夏秋暑熱之令熱氣傷人內經云陰氣先絕陽氣獨



發此暑熱傷于陽經陽獨用事毫無陰寒故名曰痺熱瘧也  
痺瘧之脉六脉弦數少陽有熱若見洪長陽明有邪若見沉數  
裏有熱結

痺瘧之治仲景以脉平者用白虎加桂枝湯治太陽陽明家秘  
用桂枝黃芩湯兼治少陽陽明準繩于風邪瘧中補出三陽和  
解湯余于痺瘧中亦立三陽和解法

白虎加桂枝湯 治但熱無寒骨節疼痛時嘔之瘧疾

知母 甘草 石膏 粳米 桂枝

桂枝黃芩湯 柴胡 黃芩 人參 甘草 半夏 知母

桂枝 廣皮 南方熱令多用羌活以易桂枝

按此二方以但熱故用知母石羔以骨節煩疼不得不用桂枝

和營衛通其表裏此治陽明經之瘧又借太陽經之桂枝以治

骨節煩疼以桂枝與石羔同用則桂枝籍石羔之涼不碍裏熱

石羔籍桂枝之辛溫亦不碍表寒矣

溼瘧 即暑瘧

濕瘧挾熱之症身體重痛肢節煩疼嘔逆脹滿胸膈不舒此濕



熱瘧之症也

濕熱瘧之因內經云因得秋氣汗出遇風及得之以浴水氣舍于皮膚之內與衛氣并居衛氣者晝日行于陽夜則行于陰此氣得陽而外出得陰而內薄內外相搏則瘧日作

濕熱瘧之脉若見浮緊表有寒濕若見浮緩乃是風濕若見弦數濕而兼熱

濕熱瘧之治內經有其論仲景無其方楨意身體重痛肢節煩疼脉浮緊者羌活敗毒散右脉弦長嘔逆胸滿者柴葛平胃散

六脉洪數濕熱者加味香茹飲調益元散

羌活敗毒散 治濕瘧表邪多者

羌活 獨活 柴胡 前胡 川芎 吉梗 只壳

甘草

柴葛平胃散 治濕瘧胸次不舒者

蒼朮 厚朴 廣皮 甘草 柴胡 干葛 頭痛身痛加

羌活無汗加防風

加味香茹飲 治暑濕之瘧



香菇 厚朴 川連 扁豆 甘草

肺熱痺瘧

肺熱痺瘧之症發則陽氣盛而不衰故但熱而不寒令人消燦  
脫肉此內經肺素有熱之痺瘧症也

肺熱痺瘧之因內經云肺素有熱熱盛于身因有所用力腠理  
開泄風寒舍于皮膚之內分肉之間邪盛于陽不涉于陰則但  
熱不寒而肺熱痺瘧之症作矣

肺熱痺瘧之脉寸口洪而數洪則主陽數則主熱陽熱為患火

