


經史證類大觀本草



經史證類大全本草卷之十二

木部上品


桂 花




桂



賓州桂



宜州桂



桂味甘辛大熱有小毒主溫中利肝肺氣心腹寒熱冷
疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止唾欬嗽鼻艱能墮
胎堅骨節通血脉理踈不足宣導百藥無所畏久服神
仙不老生桂陽二月八月十月採皮陰乾

得人參麥門冬甘草大黃黃芩

調中益氣得茈胡紫石英乾地黄療吐逆

陶隱居

云按本經惟有

菌牡二桂而桂用體大同小異今俗用便有二種心半卷多脂者
單名桂入藥最多所用悉與前說相應仙經乃並有三桂常服食
以慈涕合和雲母蒸化為水者正是此種爾今出廣州者好相州
始興桂陽縣即是小桂亦有而不如廣州者交州桂州者形段小
多脂肉赤好經云桂葉如柏葉澤黑皮黃心赤齊武帝時相州送
樹以植芳林苑中今東山有桂皮氣粗相類而葉垂異亦能凌冬
忍或是牡桂時人多呼丹桂正謂皮赤爾北方今重此每食輒須
之蓋禮所云薑桂以為芬芳

唐本注

云菌桂葉似柿葉中有縱文

三道表裏無毛而光澤牡桂葉長尺許陶云小桂或言其葉小者
陶引經云似柏葉驗之殊不相類不知此言從何所出今按桂有
二種惟皮稍不同若菌桂老皮堅板無肉全不堪用其小枝薄卷
及二三重者或名菌桂或名筒桂其牡桂嫩枝皮名為肉桂亦云
桂枝其老者名木桂亦名大桂得人參等良本是菌桂剝出單桂
條陶為深誤也

今按陳藏器本草云菌桂牡桂桂心已上三色並
同是一物按桂林桂嶺因桂為名今之所生不離此郡從嶺以南

際海盡有桂樹惟柳象州最多味既辛烈皮又厚堅土人所採厚者必嫩薄者必老以老薄者為一色以厚嫩者為一色嫩既辛香兼又筒卷者必老必味淡自然板薄者即壯桂也以老大而名焉筒卷者即菌桂也以嫩而易卷古方有筒桂字似菌字後人誤書之習而成俗至於書傳亦復因循桂心即是削除皮上甲錯取其近裏辛而有味臣禹錫等謹按蜀本注云按此有三種菌桂葉似柿葉壯桂葉似枇杷葉此乃云葉如柏葉蘇以桂葉無似柏葉者乃云陶為深誤剩出此條今據陶注云菌桂正圓如竹三重者良壯桂皮薄色黃少脂肉氣如木蘭味亦辛此桂則是半卷多脂者此云仙經有二桂以苾第合和雲母蒸化為水服之此則有三種明矣陶又云齊武帝時湘州得樹以植芳林苑中陶隱居雖是梁武帝時人實生自宋孝武建元三年歷齊為諸王侍讀故得見此樹而言也蘇恭但只知有二種亦不能細尋事跡而云陶為深誤何臆斷之甚也抱朴子云桂可以竹瀝合餌之亦可以龜腦和服之藥性論云桂心君亦名紫桂殺草木毒忌生苾第味苦辛無毒主治九種心痛殺三蟲主破血通利月閉治輭脚痺不仁治胞衣不下除欬逆結氣擁痺止腹內冷氣痛不可忍主下痢治鼻息肉

華子

云桂心治一切風氣補五勞七傷通九竅利關節益精明目

暖腰膝破疔癖癥瘕消瘀血治風痺骨節攣縮續筋骨生肌肉

圖經曰

菌桂生交趾山谷壯桂生南海山谷桂生桂陽舊經載此三種之異性味功用亦別而爾雅但言浸木桂一種

郭璞云南人呼桂厚皮者為木桂蘇恭以謂壯桂即木桂及單名桂者是也今嶺表所出則有筒桂肉桂桂心官桂板桂之名而醫

家用之罕有分別者舊說菌桂正圓如竹有二三重者則今所謂筒桂也筒菌字近或傳寫之誤耳或云即肉桂也牡桂皮薄色黃少脂肉氣如木蘭味亦相類削去皮名桂心今所謂官桂疑是此也桂是半卷多脂者今所謂板桂疑是此也今觀賓宜韶欽諸州所圖上者種類亦各不同然皆題曰桂無復別名參考舊注謂菌桂葉似柿葉中有三道文肌理緊薄如竹大枝小枝皮俱是筒與今賓州所出者相類牡桂葉狹於菌桂而長數倍其嫩枝皮半卷多紫與今宜州韶州者相類彼土人謂其皮為木蘭皮肉為桂心此又有黃紫兩色益可驗也桂葉如柏葉而澤黑皮黃心赤今欽州所出者葉密而細亦恐是其類但不作柏葉形為疑耳皮厚者名木桂即板桂是也蘇恭以牡桂與單名桂為一物亦未可據其木俱高三四丈多生深山蠻洞中人家園圃亦有種者移植於嶺北則氣味殊少辛辣固不堪入藥也三月生花全類茱萸九月結實今人多以裝綴花果作筵具其葉甚香可用作飲香尤佳二月八月採皮九月採花並陰乾不可近火中品又有天竺桂云生西胡國功用似桂不過過烈今亦稀有故但附於此張仲景治傷寒用桂枝湯甲乙經治陰受病發痺內熨方用醇酒二十斗蜀椒一斗乾薑一斗桂一斗凡四物咬咀著清酒中綿絮一斤細白布四丈皆并內酒中置馬矢煨中善封塗勿使泄氣五日五夜出布綿絮暴乾復侵之以盡其汁每漬必辟其日乃出布綿乾之并用滓與絮複布為巾其布長五七尺為六七巾即用之生桑炭炙巾以熨寒痺所刺之處令熱入至於病所寒復炙巾以熨之三十徧而止汗出炙巾以拭身亦三十徧而止起步內無見風每刺必熨如此病已矣此所謂內熨也又治臂筋急亦以白酒和桂塗之續傳信

方造桂漿法夏月飲之解煩渴益氣消痰桂末一大兩白蜜一升以水二斗先煎取一斗待冷入新瓷瓶中後下二物攪二三三百轉令勻先以油單一重覆上加紙七重以繩封之每日去紙一重七日開之藥成氣香味美格韻絕高今人亦多作故并著其法

雷公云

凡使勿薄者要紫色厚者去上麤皮取心中味辛者使每斤大厚紫桂只取得五兩取有味厚麤生用如

未用即用重密熟絹并紙裏勿令犯風其州土只有桂草元無桂心用桂草煮丹陽木皮遂成桂心凡使即單擣用之

惠方

治風頭痛每欲天陰雨風先發者用桂心又方治九種

悶用桂心半兩為末以酒調如膏用傳頂上并額角又方治寒疝心痛四肢逆冷全

盞煎至半盞去滓稍熱服立効又方治產後惡血衝心痛氣悶欲絕用桂

壽羅為散不計時候又方治三兩擣羅為散狗膽汁和丸如櫻

熱酒調下一錢也又方治小兒睡中遺尿不自覺桂末雄

桃大不計時候用外臺祕要雞肝等分擣丸服如小豆大溫水

熱酒磨下二九千金方治中風面目相引偏僻牙車急舌不可轉桂心以

下日千金方酒煮取汁故布蘸搗病上正即止左喝搗右右喝搗

分二肘後方

治卒心痛桂心八兩咬咀又方治心腹俱脹痛

服分二肘後方水四升煮取一升分三服又方短氣欲死或已

絕桂一兩切以水一升二合煮取又方治中風四肢逆冷吐清

八合去滓頓服無桂用乾薑亦得又方水宛轉啼呼者取二兩



吸咀以水三升煮取二升去滓適寒溫盡服
又方 治反腰有血痛擣桂節三升葛

氏方 治卒吐血桂屑方寸匕晝夜含二十
許服亦療下血大神驗千金方同
又方 治產後腹中

酒服方寸匕日三服
三子母秘錄同
孫真人食忌 治中風失音方桂一尺以
水三升煎取一升服取汁
又方

治唾血取桂心擣作
梅師方 絕或吐白沫身軀冷急煎桂汁服
未以水下方寸匕

之多飲冷水一二升忽食
飲吐漿煎濃豉汁服之
又方 治卒外腎偏腫疼痛方桂
心末和水調方寸匕塗之
又

方 治產後血澁不禁止餘血瀰痛兼塊桂
心乾薑等分爲末空心酒調服方寸匕
斗門方 治中風失

一兩去其麤皮近人身體懷之至兩時辰許爲末分爲
三服每服用水二盞煎取一盞服之差大妙聖惠方同
姚和衆

方 治小兒臍腫取桂心炙
令熱熨之日可四五度
抱朴子云 桂可以合葱涕蒸作水
亦可以竹瀝合餌之亦

可以龜腦和而服之七年能步行水上長生不死又云
趙他子服桂二十年足下毛生日行三百里力舉千斤

牡桂味辛溫無毒主上氣欬逆結氣喉痺吐吸心痛脅

風脅痛溫筋通脉止煩出汗利關節補中益氣久服通

神輕身不老生南海山谷
陶隱居云南海郡即是廣州
今俗用牡桂狀似桂而扁廣



殊薄皮色黃脂肉甚少氣如木蘭味亦類桂不知當是別樹為復猶是桂生有老宿者爾亦所未究唐本注云爾雅云侵偃木桂古方亦用木桂或云牡桂即今木桂及單名桂者是也此桂花子與蘭桂同惟葉倍長大小枝皮俱名牡桂然大枝皮肉理麤虛如木肉少味薄不及小桂皮肉多半卷中必皺起味辛美一名肉桂一名桂枝一名桂心出融州桂州交州甚良臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉狹長於蘭桂葉一二倍其嫩枝皮半卷多紫肉中皺起肌理虛軟謂之桂枝又名肉桂削去上皮名曰桂心藥中以此為善其厚皮者名曰木桂二月八月採皮日乾之爾雅疏云侵一名木桂郭云今南人呼桂厚皮者為木桂桂樹葉似枇杷而大白華而不著子叢生巖嶺枝葉冬夏常青間無雜木本草謂之牡桂是也藥性論云牡桂君味甘辛能去冷風疼痛

圖經

文具桂條下

經驗後方

治大人小兒喫雜果子多腹脹氣急方取肉桂碾末飯丸如桑豆大小兒熱水下五丸大人下十九

未痊再服

菌桂味辛溫無毒主百病養精神和顏色為諸藥先聘

通使久服輕身不老面生光華媚好常如童子生交趾

桂林山谷巖崖間無骨正圓如竹立秋採

陶隱居云交趾屬交州桂林屬



廣州而蜀都賦云菌桂臨崖俗中不見正圓如竹者惟嫩枝破卷成圓猶依桂用非真菌桂也仙經乃有用菌桂云三重者良則明非今桂矣必當別是一物應更研訪唐本注云菌者竹名古方用筒桂者是故云三重者良其筒桂亦有二三重卷者葉似柿葉中三道文肌理緊薄如竹大枝小枝皮俱是菌然大枝皮不能重卷味極淡薄不入藥用今惟出韶州臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似柿葉而尖狹光浮花白葉黃四月開五月結實樹皮青黃薄卷若筒亦名筒桂厚硬味薄者名板桂又不入藥用三月七月採皮

乾日

圖經

文具桂條下

列仙傳

范蠡好食桂飲水討藥人卅卅見之又曰桂父象林人常服桂皮葉以龜腦和服之

韓終采

藥詩


閭河之桂實大如栗得而食之後天而老

別說云

謹按諸家所說桂之異同幾不可用考今交廣商人

所販及醫家見用唯陳藏器一說最近然筒厚實氣味重者宜入治藏及下焦藥輕薄者宜入治頭目發散藥故本經以菌桂養精神以牡桂利關節仲景傷寒論發汗用桂枝桂枝者枝條非身幹也取其輕薄而能發散今又有一種柳桂乃桂之嫩小枝條也亦宜入治上焦藥用也

松脂



松脂味苦甘溫無毒主疽惡瘡頭瘍白禿疥癢風氣安
 五藏除熱胃中伏熱咽乾消渴及風痺死肌鍊之令白
 其赤者主惡痺久服輕身不老延年一名松膏一名松
 肪生太山山谷六月採

松實味苦溫無毒主風痺寒氣虛羸少氣補不足九月

採陰乾

松葉味苦溫主風濕瘡生毛髮安五藏守中不飢延年

臣禹錫等謹按日

華子云松葉無毒

松節溫主百節久風風虛脚痺疼痛

松根白皮主辟穀不飢

陶隱居云採鍊松脂法並在服食方中以桑灰汁或酒煮軟按內寒水中

數十過白滑則可用其有自流出者乃勝於鑿樹及煮用膏也其實不可多得惟葉正是斷穀所宜細切如粟以水及麴飲服之亦有陰乾擣為屑丸服者人患惡病服此無不差比來苦脚弱人釀松節酒亦皆愈松柏皆有脂潤又凌冬不凋理為佳物但人多輕忽近易之爾
唐本注云松花名松黃拂取似蒲黃正爾酒服身輕療病云勝皮葉及脂其子味甚甘經直云味苦非也松取枝燒其上下承取汁名諸偕諸主牛馬瘡疥為佳樹皮綠衣名文納合和諸香燒之其煙團聚青白可愛也
臣禹錫等謹按藥性論松脂使味甘平殺蟲用之主耳聾牙有^中孔少許咬之不落蟲自死能治諸瘡膿血煎膏生肌止痛抽風^黃云又有五葉者一叢五葉如釵名五粒松道家服食絕粒子如巴豆新羅往往進之
日華子云松脂潤心肺下氣除邪煎膏治癰爛排膿又云松葉暖無毒炙治



東蒼風濕瘡佳又云松節無毒治脚顫骨節風又云松根白皮味苦溫無毒補五勞益氣

圖經曰

松脂生泰山山谷今處處有之其用以通明如薰陸香

鍊治其法用大釜加水置甑用白茅藉甑底又加黃砂於茅上厚寸許可矣然後布松脂於上炊以桑薪湯減即添熱水常令滿候

松脂盡入釜中乃出之投於冷水既凝又蒸如此三過其白如玉然後入藥亦可單服其實及根白皮古亦有服食法但今松實多

作果品餘不聞堪入藥其花上黃粉名松黃山人及時拂取作湯點之甚佳但不堪停久故鮮用寄遠燒其枝上下承取汁液名松

脂諸主牛馬瘡皮上綠衣名文納香用合諸香燒之其煙不散方書言松為五粒字當讀為鬣音之誤也言每五鬣為一葉或有

兩鬣七鬣者松歲久則實繁中原雖有然不及塞上者佳好也中品有墨條不載所出州郡然亦出於松故附見於此

聖惠方

絕穀昇仙不食法取松實擣為膏酒調下三錢日三則不飢渴飲水勿食他物百日身輕日行五百里

又方

服松葉令人不老身生綠毛輕身益氣久服不已絕穀不飢渴松葉不以多少細切更研每日食前以酒調下二錢

亦可粥汁服之初服稍難久自便矣

又方

治牙斷歷蠹齒根暗黑用松節燒灰指之神効

松脂末填瘡孔令滿日三四度用之

又方

神仙餌松實用七月取松實過時即落難收去木皮擣如膏每服如雞子大日

三服如服及百日身輕三百日日行五百里絕穀外臺祕要集



療齩齒取松脂銳如錐注齩孔內
又方 治惡風疾松脂煉投冷
須臾齩虫綠松脂出梅師方同

兩飢即服之日二鼻斷離
又方 療歷節諸風百節酸痛不可忍
者二百日差斷鹽及房室

十偏亦可二十徧用以煉酥三升溫
和松脂三升熟攪令極稠旦
空腹以酒服方寸匕日三數食麴粥為佳惡血腥生冷酢物果子

一百日差
又方 松節酒主歷節風四肢疼痛如解落松脂二
千金 日差 十斤酒五斗漬三七日服一合日五六服

方 治脚氣十二風痺不能行服更生散數劑及眾療不得力服
此一劑更能行遠不過兩劑松葉酒松葉六十斤細剉以

以水四石煮取四斗九升以釀五斗米如常法別煮松葉汁以
漬米并饋飯泥釀封頭七日發澄飲之取醉得此酒力者甚眾

方 治歷節風松葉搗取一升以酒
又方 治口喝青松葉一升
三升浸七日服一合日三服 擣令汁出清酒一升

浸二宿近火一宿初服半
又方 治三年中風不效者松葉一斤
升漸至一升頭面汗即止 細切之以酒一斗煮取三升頓

服取汗
千金翼 治蟲食齒根齒黑者以松木灰
出立差 措之末雄黃塗斷上百日神効 梅師方 治耳久

三兩煉巴豆一兩相和熟擣可丸通過
孫尚藥 治脚轉筋疼痛
以薄綿裹內耳孔中塞之日一度易

兩細剉如米粒乳香一錢右件藥用銀石器內慢火炒令焦只留
一分性出火毒研細每服一錢至二錢熱木瓜酒調下應是筋病

皆治
兵部手集 療刺入肉疼悶百理不差方松脂流出如細乳
之 頭香者傳瘡上以帛裹三五日當有根出不痛

不痒不鬼遺方治疥癬松膠香研細約酌入少輕粉衮令勻凡

覺自落度傷寒類要治天行病辟瘟方切松葉如米酒服方寸匕日三辟五年瘟

抱朴子趙瞿患

不差家乃齋糧棄送於山穴中瞿自怨不幸悲歎涕泣經月有仙人經穴見之哀之具問其詳瞿知其異人也叩頭自陳乞命於是

仙人取囊中藥賜之教其服百餘日瘡愈顏色悅肌膚潤仙人復過示之瞿謝活命之恩乞遺其方仙人曰此是松脂彼中極多汝

可煉服之長服身轉輕力百倍登危涉險終日不困年百歲齒不墮髮不白夜卧常見有光明如鏡列仙傳好食

松實能飛行健走及馬以松子野人閑話伏虎尊師篇煉松脂遺堯堯不能服松者楠松也法十斤松脂五度以

水煮過令苦味盡取得後每一斤煉了松脂入四兩茯苓末每晨水下一刀圭即終年不食而復延齡身輕清爽

