

陳脩園二十八種



新增西書七

種



南京中醫藥大學圖書館版權所有

咽喉脈證通論

太乙神鍼

白喉治法抉微

救迷良方

急救喉痧要法

福幼編

喉痧正的



校刊咽喉脉證通論序

或曰宋有異僧者寓杭之千佛寺去時遺一囊寺僧啟之得是書秘不欲傳今尚有能世其術者余曰唯唯否
否夫方技之書類多托於畸人異士隱僻恠誕者流神其說以炫人耳目是書苟宋時人所作也不應有棉花
瘡云云此疾元時始入中國何先數百年已能言之鑿鑿如此邪第綜其方論凡夫喉證之虛實緩急辨析造
微多所依據則知非近人所能苟非宋亦不出元明間一巨手耳余先後得四丘寫本改竄塗乙各不相同因
即數本中排比參校窮數月之力如理亂絲不啻數棼之而數析之也今春手錄定本不敢自秘爰授之手民
以永厥傳簡首仍署曰宋僧原本亦疑意爾夫豈敢神其說以炫人耳目哉是為序

武進伯雄氏書

醫家十三科咽喉居其一誠以氣之出入生死之關事醫者不可不審求也內經曰喉主天氣咽主地氣欬論篇曰心欬之狀欬則心痛喉中介介如梗狀甚則咽腫喉痺厥論篇曰手陽明少陽厥逆發喉痺噤腫瘰癧解篇曰厥陰所謂甚則噤乾熱中者陰陽相薄而熱故噤乾骨空論篇曰督脉生病治督脉治在骨上甚者齊下營其上氣有音者治其喉中央在缺盆中者其病上衝喉者治其漸漸者上俠頤也謬刺論篇曰邪客於手少陽之絡令人喉痺邪客於足少陰之絡令人噤痛不可肉食又曰噤中腫不能內唾時不能唾考內經所言喉證者凡謂臟腑之氣痺著於其地而已無所謂十八證三十六證也惟靈樞癰疽篇岐伯曰癰發於噤中名曰猛疽猛疽不治化為膿膿不寫塞喉半日死則類喉科之乳蛾而屬之癰疽仲景去先聖未遠其金匱玉函所載雜病並無喉證正與內經相合李東垣劉河間為金源巨手所著諸書亦不載是證獨朱丹溪有喉痺一門第以臟腑為主分經施治則亦內經之支也孟河費君伯雄得喉科書一冊於其鄉之世業是醫者題為宋異僧所遺以其篇第攷之即所謂十八證也先總論病態而繼以藥後詳方證復列以藥禁忌且以甘桔湯為喉證所忌一掃俗醫誤執成方之謬是能獨具手目者以其喉證為火毒上升用藥降氣瀉火為主即靈樞猛疽之意也其以病起何經用何藥主治即內經丹溪之法也夫善讀軒岐書者固可隔垣洞見何待檢閱之煩然則此書之作蓋為俗醫設也且為無醫設也俗醫與無醫則此書之功偉矣伯雄因舊刻之訛重勘而精梓之因括其大凡於左

光緒十年三月之望上海劉至喜書於春星草堂

咽喉脉證通論目錄

總論

通治用藥

用藥禁忌

丸散方藥

牛黃解毒丸

紅內消散

保命丹錠子

膽冰消毒散

冰硼散

玉屑散

鎖喉第一

加減荊防敗毒散
加減柴胡雙解散

重舌第二

氣癰第三

乳蛾第四

弄舌第五

纏喉第六

啞瘡第七



骨槽第八 加減當歸連翹散

懸填第九 加減千金內托散

爛喉癰第十 犀角貝母膏
百寶丹

熱風喉癰第十一 涼血地
黃湯

弱證喉癰第十二

喉閉第十三 四順理中湯
四逆湯

噎食第十四 當歸連翹散
川桂散

發頤第十五 南星膏

懸癰第十六

喉菌第十七

牙癰第十八



總論

夫喉者吾生氣機出入之門戶瞬息存亡之際性命係焉偶一受病危在頃刻迫不及待所貴醫者能識受病之原與夫虛實痰火風寒熱毒之異更於望聞問中參究脈理尤為先務之急自來業喉科者全不講脈所以治之鮮效今試論之假如其脈洪大而實其人氣粗而躁此有餘之證用藥則以散風下氣清火消痰散之者荊芥防風羌活紫蘇是也下之者枳殼枳實青皮厚朴山查前胡是也清之者山梔黃芩黃柏甚則犀角黃連消痰則以膽星樓仁杏仁為主若脈洪大而浮軟無力或絃緩而澀其人氣委而靜此不足之證用藥則以涼血生血滋潤消痰涼之者丹皮白芍是也生之者生地當歸是也潤之者以仁知母花粉是也消痰則以貝母樓仁杏仁兼用山梔黃芩黃柏犀角黃連或有純是陰脈者或有純是陽脈者當以病治病脈不與焉即以荊芥防風牛蒡射干黃芩枳殼銀花獨活生地丹皮花粉為治再以保命丹或紅內消同服日用吹藥夜用嚙藥無不見效更有一種熱病而服熱藥火毒熾甚而發於喉間大寒大熱疼痛不止或血脹而木伸縮不能飲食難進其脈洪實有力大便不行宜急下之若脈洪弦而浮無力宜涼血行血為主若過用疎風散火之劑恐變別證最稱難治又有一種出外急走遠路脫力而傷肺氣喘息難舒以致喉痛舌脹地閣下腫突如鎖喉之狀內視之非重舌外視之非痰毒寒熱大作痰涎湧六脈洪大中空面色發黃而浮初以防風通聖散探之或效一二即以涼血生血順氣之藥治之又有似喉證非喉證者其喉亦痛牙關緊閉胸膈痛四肢攣厥作痛腹痛因受有重傷或用力太過致瘀血滯凝當以行血破瘀為要初起可救過五六日不治又如弱證喉癰雖是

肺經之病亦有兼他經而起者何以知之假如喉間紅瘰作痛是肺經火盛之故若頸項之筋有時或左或右作脹而梗氣悶不快此怒氣傷肝左關脈必洪大而弦當清肝火以舒筋涼血為主用藥則以當歸牛膝佐以柴胡黃芩羚羊若兼右關微弱而緩乃脾胃有虧兼用白芍茯苓此肝脾與肺共病也喉間紅瘰作痛其舌紫色或生刺作痛或作木乾枯是心經受虧無血榮養以致虛火熾盛且兼思慮過度鬱氣所成左寸脈必浮洪當以犀角黃連為主佐以當歸白芍此心與肺共病也喉間紅瘰作痛滿唇焦裂口熱如燒或作乾嘔是胃經虛火熾盛右關脈必洪弦且緊當以山梔黃芩為主佐以當歸白芍山藥此胃與肺共病也喉間紅瘰作痛夜間舌乾口苦湯水不進或有嗽而無痰更兼滑精者是腎水枯竭虛火上炎兩尺脈必洪數無力當以山藥知母黃柏為主佐以花粉澤瀉白芍茯苓此腎與肺共病也若夫肺經獨病或吐血而成或嗜酒而發或脾瀉而生氣血消散嗽重聲啞喘急痰多聲如曳鋸睡卧不得六脈洪大而浮肺部更甚當以山藥貝母黃芩樓仁牛蒡為主佐以當歸白芍熟地茯苓丹皮犀角黃柏知母服之喉痛雖止然不過待日而已更有六脈沉隱神脫氣敗飲食不進步履不前盜汗自汗如雨脾氣滯泄死無疑矣若年老人喉間紅瘰作痛或舌上生刺或破腫或木脹言語不清六脈微洪互至有餘飲食動靜形色神氣如常此血少火盛當以黃芩丹皮茯苓熟地當歸白芍為主佐以元參牛蒡枳殼銀花花粉山藥苡仁甚則加犀角黃連不同前論若小兒痘後或瘡後患此當以犀角黃連敗其熱毒更以涼血補血健脾之藥佐之本草參芪斷不可用此外用藥與大人相同若女人胎前患此者先以安胎為主次以涼血為佐紅內消保命丹忌用餘藥無妨產後一月未滿者當以熟地當

歸補血枳殼青皮下氣元參射干牛蒡元胡索銀花消腫少加黃芩花粉以清熱紅內消保命丹可用但不宜多吹藥擒藥忌之如經期適來當以破血下氣之藥為主涼血者少用紅內消保命丹擒藥服之亦無忌茲論其大略如此餘詳各條

通治用藥

夫喉證向有三十六法今余列十八證名目雖簡而治法已備要之十八證中又可以風與痰與火概之凡遇此證不論緩急只以下氣消痰為主次則清火涼血若不分先後混亂用藥貽害匪淺今開用藥大概於左惟高明者臨時參用可耳

藥用防風前胡丹皮獨活各一錢杏仁樓仁山查各三錢車前木通各八分兩劑後加山梔膽星各一錢生地二錢如火未息加黃芩一錢以保命丹紅內消同服

誤用黃連半夏生薑桔梗之類此等藥皆屬寒涼之品活獨活服幾劑自愈

牙關難開須加真北細辛一分

單蛾雙蛾至八九日方可用鍼刺出毒血未滿十日萬不可刺

或有疔瘡根脚紅內消不可用用之反凶煎藥中加地丁草七八錢自愈保命丹可服

頸間痰毒須加象貝母草河車猴薑若日久難愈以蝦蟇一箇研好硃砂五分灌於中泥裏煨研末服之自消

用藥禁忌

古有柑桔湯乃清喉之要劑今有見有患喉證者即用之而無疑嗟乎此猶抱薪救火非能愈疾而更增其疾矣何以言之夫喉證乃火毒上升所致須以清氣瀉火為要甘草補中而不得火既受其補則火愈熾病愈重矣桔梗引諸藥上行藥既上行則痰與火亦引之而上行勢必喉間壅塞於病更加重矣故小兒驚痰大人痰火桔梗是最忌者本草云升麻引味中清氣上升又可代犀角似乎可用不知一用其痰火與氣一齊上湧於咽喉之間四肢逆冷喘急異常為害匪淺若在他證猶或可用如鎖喉服之則不治矣半夏雖清痰若喉證痰重者誤用之禍不旋踵蓋此乃治脾家濕滯之痰至於喉證有痰總不外肺中熱火何可以半夏之燥烈治之乎老薑辛辣發散雖喉證亦以發散為主然過用辛辣之味則以火益火大非所宜此五者與喉證關係甚重故特表而出之至別藥之中亦多禁忌惟業醫者審擇用之茲不多贅

凡散方藥

牛黃解毒丸 即擒藥

治一切喉風緊閉咳嗽喘急痰涎壅塞胸膈迷悶並口舌等證無不見效

牛黃

五分

青黛

一兩 飛淨

冰片

五分

雄黃

五錢

兒茶

三錢

官礬

五錢

薄荷

三兩 另研

膽星

四兩

研細末生蜜和丸如芡實大每嚙一丸待其自化嚙下一日夜須嚙四丸小兒減半紅內消散

治咽喉一切諸證並無名腫毒已潰均可使用厥效如神

大蜈蚣去頭足切斷同米炒以米黑為度 乳香去油 血竭另研 雄黃 象貝母 川山甲炒 沒藥去油盡

辰蛛水飛 麝香揀去毛皮乾研

右藥等分惟麝香少許研細末每服七分小兒減半和煎藥同服下亦可

保命丹錠子

治咽喉口齒新久腫痛並解諸毒磨服神效

麝香揀去毛皮乾研三錢 辰砂明透者水飛淨三錢 冰片梅花大塊一錢 珍珠研細末一錢 琥珀一錢 山豆根一兩

文蛤洗淨煨一兩 山茨菇洗去毛皮淨焙三兩 雄黃鮮明大塊研淨三錢 千金子白者去油一兩 紅毛大戟浙江紫大戟為上用去方綿大戟不堪用去

蘆根洗淨焙乾為末二兩五錢

右藥研末以糯米粥和山豆根汁打糊為錠每重二錢病輕者一錠重者連服二錠

膽冰消毒散初起吹藥

血竭一錢 膽礬一錢 雄黃一錢 乳香去油三錢 冰片一錢 白占三錢 燈心灰不拘

冰硼散收功吹藥

冰片一錢 硼砂一錢 山豆根二錢五分

玉屑散一名五馬破曹

治咽喉口舌頸項破爛諸痛皆效



薄荷

二兩
另研

官礪

三錢
五分

雄黃

三錢

兒茶

一錢

冰片

三分

右藥研細末貯磁餅內臨用挑少許置舌上咀含片刻嚥下日用八九次如鎖喉風口內乾枯牙關緊閉不能咀含者以無權水灌下自能開闔生津惟脾胃弱者不宜多用

鎖喉第一

此證因風熱積於胸膈或酒色及鬱怒所致其狀喉上下左右紅紫腫痛或帶丁焦黑腐爛頸項浮腫痰涎壅塞聲響如潮氣急發喘眼目直視額上有汗如珠身汗如雨或泄瀉清水四肢厥冷或腰脇疼痛肚腹脹痛法在不治痛脈六七至不論大小至數分明雖甚危險十中可救一二或脈洪大或沉細惟三部混亂即形色神氣如常終為難治初起用吹藥噙藥痰多以萬年青根搗汁和醋攪去痰涎或土牛膝汁或青魚膽汁俱可

加減荆防敗毒散

脈洪大七
八至用之

荆芥防風牛蒡連翹膽星獨活前胡枳殼蘇子樓仁杏仁生地黃芩黃柏山梔元

參加原枝燈心二十莖長流水煎和保命丹同服大便不行去荆芥防風加枳實青皮大黃

加減柴胡雙解散

脈沉隱或二
三至用之

柴胡前胡羌活獨活枳殼枳實川芎青皮樓仁杏仁蘇子長流水煎和保命丹

同服冬月加麻黃

脈七八至而浮洪頭面皮肉浮腫色微紅涕淚交流語言蹇澀或以防蘇子銀花牛蒡杏仁樓仁枳殼枳實膽星青皮黃柏黃芩山梔元參和保命丹同服亦有獲效者

服荆防敗毒散後肺管脹塞兼咳嗽者即加生地當歸白芍

服敗毒散一劑喉證遂減惟胸膈脹痛牽引脊背再服之即除服三黃湯亦有全愈
蛇蚶同白梅搗爛和凡噉之每見有效

誤用大黃巴豆瀉利不止喉證雖愈而胸膈脹悶飲食不進醫復誤作他證治者死

重舌第二

此證因平日喜食炙博熱毒之物積熱攻於心脾二經所致其狀舌下腫突生一小舌久之大舌反縮短或脹
而紫言語不消飲食不下微作寒熱口中清涎極多即用銅匙將舌捺定用三稜針刺大舌兩旁及舌下津液
玉液兩穴各一針可五分許再刺小舌兩旁或出紫血或待清涎流盡方進吹藥噉藥次服煎劑自安
藥用荊芥防風連翹獨活前胡射干膽星枳殼元參生地黃芩黃柏銀花花粉長流水煎如刺破清涎出盡亦
有弗藥而愈者

氣癰第三

此證因惱怒傷肝肝血不和以致肺氣壅塞火熾上升發於喉間其狀帝丁之上紅腫作痛或有連及兩邊者
寒熱大作初起不宜刺破待六七日後方可針刺或有誤服升提之藥竟不能愈者或有服保命丹紅內消其
毒自出者如痰多則以醋覺之強進飲食為妙否則恐變輕為重

藥用荊芥防風射干牛蒡連翹烏藥膽星前胡枳殼生地元參黃芩銀花長流水煎痰多加樓仁氣重加枳實
青皮大便不行加黃連甚則加大黃

乳蛾第四

此證因嗜酒肉熱物過多熱毒積於血分兼之房事太過腎水虧竭致有此發其狀或在左或右或紅或白如乳頭故名乳蛾一邊腫曰單蛾兩邊腫曰雙蛾或前後皆腫曰爛頭乳蛾初起必作寒熱用保命丹紅內消兼煎劑治之

藥用荆芥防風射干牛蒡前胡枳殼連翹膽星生地丹皮元參黃柏黃芩銀花長流水煎如火盛加犀角黃連大便閉結加大黃寒熱不止加羌活獨活體虛痰多加樓仁杏仁貝母

有一種名根脚喉風其證日行一穴至七日行七穴喉間發泡時欲嘔吐或一年一發或半年一發或一二月數發根留於中不能盡去一時難愈或云先從脚根發起至於喉間亦名脚跟喉風發時在左則左足酸軟疼痛有似筋觸牽入喉間在右亦如之治法同乳蛾證亦相似

今人每見發有紫泡以為毒物即用刀鍼開之豈知病之初起毒氣熾盛發之於泡若刺之出血非但不能愈疾加之破傷則病益重矣

或問曰亦有用刀針而得愈者何故答曰彼病勢淺火毒不重刺出血少則愈者其偶然耳倘病勢已深火毒極盛設以刀針刺之其誤事也可勝言哉

或以寒熱大作誤認感寒即用生薑半夏喉痛益甚蓋薑夏喉證所大忌也

詳前用藥禁忌

弄舌第五

此證因風痰久積於內或勞役過度而生其狀舌出過唇不能言語患者以手時弄其舌故名初起用青魚膽汁攪去其痰急宜以小布針刺少商穴

在手大指內側之端去爪甲角如韭菜許白肉際乃肺經穴也

出血者易治出黃水者難治腫不消者

亦難治

藥用枳殼枳實牛蒡連翹射干青皮蘇子膽星防風生地犀角黃芩山梔銀花長流水煎

舌捲縮而不能言因乎風寒也舌長寸許而不能收因乎房勞也舌腫滿而不能消因乎七情也舌根腫脹者謂之重舌腫而不柔利者謂之木舌初起急宜醫治遲則不救舌腫滿口痰涎極多亦水舌之一種前方重加大黃芒硝下後自愈

纏喉第六

此證因風痰濕熱久積於內或食炙博厚味太多或房勞及抑鬱所致其狀耳下紅腫漸趨項下及結喉之間一邊者輕兩邊者重喉內帝丁左右帝丁如蛇盤之狀有黃白二色黃為黃纏白為白纏急宜刺少商穴出血

注見弄舌

次用吹藥噙藥男子延至結喉下不治女子延至胸膛不治喉中聲響如雷者不治額鼻有青黑氣頭低

痰如膠者不治藥用荊芥防風羌活獨活枳殼連翹膽星樓仁車前紅花丹皮黃芩元參前胡牛蒡銀花長流水煎和紅內消同服再下保命丹服藥至四五日加當歸白芍生地黃柏土貝母其效甚速

啞瘡第七

此證因風痰壅滯於咽喉之間其狀口不能言牙關緊閉即用蟾酥化水滴鼻內即開仍以玉屑散吹之再將

鵝翎探入喉中攪去風痰即能言矣先進牛黃解毒丸次服荊防解毒散連進三三劑自愈如面紫舌青唇黑鼻流清涕目赤多淚爪甲俱青者不治

骨槽第八

此證因憂思鬱慮邪毒交乘結聚於太陽經絡或則惱怒傷肝致筋骨緊急思慮傷脾致肌肉結腫膏粱厚味致膿多臭穢其狀始於耳項皮膚間隱隱有核漸如李大便覺腫痛初則堅硬不消久則延爛難愈甚至齒牙墮落牙床腐穢俱在不治初起先用鵝翎探吐風痰次以陳艾炙耳垂下五分七壯再服煎藥加減當歸連翹枳殼生地銀花射干膽星赤芍元參牛蒡元胡索黃芩丹皮長流水煎

懸蜞第九

此證因上焦熱毒蘊積風痰壅塞而生其狀上脰腫垂形如蛙腹或如雞卵咽喉閉塞痰涎滿舌初治用鵝翎探吐風痰次以吹藥噙藥及荊芥敗毒散加減日久服千金內托散

加減千金內托散厚朴荊芥防風連翹羌活獨活白芷膽星枳殼元參蘇子杏仁樓仁葱白

爛喉癰第十

此證因棉花瘡毒未盡而結於咽喉其狀周圍紫暈漸至腐爛爛上則鼻平陷爛下則飲食難進多致不救初起不覺或十日半月始知當以清熱涼血補脾為主佐吞百寶丹二三十服若體弱痰多嗽重聲啞者不治藥用生地花粉黃芩白芍黃柏丹皮銀花元參牛蒡射干防風角刺體弱者加茯苓嗽重如山藥次仁知母樓

