

東晉寶鑑

十

東醫寶鑑雜病篇卷之二

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

風

中風微漸

凡人初覺食指次指麻木不仁或不用者三

年內必中風之候也宜先服愈風湯天麻丸

助下各一兩料此治之先明○聖人治未病之病

知未來之疾此其良也其中風者必有先兆之證

覺大姆指及次指麻木不仁或手足少力或肌肉

微掣者此先兆也三年內必有六風宜調其榮衛

先服愈風湯天麻丸或加減防風通聖散防見可

以預防冊○竹瀝枳木丸疔覬與搜風順氣丸防

或相間服之亦可預防醫○凡人手足漸覺不隨

寒溢或胃膈迷悶吐痰相續或六脉浮滑而虛軟

無力雖未致於倒仆其為中風暈厥之候可指日

而定矣早當從丹溪之法調治之○初覺風氣

便服愈風湯及天麻丸相為表裏乃治未病之聖

藥也

# 調治預防

左半身不遂左手脉不足者以四物湯  
右半身不遂右手脉不足者以四物湯

君子湯  
兼用之  
氣血兩虛而挾痰者  
二陳導痰等湯  
若真元漸復痰

南星半夏枳實竹瀝薑汁之類  
飲漸消或覺風邪未退者仍以此  
活愈風湯防風

通聖散加減調治而安  
傷○更加灸法尤好

# 熱生風

俗云風者言末而忘其本也非謂肝木之風實甚

甚而卒中之亦非外中於風良由將息失宜而熱氣

火暴盛腎水虛衰不能制之則陰虛陽實而熱氣

佛鬱心神昏冒筋骨不用而卒倒無所知也  
五志喜怒思過極而卒中者由五志過極皆為熱

甚故也  
而風為標也凡有風者即風熱病也  
入忽覺心腹中熱甚服治風藥而愈後到夷陵見  
一太守夏月忽患熱甚不免以水灑地設簟卧其

一上令入扇之次日急中風數日而殂及到澧陽其子見

煎飲小續命湯更召醫調治數日而愈始知人子

### 肥人多中風

中風因心腹中多熱而後作也熱生風信哉

入年逾五旬氣衰之際多有此疾壯歲之入無有

也若肥盛則間有之亦是形盛氣衰而然也

肥人多中風者以其氣盛於外而斂於內也

克木膽為肝之府故痰涎壅盛治法先須理氣為

### 中風所因

病內經曰偏風者百病之長也至其變化乃為他

泄風又有肺風心風肝風脾風胃風勞風等

中風者非外來風邪乃本氣病也誠有之東南氣

東晉書卷之九

温而地多濕有風者非風也皆濕生疾痰生熱熱  
生風也經曰亢則害承乃制河間曰土極似木數  
乎年得經意者河間一人耳○王安道曰昔人以主  
風為虛象而大異於昔人以予觀之昔人三子之  
論皆不可偏廢殊不知因于風者真中風也○因  
因氣因于濕者類中風而非中風也○王安道有  
論三子與昔人論風之不同而立真中類中之目  
愚竊疑焉夫中風之證蓋因先傷於內而後感於  
外之候也但有標本輕重之不同耳假如百病皆  
有因有證古入論中風者言其證也三先生論中  
風者言其因也知乎此則中風之候可得而詳論  
矣

証矣

中風大證口中眼喎僻手足癱瘓不省人事曰蒙昧曰

寒流曰痰涎壅盛

賊風虛邪中人黃帝問曰余聞四時八風之中人則皮  
有寒暑寒則皮膚急而蹙理閉暑則皮

膚緩而腠理開賊風邪氣因不得以入乎將氣必須入  
 正虛邪乃能傷人乎少師曰不然以入乎邪氣內極其中  
 入也卒暴因閉也其入淺以留其病也徐以其  
 病入也卒暴因閉也其入淺以留其病也徐以其  
 遲帝曰有寒溫知適腠理不開然有卒病者其故  
 何也少師曰西盛人血既積肌肉充皮膚入淺不  
 月滲則海水西盛人血既積肌肉充皮膚入淺不  
 堅腠理却烟垢着當是之時雖遇賊風其入淺不  
 深至其月郭空則海水東盛人氣血虛其衛氣去  
 形獨居肌肉減皮膚縱腠理開毛髮殘脆理薄烟  
 垢落當是之時遇賊風則其入深其病人也卒暴  
 癘○邪風之至疾如風雨故善治者治皮也毛其  
 治肌膚其次治筋脉其次治六府其次治五藏治  
 五藏者半死半生也納○邪乘虛入是謂虛邪納  
 ○邪之所湊其氣必虛  
 留而不去其病則實納

中風大法有四

一曰偏枯半身不遂二曰風痲身無痛  
 四曰肢不舉三日風懿奄忽不知入身四曰

類風痺諸痺針

偏枯 血氣偏虛 半身不遂 肌肉枯瘦 骨間疼痛 謂之

榮衛稍衰 則真氣去邪氣獨留 發為偏枯 智不亂

枯者半身不遂 肌肉偏不用而痛 言不變智不亂

病在分腠之間 宜溫卧取汗 且巨鍼取之 陽明虛

宗筋縱帶 脉不引而然 痲病有言 變志亂之 證痲

風痲 神智不亂 身體無痛 四肢不舉 一臂不遂 謂之

甚其言微 知不可治 甚則不能言 不可治 翦風痲

者緩者四肢不舉 急則一身皆仰 或左癱右瘓 或

一步丹脾實者 膏梁之疾 宜踈風順氣 元丹神飛

者十全大補湯 剋覲八寶回春湯 其偏枯身即

痛而不言 不變志不亂 邪在分腠 之間即東垣所謂

邪中府也 痲病身無痛 手足不遂 而言瘖志亂者

邪入于裏即東垣  
所謂邪中藏也

### 風懿

風懿然迷仆舌強不語喉中窒塞噫噫有聲謂之  
風懿然迷仆舌強不語喉中窒塞噫噫有聲謂之

汗者生汗不出身直者死由痰水制火閉塞心竅  
而不語熱者牛黃清心元虛者導痰湯方見臟腑  
言病在藏府汗出身軟者咽中寒窒窒然舌強不能  
救得死

### 風痺

有全門  
在下

### 中風之名各不同

其中卒然仆倒者經稱為擊仆世稱為  
卒中乃初中之證也其口眼喎斜

半身不遂經稱為偏枯世稱為癱瘓及腰腿風乃  
中倒後之證也其舌強不言唇吻不收經稱為

痲病世稱為風懿風氣亦中倒後之證也凡病  
偏枯必先仆倒故內經連名稱為擊仆偏枯也

### 脉法

凡中風脉無不大者非熱也虛寒虛相搏邪在皮  
脉浮而緊緊則為寒浮則為虛寒虛相搏邪在皮

# 風有中血脉中腑中臟之異

則中血脉則口眼喎斜中府

膚絡脉空虚賊邪不瀉或左或右邪氣反緩正氣  
 即急正氣引邪喎僻不遂邪在于絡肌膚不仁邪  
 在于經即重不勝邪入于府即不識入邪入于藏  
 舌即難言口吐涎沫  
 大數三魂孤  
 死研○中風脉浮滑兼痰氣其或沉滑勿以風治  
 或浮或沉而微而虛扶危温痰風未可踈  
 法浮遲者吉急疾者凶○脉浮而遲者易治大數  
 而急者死  
 風○脉浮而數中風使然  
 曰

三考治各不同  
 脉浮惡風寒拘急不仁或中身之後或中身之前  
 或中身之側皆曰中府其病多易治○中藏者唇  
 吻不收舌不轉而失音鼻不聞香臭耳聾而眼瞽  
 大小便秘結皆曰中藏其病多難治○中血脉而外  
 者多着四肢中藏者多滯九竅  
 有六經之形證則從小續命湯加減及疎風湯治  
 之○中府者先以加減續命湯隨證發其表如兼

中藏則內有便尿之阻隔宜以三化湯或局方麻仁丸方觀滋潤湯外無六經之形證內無便尿之

阻隔宜養血通氣大秦茺湯羌活愈風湯養榮湯○中藏者痰塞昏冒宜至寶丹之類鎮墜或活命

金丹牛黃定志九祛風至寶丹○風中五藏舌瘡眼瞽宜排風湯加減排風湯○但手足不遂言語

塞澁當從愈風湯以行中道久服大風悉去治病之法不可失于通塞或一氣之微汗加麻黃一錢

或一旬之通利加大黃二錢此為常治之法久則清濁自分榮衛自和矣錫

### 小續命湯

治卒中風不省人事喎斜癱瘓瘡症麻木眩暈初中風無汗表實等及治一切諸風證

防風一錢半防己肉桂杏仁黃芩白芍藥人參川芎麻黃甘草各一錢附子炮五分右剉作一貼入

薑三片棗二枚水煎服○凡中風六脉浮緊風當歸石膏有熟用白附子○凡中風六脉浮緊風

氣太盛心火暴升痰涎壅遏於經絡之中宜用小續命湯用附子以其稟雄壯之資而有斬關奪將

之勢能引入參輩並行於十二經以追復其散失之元陽又引麻黃防風杏仁薑發表開腠理以驅

散其在表之風寒引當歸川芎入血分以行血養  
血以滋養其虧損之真陰或加石膏知母以降胃  
火或加黃芩以清肺金若病勢稍退精神稍復輒  
當改用丹溪之法以補氣血清痰之劑以調養其  
本氣此急則治其標與  
夫標而本之治也

### 疎風湯

治風中府手足不仁先宜解表後用愈風湯  
調理羌活防風當歸川芎赤茯苓陳皮半夏

烏藥白芷香附子各八分桂枝細辛甘草  
各三分右剉作一貼入薑三片水煎服

### 加減續命湯

治風中府今人不分表裏虛實故張易  
老授東垣以六經加減之法○太陽中

風無汗惡寒麻黃續命主之本方倍麻黃防風杏  
仁有汗惡風桂枝續命主之本方倍桂枝芍藥杏

仁○陽明中風無汗身熱不惡寒白虎續命主之  
本方倍桂枝黃芩加葛根一錢四分○太陰中風

無汗身涼附子續命主之附子加一倍甘草加二  
錢一分乾薑加七分○少陰中風有汗無熱桂枝

續命主之本方倍桂枝附子甘草○六經混淆繫  
之於少陽厥陰或肢節攣痛或麻木不仁宜羌活

連翹續命之方  
錢連翹之本  
錢半兩加

三化湯  
治府藏俱中風便尿一阻不利厚朴大黃枳

二三微  
利即止

養榮湯  
治風中血脈外無六經之形證內無便尿之

歸川芎芍藥生地黃麥門冬遠志石菖蒲陳皮  
烏藥白茯苓實黃連防風羌活秦芫半夏南星

甘草各六分  
薑三片竹茹一塊水煎服

排風湯  
治風中五藏精神恍惚手足不仁口眼喎斜

仁白芍藥防風當歸甘草各八分  
五分右剉作一貼入薑三棗二水煎服

加減排風湯  
治同上通治五藏風天麻二錢蒼朮一

分白鮮皮當歸白芍藥白朮半夏赤茯苓黃芩  
仁甘草各四分右剉作一貼入薑三片水煎服

大秦芫湯

治中風外無六經之形證內無便尿之動

舌強不能言語宜養血而筋自榮此主之秦芫石

膏各一錢羌活獨活川芎白芷生地黃熟地黃當

羌活愈風湯

治風中府中藏先以本藥治之後用此

盡當服此藥以行導諸經久則大風悉去清濁自

分榮衛自和矣蒼朮石膏生地黃各六分羌活防

風當歸蔓荊子川芎細辛黃芪枳殼人參麻黃白

芷甘菊薄荷枸杞子柴胡知母地骨皮獨活杜冲

秦芫黃芩白芍藥甘草各四分肉桂二分右剉作

一貼入薑三片水煎朝夕服或以此湯空心嚥下

至寶丹

治卒中急風不語不省人事及風中藏精神

或肥而不遂或恐而健忘或喜而多思思忘之道

皆精不足也能安心養神調陰陽使無偏勝之

療肝腎虛筋骨弱語難精神昏憤或瘦而偏枯

二參丹臨卧嚥下四白丹研〇一名愈風湯研〇

或肥而不遂或恐而健忘或喜而多思思忘之道

皆精不足也能安心養神調陰陽使無偏勝之

或肥而不遂或恐而健忘或喜而多思思忘之道

皆精不足也能安心養神調陰陽使無偏勝之

皆精不足也能安心養神調陰陽使無偏勝之

五錢龍腦麝香各二錢半銀箔五十片金箔五十片內半為衣安息香以酒濾去沙土爭一兩熬膏

右為末入安息香膏搜和勻一兩分作四十九人參湯化下一升一日二服

化倉卒難用宜減半代煉蜜為佳

滋潤湯 治風中藏地黃枳殼厚朴檳榔大黃麻仁杏

仁各一錢羌活七分紅花酒焙三分右剉作一貼水煎服

卒中風救急 初中倒時隨身醒者宜治若不醒者宜搯

亦宜吐之若口開手散遺尿者為陽暴絕速宜大料參芪補接之若眼戴上者宜灸之

倒濃煎八參黃芪湯加竹瀝薑汁服明○卒中昏倒不省牙噤涎潮口眼喎斜精神恍惚倉卒之際

以手大指掐刻人中即省或急令入將病者兩手兩足從上而下頻頻趕出四肢痰氣即散免致攻

去惡血就以氣鍼刺合谷二穴人中一穴皆良

法如未效用通關散吹鼻即提起頭頂髮任有嚏  
可治如口噤不開以破棺散擦之口即開多灌香

油加麝香一二分或用薑汁二撮生飲之類若風  
痰壅結諸藥不效奪命散一服立愈鑿凡中風

之證多是老年因怒而成蓋怒火上升所以昏什  
不省痰涎壅盛治宜豁痰瀉火豁痰宜省風湯瀉

火宜防風通聖散方規心下卒中昏倒即用開噤  
噴嚏法次用攝生飲煎湯調蘇合香元三九灌下

痰盛者加全蝎搗合元劫覘牛黃金虎丹以竹瀝  
黃清心元龍腦蘇合元劫覘牛黃金虎丹以竹瀝

薑汁香油童便  
調和灌下

牛黃清心元 治卒中風不省人事痰涎壅塞精神昏  
憤言語蹇澁口眼喎斜手足不遂等證

山藥七錢甘草炒五錢人參蒲黃炒神麴炒各二  
錢半犀角二錢大豆黃卷炒肉桂阿膠炒各一錢

七分半白芍藥麥門冬黃芩當歸防風朱砂水飛  
白朮各一錢半柴胡桔梗杏仁白茯苓川芎各一

錢二分半牛黃一錢二錢分羚羊角麝香龍腦各一  
錢雄黃八分白欽乾薑炮各七分半金箔一百二

十蒸內四十蒸為衣大棗二一兩枚蒸取肉研為膏

右為末棗膏入煉蜜和勻每

# 牛黃金虎丹

治急中風不省身強口噤鼻乾面黑遍

形體如醉痰涎壅塞胃喉中如拽鉦聲神黃水飛

天雄炮一兩二錢半膩粉龍腦各五錢牛黃二錢

藥行良久以薄荷汁更化一新汲水和灌之立愈如肥盛

體虛多涎有風之人宜常以此藥隨身備急為妙

通延不下魂魄飛揚如墮江湖中頃欲絕骨耳前

會頰車地倉百會肩髃曲池風市三里絕骨耳前

功虎丹之  
功也  
伏枕半月遂平此蓋灸百會之力其吐瀉乃服金

攝生飲 治各一錢半 木香 蒼木 細辛 石菖蒲 甘草 各一

錢右剉作一貼入

省風湯 治卒中風不省有熱者用此防風南星炮各

薑十片水煎服與導痰湯 藜觀相合煎服 尤

奪命散 治卒中風危急之疾 天南星 甜葶藶 白芷 半

夏巴豆去殼不去油各等分 右為末 每半錢薑

開噤法 散 卒中風口噤不開 難於下藥 宜用開關散 破棺

和南星 細辛 末以中指蘸藥 擦牙口 自開 齶客則

筋急故口

開關散 治卒中風 目瞑 牙噤 天南星 末五分 龍腦 其一