

S294

1287

1部24

景岳新方砭下



景岳新方攷卷三

閩吳航陳念祖修園父著

男

元豹道彪古愚
元犀道照靈石

全校字

熱陣

四味回陽飲

治元陽虛脫危在頃刻者

人參

一二兩

製川附子

一二錢

甘草

一二錢

乾薑

二三錢炮

水二鍾武火煎七分溫服徐徐飲之

陳修園曰仲景一百一十三方用人參者只有一十

八方皆因汗吐下之後亡其津液取其甘寒以救陰



中醫藥大學圖書館藏

唯吳茱萸湯理中湯附子湯三方剛燥之中借其養
陰以配陽蓋人參非補陽藥也讀神農本草經者自
知景岳學淺心粗惑于李時珍能回陽氣于無何有
之鄉之說遂視爲神丹每于救危之法必用之以致
新定回陽二次用至一二兩之多誤人無算昔人云
不讀人間非聖書余自三十歲後所藏雜書俱付之
一火今方自信其頗純也景岳四味回陽飲卽仲景
四逆加人參湯特附子只用二三錢乾薑炮透人參
用一二兩則荒唐甚矣且四逆湯以生附配乾薑取

其開闢羣陰迎陽歸舍交接十二經爲斬旂奪關之
良將而以甘草爲王者從容籌畫所以盡其將將之
能此峻劑中之緩劑也若倍加乾薑則爲通脈四逆
湯以此時生氣已離亡在頃刻若以柔緩之甘草爲
君豈能疾呼散陽而使返耶故倍用乾薑而仍不減
甘草者恐散煥之餘不能當乾薑之猛還藉甘草以
收全功也二方俱不加入參者慮陰柔之品反減薑
附之力而論中有四逆加入參者以其利止亡血而
加之也茯苓四逆湯亦少佐以人參者以其煩躁在

汗下之後也景岳不明此理妄立四味回陽飲以誤
人余亦姑置弗辯只明四逆湯爲回陽正法弗辯深
于辯也

六味回陽飲 治陰陽將脫等證

人參

一二兩或數錢

製附子

一二錢

炮乾薑

二三錢

甘草

一錢炙

熟

地

五錢或一兩

當歸身

三錢

如泄瀉者或血動者以冬白朮易之多多益善

水一鍾武火煎七分溫服

陳修園曰凡人將死之頃陽氣脫而陰氣必盛其時
大汗不止爲水洩于外痰涎如湧爲水泛于上水陰



調經飲 治婦人經脉阻滯氣逆不調多痛而實者

當歸 三五錢 牛膝 二錢 山查 一二錢 香附 二錢 青皮 一錢

茯苓 一錢 五分

水二鍾煎七分食遠服

通瘀煎 治婦人氣滯血積經水不利痛極拒按及產

後瘀血膏痛并男婦血逆血厥等證

歸尾 五錢 山查 香附 紅花 新者炒黃各二錢 烏藥 二錢

青皮 錢半 木香 七分 澤瀉 錢半

陳修園曰經脉不行虛則補而實則攻執則寒而寒



則熱調經通瘀二煎畏首畏尾不足法也

胎元飲 治婦人衝任失守胎元不安不固者隨證加

減用之或間日或二三日常服一二劑

人參

隨宜

當歸

杜仲

芍藥

各二錢

熟地

二錢

白朮

錢半

甘草

一錢

陳皮

七分無滯者不必用

水二鍾煎七分食遠服

國胎煎

治肝脾多火多滯而屢墮胎者

黃芩

二錢

白朮

一二錢

當歸

芍藥

阿膠

各錢半

陳皮

一錢

砂仁

五分



不得不實白混說也且云爲理中湯之變方宜剛燥者當用理中宜濕潤者宜用此方更諺夫上焦屬陽下焦屬陰而中焦則爲陰陽相偶之處參草甘以和陰薑朮辛以和陽辛甘相輔以處中則陰陽自然和順不曰溫中而曰理中明非剛燥之劑也景岳以庸耳正自論藥不識剛柔燥濕之本素喜柔潤故以歸地易人參白朮而改其名曰理陰煎服之數劑則陰氣內壅而爲脹滿陰氣上逆而爲嘔噦陰水汎溢而爲痰飲惡心陰盛于中則土下不交而吐瀉陰凝于

內則陽不遏而腹痛陰盛于下則關元不煖而血滯
經遲不但不能治病且以增病又云真陰不足或氣
多勞倦之輩因而忽感寒邪不能解散者用此溫補
陰分使陰氣漸充則汗從陰達而寒邪不攻自散等
語更屬無知妄作夫大陽主表爲心君之藩籬猶京
都之有邊關也寒邪初感先入太陽之界仲景麻桂
諸方汲汲以扶陽抑陰爲事法在發汗汗爲心液發
之所以行君主之令也以君主之陽內發則寒水之
邪外散矣若從景岳之說以陰藥助陰邪不猶入井



而下之石耶吾不解庸醫慣用此方日誤數人而仍不改輒者豈盡天良之斲喪抑亦惑于景岳誇大之言歸咎于病之深而莫救不自知其術之謬而殺人

也
養中煎 治中氣虛寒爲嘔爲泄者

人參 一二錢 山藥 炒二錢 白扁豆 炒三錢 甘草 一錢 茯苓 錢

乾薑 炒黃一錢

水二鍾煎七分食遠溫服

陳修園曰方亦平妥但云空虛覺餒者加熟地不無

可錢耳

溫胃飲 治中寒嘔吐吞酸泄瀉不思飲食及婦人嘔

寒嘔惡胎氣不安等證

人參 二三錢 或一兩 白朮 炒一錢 或二兩 當歸 一二錢 泄瀉者不用 扁豆 錢

陳皮 一錢 或一兩 不甲 乾薑 炒焦一錢 二三錢 甘草 一錢

水二鍾煎七八分食遠溫服

陳修園曰方佳而加減陋

五君子煎 治脾胃虛寒嘔吐泄瀉而兼濕者

人參 錢 白朮 錢 茯苓 各二錢 炙甘草 二錢 乾薑 炒三錢



水一鍾半煎服

陳修園曰純粹亦可作丸

六味異功煎 治證同前而兼微滯者即前方加陳皮

陳修園曰方亦純

參薑飲 治脾肺胃氣虛寒嘔吐欬嗽氣短小兒嘔乳

等證

人參

三五錢或倍之

甘草

三五分

乾薑

炮五分或二三錢或

用煨生薑二三片

水一鍾半煎七分徐徐服之

陳修園曰分兩不得法咳嗽者不可用



胃關煎一治脾腎虛寒作瀉或甚至久瀉腹痛不止冷

痢等證

熟地

或三五錢

山藥

炒二錢

白扁豆

炒二錢

甘草

錢一

焦乾

薑

錢一二

吳茱萸

製五分

白朮

炒一二錢

水二鍾煎七分食遠溫服

陳修園曰古人製方最難景岳製方最易不論何方

加入熟地卽云補腎治真陰不足加入人參卽云補

氣治元陽衰之流俗喜其捷便其邪說至今不熄也

此方于苦燥辛溫劑中君以熟地不顧冰炭之反



中醫藥大學圖書館藏

注云治脾腎虛寒作瀉陋甚

佐關煎

治生冷傷脾瀉痢未久腎氣未損者宜用此

湯以去寒濕安脾胃

此胃關煎之佐者也

厚朴

炒一錢

陳皮

炒一錢

山藥

炒二錢

甘草七分 猪苓

二錢

澤瀉

二錢

乾薑

炒一錢

肉桂

二錢

水一鍾半煎服

抑扶煎

治氣冷陰寒或暴傷生冷致成瀉痢凡初起

血氣未衰脾腎未敗或脹痛或嘔惡皆先用此湯此

胃關煎表裏藥也宜察虛實用之其有寒濕傷臟霍

亂邪實者最宜用此

厚朴

陳皮

烏藥

各一錢五分

猪苓

二錢

澤瀉

二錢

甘草

一錢

乾薑

炮一錢二錢

吳茱萸

製七分

五分

水一鍾半煎七分食遠服

陳修園曰佐閉煎抑扶煎二方雖不甚龐雜但粗淺

甚不可爲法

四維散

治脾腎虛寒滑脫之甚或泄痢不能止或氣

虛下陷二陰血脫不能禁者無出此方之右

人參

一兩

製附子

二錢

乾薑

炒黃

甘草

一錢

烏梅肉



世界中医药大学图书馆版权所有

五分或一錢酌其味之微甚隨病人之意而用之或不用此即四味回陽也

右爲水和勻用水拌濕蒸一飯頃取烘乾再爲末每服一二錢溫湯調下

陳修園曰四微散即四味回陽飲加烏梅是也但彼用之以回陽則誤此用之以救陰則得蓋久痢與二便血脫人參是其要藥也烏梅亦用得確當

鎮陰煎 治陰盛于下格陽于上則真陰失守血隨而

溢以致大吐大衄六脉細脫手足厥冷危在頃刻而血不能止者速宜用此使孤陽有歸則血自安也如



治格陽喉痺上熱者當以此湯冷服

熟地

二二三兩

牛膝

二錢

甘草

一錢

澤瀉

半一錢

肉桂

二錢

製附子

五七分或一二三錢

水二鍾連煎服

陳修園曰此方從八味地黃丸套來方面却亦不雜俱初服效二三服不甚效四五服反劇何則景岳謂陰虛于下陽格于上亦古人之相沿之陳語其實是陽虛于上陰氣乘之邪火因而竊動忽得桂附扶胸中之陽如太陽一出嚼火無光故初服而效再服不



南京中医药大学图书馆版权所有