

金匱心典卷下

漢張仲景著

吳下尤怡在涇集註

黃痺病證并治第十五

寸口脉浮而緩。浮則爲風。緩則爲痺。痺非中風。四肢煩。脾色必黃。瘵熱以行。

泗溪云痺非中風
言此中風之痺
乃風濕鬱塞之
痺也

脉浮爲風。脉緩爲濕。云爲痺者。風與濕合而痺也。然非風痺疼痛之謂。故又曰痺非中風。所以然者。風得濕而變熱。濕應脾而內行。是以四肢不疼而苦煩。脾臟瘵熱而色黃。脾者四運之軸也。脾以其所瘵之熱轉輸流布而肢體面目盡黃矣。故曰瘵熱以行。

金匱心典卷下目錄

黃痺病證并治第十五

驚悸吐衄下血胸滿瘀血第十六

嘔吐噦下利病脉證治第十七

瘡癰腸癰浸淫病脉證并治第十八

趺蹶手指臂腫轉筋狐疝蛇蟲病脉證治第十九

婦人妊娠病脉證治第二十

婦人產後病脉證治第二十一

婦人雜病脉證并治第二十二



金匱心典卷下

漢張仲景著

吳下尤怡在涇集註

黃痺病證并治第十五

寸口脉浮而緩。浮則爲風。緩則爲痺。痺非中風。四肢煩。脾色必黃。瘵熱以行。

泗溪云痺非中風
言此中風之痺
乃風濕鬱塞之
痺也

脉浮爲風。脉緩爲濕。云爲痺者。風與濕合而痺也。然非風痺疼痛之謂。故又曰痺非中風。所以然者。風得濕而變熱。濕應脾而內行。是以四肢不疼而苦煩。脾臟瘵熱而色黃。脾者四運之軸也。脾以其所瘵之熱轉輸流布而肢體面目盡黃矣。故曰瘵熱以行。

此言寒熱不調脾

腎交病也

酒云此暖病症甚

難約言之則能食腹

滿眩暈也

忠可云仲景言揭黃

疸之脉主之以風而推

及於痺是明言黃疸

之病風寒濕並有之

矣故云言風寒相搏

又曰黃家所得從濕得

之然觀其後所出方雖

有穀酒之勞正黃之別

未嘗專於治風治寒

治濕惟清熱開鬱而

為肺方脾為腎分因

用藥絕不重補宜紀

治疸之法以清熱開鬱

金匱心典

卷一

跌陽脉緊而數數則為熱熱則消穀緊則為寒食節為
滿尺脉浮為傷腎跌陽脉緊為傷脾風寒相搏食穀即
眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下流小便不通陰被其寒
熱流膀胱身體盡黃名曰穀疸

跌陽脉數為熱者其熱在胃故消穀脉緊為寒者其
寒在脾故滿滿者必生濕胃熱而脾濕亦黃病之原
也尺脉浮為傷腎者風傷腎也跌陽脉緊為傷脾者
寒傷脾也腎得風而生熱脾得寒而生濕又黃病之
原也濕熱相合其氣必歸脾胃脾胃者倉廩之官也
穀入而助其熱則眩穀不消而氣以瘀則胃中苦濁



中醫藥大學圖書館藏

為主雖有汗下之說而破氣與溫補大汗及大下皆所宜乎
大日此常雖病本風寒並傷脾腎假使穀氣消則正氣足以禦邪今不消而胃濁胃濁而致黃是穀氣必黃之因實致黃之媒也

濁氣當出下竅若小便通則濁隨溺去今不通則濁雖下流而不外出於是陰受其濕陽受其熱轉相流被而身體盡黃矣曰穀痺者病雖始於風寒而實成於穀氣耳

額上黑微汗出手足中熱薄暮即發膀胱急小便自利名曰女勞瘵腹如水狀不治

此諸症的是女勞瘵有之

腎勞而熱黑色上出猶脾病而黃外見也額於部為庭靈樞云庭者顏也又云腎病者顏與顏黑微汗出者腎熱上行而氣通於心也手足心熱薄暮即發者病在裏在陰也膀胱急者腎熱所逼也小便自利病

酒淫云水來侮土則
腹腫矣

酒淫云凡穀疸無不
腹滿而腹滿虛也
下之何益

不在痛也。此得之房勞過度。熱從腎出。故名曰女
瘕。若腹如水狀。則不待陰傷。陽亦傷矣。故曰不
心中懊懣而熱。不能食。時欲吐。名曰酒瘴。

懊懣鬱悶不寧之意。熱內畜則不能食。熱上衝則
欲吐。酒氣熏心而味歸脾胃也。此得之飲酒過多所
致。故名酒瘴。

陽明病。脉遲。食難用飽。飽則發煩頭眩。小便必難。此欲
作穀瘵。雖下之。腹滿如故。所以然者。脉遲故也。

脉遲胃弱。則穀化不速。穀化不速。則穀氣鬱而生熱。
而非胃有實熱。故雖下之而腹滿不去。傷寒裏實。脉

一遲者尚未可攻。况非裏實者耶。

夫病酒黃痺。必小便不利。其候心中熱。足下熱。是其證也。酒黃痺者。或無熱。靜言了了。腹滿。欲吐。鼻燥。其脈浮者。先吐之。沉弦者。先下之。酒痺。心中熱。欲吐者。吐之愈。

二酒之濕熱。積於中而不下出。則爲酒痺。積於中。則心中熱。注於下。則足下熱也。酒黃痺者。心中必熱。或

亦有不熱。靜言了了者。則其熱不聚於心中。而或從下積爲腹滿。或從上衝爲欲吐。鼻燥也。腹滿者可下之。欲吐者。可因其勢而越之。旣腹滿且欲吐。則可下

亦可吐。然必審其脉浮者。則邪近上。宜先吐。脉沉者。則邪近下。宜先下也。

酒痺下之。久久爲黑痺。目青面黑。心中如噉蒜狀。更便正黑。皮膚爪之不仁。其脉浮弱。雖黑微黃。故知之。

酒痺雖有可下之例。然必審其腹滿脉沉弦者。而後下之。不然。濕熱乘虛陷入血中。則變爲黑痺。目青面黑。皮膚不仁。皆血變而瘀之徵也。然雖曰黑痺。而其原則仍是酒家。故心中熱氣熏灼。如噉蒜狀。一如懊懣之無奈也。且其脉當浮弱。其色雖黑。當微黃。必不如女勞痺之色純黑。而脉必沉也。

渴字徐氏本作喘字

師曰病黃瘧。發熱煩渴。胸滿口燥者。以病發時。火劫其汗。兩熱所得。然黃家所得。從濕得之。一身盡發熱而黃。壯熱熱在裏。當下之。

煩滿燥渴。病發於熱。而復以火劫之。以熱遇熱。相得不解。則發黃瘧。然非內兼濕邪。則熱與熱相攻。而反相散矣。何瘧病之有哉。故曰黃家所得。從濕得之。明其病之不獨因於熱也。而治此病者。必先審其在表在裏。而施或汗或下之法。若一身盡熱而腹熱尤甚。則其熱爲在裏。裏不可從表散。故曰當下。脈沉。渴欲飲水。小便不利者。皆發黃。腹滿舌痿黃。躁



中國醫藥大學圖書館藏

不得睡屬黃家。

脉沉者熱難外泄。小便不利者熱不下出。而渴飲之。水與熱相得。適足以蒸鬱成黃而已。脾之脉連舌。本散舌下。腹滿舌痿。脾不行矣。脾不行者有濕。躁不得睡者有熱。熱濕相搏。則黃痺之候也。

黃痺之病。當以十八日爲期。治之十日以上。瘥反劇爲難治。

土無定位。寄主於四季之末各十八日。黃者土氣也。內傷於脾。故卽以土王之數爲黃病之期。蓋謂十八日。脾氣至而虛者。當復卽實者。亦當通也。治之十日。

泗溪云渴則濕病
而多燥病故難治
不渴則徒濕而已

忠可云頭眩是穀
疸第一的證

以上差者邪淺而正勝之則易治。否則邪反勝正而
增劇。所謂病勝藏者也。故難治。

痺而渴者其痺難治。痺而不渴者其痺可治。發於陰部
其人必嘔。陽部其人振寒而發熱也。

痺而渴則熱方熾而濕且日增故難治。不渴則熱已
減而濕亦自消故可治。陰部者裏之臟腑。關於氣故
嘔。陽部者表之軀殼。屬於形故振寒而發熱。此陰陽
內外淺深微甚之辨也。

穀痺之病寒熱不食。食即頭眩。心膈不安。久次發黃爲
穀痺。茵陳蒿湯主之。

本文不言腹滿而方下云一宿腹滿則穀疸必有腹滿
蓋穀不消而胃中渴則氣痰而腹滿矣



穀疸者穀入不消
黃疸外見如金
食穀不化一證
其症較正黃為多
而愈期

條當與第三條參

茵陳蒿湯方

茵陳蒿 六兩

梔子 十四枚

大黃 二兩

穀疸為陽明濕熱瘀鬱之證。陽明既鬱。榮衛之源。壅而不利。則作寒熱。健運之機。窒而不用。則為不食。食入則適以助濕熱而增逆滿。為頭眩心胸不安。而

右三味以水一斗。先煮茵陳減六升。內二味煮取三升。去滓分溫三服。小便當利。尿如皂角汁狀。色正赤。一宿腹減。黃從小便去也。

黃家。日晡所發熱。而反惡寒。此為女勞得之。膀胱急。少



言日晡發熱而更惡寒即前篇暮即發之意本文已言是下熱豈只惡寒不發熱哉

腹滿身盡黃。額上黑。足下熱。因作黑瘧。其腹脹如水狀。大便必黑。時澹。此女勞之病。非冰病也。腹滿者難治。石礬石散主之。

黃家日晡所本當發熱。乃不發熱而反惡寒者。此爲女勞腎熱所致。與酒瘧穀瘧不同。酒瘧穀瘧熱在胃。女勞瘧熱在腎。胃淺而腎深。熱深則外反惡寒也。膀胱急。額上黑。足下熱。大便黑。皆腎熱之徵。雖少腹滿脹。有如水狀。而實爲腎熱而氣內畜。非脾濕而水不行也。惟是證兼腹滿。則陽氣併傷。而其治爲難耳。硝石鹹寒除熱。礬石除痼熱在骨髓。骨與腎合。用以清

腎熱也。大麥粥和服。恐傷胃也。

硝石礬石散方

硝石熬黃

礬石燒等分

右二味為散。大麥粥汁和服。方寸匕。日三服。病隨大

小便去。小便正黃。大便正黑。是其候也。

酒瘰。心中懊懣。或熱痛。梔子大黃湯主之。

忠可云酒必挾濕因其陰大傷故不用燥藥以竭其液但下其熱則濕不能留也

酒家熱積而成實。為心中懊懣。或心中熱痛。梔子大

黃。徹熱於上。枳實大黃除實於中。亦上下分消之法

也。

梔子大黃湯方

酒瘰云酒疸石上瘰而欲吐者多故即梔子加大黃除其熱

泗溪云脉浮即用
桂枝此從脉之法

梔子十四枚

大黃二兩

枳實五枚

豉一升

者四味以水六升煮取二升分溫三服

諸病黃家但利其小便假令脉浮當以汗解之宜桂枝

加黃耆湯主之

小便利則濕熱除而黃自已故利小便為黃家通法

然脉浮則邪近在表宜從汗解亦脉浮者先吐之

意但本無外風而欲出汗則桂枝發散之中必兼黃

耆固衛斯病去而表不傷抑亦助正氣以逐邪氣也

桂枝加黃耆湯方

見水氣

諸黃猪膏髮煎主之



中醫藥大學圖書館版權所有

忠可治賂天莊黃疸
腹大如鼓百藥不效
用猪膏四兩髮灰四
兩一剝而愈仲景
方如此其神

此治黃疸不濕而燥者之法。按傷寒類要云男子
大黃瘧飲食不消胃脹熱生黃衣在胃中有燥屎便
然猪膏煎服則愈蓋濕熱經久變為堅燥譬如膏
熱久則濕去而乾也本草猪脂利血脉解風熱亂髮
消癰開關格利水道故曰病從小便出

猪膏髮煎方

猪膏

半觔

亂髮

如雞子
大三枚

右二味和膏中煎之髮消藥成分再服病從小便出
千金云太醫校尉史脫家婢黃病服此胃中燥糞下
便差神驗

黃痺病茵陳五苓散主之。

此正治濕熱成痺者之法。茵陳散結熱五苓利水去濕也。

茵陳五苓散方

茵陳

十分

五苓散

五分

右二味和先食飲服方寸匕日三服

黃痺腹滿小便不利而赤自汗出此為表和裏實當下之宜大黃硝石湯。

一腹滿小便不利而赤為裏實。自汗出為表和。大黃硝石。亦下熱去實之法。視梔子大黃及茵陳蒿湯較猛。



北京中医药大学图书馆版权所有