

医学六要



一換新者數足以清水淘去皮尖焙乾
以童便一升于砂礶中文火煎至隨手
爛濾過入酥一兩薄荷自然汁二合攪
和藥搗五百下丸桐子大空心湯下十五
丸加至三十丸如覺熱減丸數忌覓生血
雀鴿冷水

訶梨散 治勞嗽上氣

赤茯苓

兩二

訶梨勒

兩二

木香

兩二

檳榔

兩二

當歸

兩一

炒

大黃

兩一

莫茱萸

湯泡

七次



每服三錢薑三片水一盞煎六分溫服

發熱

發熱必脉弦數而急浮而數者表熱也沉數者裏熱也數而有力者爲實熱數而無力者爲虛熱

有表熱有裏熱有虛熱有實熱夫何世人一染作風寒治既汗且下平至天枉良可太息因區分其類如左爲初學繩墨云

外感發熱初起覺惡寒頭痛脊強左脉浮緊是



感冒風寒、太陽受病、如脈浮緩、或左微急、兼
之鼻塞、眼脹、或自汗、或無汗、是傷風、陽明經
受症、其熱翕翕然在皮膚之間、是爲表熱、且
手心不熱、手背熱、或酒客、葷內火盛、而手心
亦熱者、又不可不知、治均發散、須分經絡、太
陽則冬月麻黃、十神餘三時大羌活、陽明則
升麻、葛根、白芷、芎蘇之類、或始自太陽、不解
轉入陽明、脈洪而長、其治亦同、或再不解、脈
或隱伏、或微弱、或浮急、症兼嘔吐、須防發斑、

再以升麻葛根等升發之。斑出之後煩渴飲引、面赤口苦、或耳聾寒熱往來、是少陽經受病、屬半表半裏、宜小柴胡加減和之。如熱再不解、手足汗出、舌乾煩滿、大渴、脈來沉實有力、是爲裏熱、其蒸蒸然從內而發于外、亦看輕重用藥、如無下症、只以小柴胡合解毒一二味、徐徐退之。

內傷熱發、熱自汗、六脈微弱、或右手大三倍于左、人迎按之無力、渾身酸軟、或痛、倦于言動、息

瘡屬內傷元氣虛熱宜補中益氣湯加減

陰虛熱發熱盛于午後或兼盜汗遺滑或咳嗽

有紅皮毛枯槁屬陰虛熱久則變為骨蒸勞
極宜坎離地骨之類不已秦艽鱉甲散

草還丹治陰虛骨蒸大獲奇驗慎勿輕忽

傷食熱發熱惡寒頭痛嘔惡胸口飽悶而痛脹

右寸關俱緊而滑或沉伏左脉弦急屬內傷

飲食外感風寒之熱先宜解散後消導和中

如不愈變出口舌乾燥心下作痛等症當消

急攻之或大柴胡湯或枳實導滯丸若慢用
正傷寒之法治之立死

腫毒熱發熱拘倦每日哺憎寒壯熱脉數而急
者須問有無痛處乃瘡腫之脉也治先發散
小兒發熱須問痧痘出未

婦人有孕忽然寒熱大作或因登高倒仆常問
胎動否如不動小腹作脹卽是胎氣已損急用
佛手散或加香附益母之類催之若已見紅而
胎不下用純謹穩婆取出爲佳不可忽畧

方見婦人



男婦四肢發熱、筋骨間熱、肌表熱如火燎、捫之
烙手、右關脉緩弱、或弦而浮數、乃火鬱發熱也。
升陽散火湯散之。此病多因血虛、或胃虛過食
冷物、抑遏陽氣于脾土之中、而然。火鬱發之後、
隨症治補養。

治驗

一人發熱、頭痛七日不止。余診之、左脉平和、右
寸關俱弦急有力、乃內傷宿食爲患也。以二陳
加枳實、厚朴、查麴、柴胡、三劑、再加黃芩、頭痛除。

但熱不淨、投枳實導滯丸百粒、更衣而愈、

一人傷風自汗、發熱不止、自以爲虛、服補中益

氣湯、熱轉劇、診之脉弦而長、實有力、予升麻葛

根湯倍芍藥、加桂枝少許、一劑汗止熱淨、

一婦每夜分卽發熱、天明暫止、自投四物湯反

加嘔惡、診得左關微急、而右寸關俱弦數有力、

詢之經後食梨、午後遂熱起、正丹溪所謂胃虛

過食冷物、抑遏陽氣於脾土之中、此病多因血

虛而得者、遂以升陽散火湯一服、熱已、後用四

去地黃、加枳木、陳皮、健脾養血、調理而愈。

一人熱而頭身痛七日不已，疑是下證。余診得左脉浮緊，且時惡寒，仍屬表熱。投大羌活湯，加葱薑出汗而愈。

一人同此多煩躁，時值炎月，予六神湯解散，亦大汗而解。

一人咳嗽已成勞極，用四物知柏不愈，乃以秦艽鱉甲散加二母、二門，十數劑頓愈。

一中年婦，每夜發熱，天明方止，症兼惡心不食。

肢倦且云素體肥今漸消瘦因憶古人有言昔
肥而今瘦者痰也痰滯中宮阻碍升降宜乎不
食且作惡心痞悶血無所滋因而不足故夜熱
乃以二陳治痰參朮補中氣枳實麥芽寬中香
附炒梔子清火柴胡退熱凡二十劑間服橘半
枳朮丸一月愈後日進人參湯體漸復舊

凡人飲食失節勞役過度一切火症悉屬內真
虛而外假熱故肚腹喜煖頰以手按口畏冷物
乃形氣俱病屬不足蒲中益血氣湯作大劑佳

十神湯

治霜降已後春分節前感冒寒邪有

表症脉浮緊者或初春寒令仍肅亦當用

之

紫蘇

白芷

甘草

麻黃

陳皮

香附

升麻

葛根

赤芍

川芎

葱薑煎取汗

九味羌活湯

見疫癘門

升麻葛根湯

同上

小柴胡湯

黃連解毒湯

大柴胡湯

俱見傷寒門

補中益氣湯

見內傷門

四物湯

見血門

枳實導滯丸

見傷食門

升陽散火湯

治火鬱發熱

葛根

柴胡

羌活

炙甘草

升麻

陳皮

白芍

防風

人參

薑蔥煎服



北京中醫藥大學圖書館版權所有

二陳湯

見痰門

秦艽鱉甲散

見勞熱門

草還丹用青蒿一斗五升童便三斗文武火熬
約童便減半去蒿熬至一升入猪膽七箇甘草
收和爲丸桐子大每服五十丸取表裏葉俱青
者是

發熱晝重夜輕口中無味陽虛也午後發熱夜
半則止口中有味陰虛也陽虛責之胃陰虛責
在腎蓋饑飽傷胃則陽虛房勞傷腎則陰虛以
藥論之甘溫補氣苦寒滋陰若氣血兩虛只補

其氣氣旺自然生血陽旺生陰也若中氣虛誤用苦寒禍不旋踵

王節齋曰南人稱發熱爲勞發蓋謂勞苦而發熱卽東垣內傷之旨也此病輕者一二發自愈重者用東垣法補之甚則加熟附子若因勞力辛苦而發熱輕易發汗立危

薛師曰潮熱咳嗽而脈數者假熱之脈也甘溫調養爲主補中益氣湯下六味丸

潮熱

虛弱

若癸卯辰時潮熱者、肝經燥熱也、用六味丸補
水、以生肝血、午未時潮熱者、心經虛熱、六味丸
壯水之主、以制陽光、申酉戌時潮熱者、肺經虛
熱也、補中益氣湯、培脾土以生肺金、亥子丑時
潮熱者、腎涸虛熱也、六味丸、兼手足逆冷者、腎
經虛敗也、八味丸、大凡潮熱、肺熱、五臟齊損也、
須六味丸、氣血俱損者、十全大補湯、

有潮熱似虛、胸膈痞塞、背心疼痛、服補藥不効
者、此乃痰症、隨氣而潮、故熱隨飲而亦潮、宜于

炎飲門求之

肺熱者輕手乃得微赤全無日晡熱甚乃皮毛
之熱其症必見喘咳寒熱輕者瀉白散重者原
膈散地骨皮散方用地骨苓草參柴半夏知母
等分水煎瀉白涼膈見火門

心熱者微按至皮膚之下肌肉之上輕手乃得
微按至皮毛之下則熱少加力按之則不熱是

熱在血脈也其症煩心心痛掌中熱而腕以黃

連瀉心湯導赤散硃砂安神丸

見內傷門
導赤散見火門

