

丹溪心法附餘卷之二十二

去集

小兒門

小兒諸病九十九

丹溪心法

○乳下小兒常多濕熱食積痰熱傷乳為病大槩肝與脾病多
小兒易怒肝病最多大人亦然肝只是有餘腎只是不足
○小兒初生未經食乳急取甘草一寸火上炙熟細切置地上
出火毒一時許用水一小盞熬去三分之一去滓用新綿蘸滴兒
口中令嚥及須臾吐痰及痰血方與乳食年長知瘡無病
○小兒急慢驚風發熱口禁手心伏熱痰熱咳嗽痰喘此類証
並用湧法吐之重劑瓜蒂散輕劑用苦參赤小豆末須蝦蟇汁

調服以後用通聖散為末蜜丸服間以桑樹上牛兒陰乾焙末
調服以平其氣。驚有二証 一者熱痰主急驚當吐瀉之
一者脾虛乃為慢驚所以多死當養脾 急驚只用降火下痰
養血 慢驚者先安脾土後散風邪只用硃砂安神丸更於血
藥中求之

○小兒驚然無故大叫作癇者必死是火大發則虛其氣故也
入方

黑龍丸 治小兒急慢驚風

牛膽南星二刀青礞石焰硝等分煨一刀天竺黃五斤

青黛五斤 蘆花二斤半辰砂三斤 殭蚕五分

蜈蚣一条半燒存性

右為末甘草煎膏丸如雞頭大每服一二丸急驚煎姜蜜薄
荷湯下慢驚箭糖梗白木湯下

一方治驚而有熱者

人參

茯苓

白芍酒炒

白朮

右以咀姜煎夏月加黃連生甘草竹葉

通聖散

見斑疹類

朱砂安神丸

見驚悸類

瓜蒂散

見痘類

○疳病或肚大筋青

胡黃連丸治疳病腹大

胡黃連半斤去果子積

阿魏一斤半醋浸去肉積

神麴二斤去食積

射香四粒

炒黃連二斤去摠積

右為末猪膽汁丸和黍米大每服二三十丸白木湯送下

又云胡黃連丸十二粒白木湯下

五積丸 治小兒諸般疳積

丑頭末二刀黃連五斤陳皮一刀青皮五斤山查五斤

右炒焦黑色為末每用巴豆霜半斤前藥末半斤宿蒸餅丸
麻子大小兒二歲十丸五更姜湯下至天明大便泄為度溫
粥補之未利再服三五丸

烏犀丸

丑頭末三刀青皮三刀史君子肉七斤半 白蕪荑二斤半

鶴風五斤芦荈

一名燒紅醋浸

苦練根皮五斤

右炒令焦黑色為末 麴丸麻子大每三五十九粒米飲送下食
前量小兒大小加減

黃龍丸

一稜 三兩 黑角 莪朮 三兩 青皮 兩半 山查 肉 七兩半

乾姜 七兩半

右用麴丸麻子大日晒乾食後姜湯下量兒大小加減

○烏犀黃龍間服食前服烏犀食後服黃龍

肥兒丸 治小兒疳積

蘆薈 會另研胡黃連 三兩 炒麴 四兩 黃連 白朮

山查 炒半兩 蕪荑 炒 二兩

右為末蘆薈和勻猪膽汁丸粟米大每六十九粒食前米飲下

疳黃食積

白朮

黃連

苦參

山查

右為末麴糊丸麻子大食後白湯下十五丸

食傷胃熱重蒸

白朮一兩半夏

黃連半兩平胃散

右用粥丸食後白湯下二十九

○心法附錄曰小兒疳病者小兒臟腑嬌嫩飽則異傷乳哺飲食一或失常不為疳者鮮矣疳皆因乳食不調并肥元節而作也或嬰幼缺乳粥飯太早耗傷神氣則疳之根生延及歲月五疳病成甚者胸膈喘噓乳食直瀉腫滿下利腹脇脹疼皮癢紫瘡肌肉光紫與夫疳勞渴瀉面顴色天骨露齒張腹

硬不食者皆危篤矣凡此等類虛偏復生難施其巧

○子熱

炒芍藥

香附

滑石一兩甘草

三錢黃連二錢

石作四服水一盞半生姜三片煎乳母服

○風痰

南星

一兩切用白礬末半兩水泡一搗厚浸晒乾研細入

白附子

二兩

右為末飛白麪糊丸如芡實大每服一二十九姜蜜薄荷湯

化下

白附丸

牛膽南星二兩須用黃枯牛膽臘月粉南星親手修合風乾隔

一年用牛膽須入二三枚者佳

大陳半夏半兩

粉白南星二兩切作片用臘月雪水浸七日去水晒乾枯白蘇各二兩半

右為末蜜蒸餅丸如桐子大用姜汁蜜湯送下有熱加薄荷葉
紫金丸 治小兒哮喘不止端午日修合

黑椒 四十粒浸透去皮研如泥次入人言一匙鵝管石一匙

右為末丸如黍米大朱砂為衣每一丸或二丸量兒大小空心
苓桑清下當日忌生冷葷腥執物服藥病止後更服白附
丸三五貼

○小兒腹痛多是飲所傷

白朮 陳皮 青皮 山查 伸躑炒

砂仁 麥蘖 甘草

受寒痛者加藿香吳茱萸更有挾加黃芩

○小兒腹脹

蘿蔔子蒸紫蘇

乾葛

陳皮等分甘草減半

食減者加白朮煎服

小兒好喫粽成腹脹疼用白酒麴末同黃連末為丸服之愈

又方 治小兒腹脹

茯苓皮 陳皮

赤小豆

蘿蔔子炒木通各半

木香二分甘草些少

石咬咀姜一片煎服

○小兒吐瀉黃疸

三稜

義術

青皮

陳皮

神麴炒

扶苓

麥蘗

黃連

甘草

白朮

右為末調服

傷乳食吐瀉加山查

時氣吐瀉加滑石

發熱加薄荷

○夏月小兒吐瀉用益元散錢氏五補五瀉之藥俱可用吐

瀉腹痛吐乳調脾以平胃散入熟蜜加蘇合香丸名方安膏

用米湯化下

○夏月熱病六一散最妙

○小兒痢疾

黃連

黃芩

陳皮

甘草

右以水煎服

赤痢加紅花桃仁

白痢加滑石末

又方 治小兒食積痢

炒神曲

蒼朮

滑石

白芍

黃芩

白朮

甘草炙

陳皮

石咬咀水煎下保和丸 一方加茯苓

○治小兒赤痢壯熱用藍青搗汁每服五分與之妙

○小兒黑斑紅斑瘡痒癰疹並宜用防風通聖散為末調服

○小兒口糜

戴云謂滿口生瘡者便是

江茶

粉草

右為末敷之 一方用黃丹

又方

苦參

黃芩

五倍子

青黛

右等分為末敷之

又方

青黛

芒硝

右為末敷口中

又方

黃栢

細辛

青瑤

右等分為末噙之吐出涎不過三日愈亦治大人治胎毒

以瘡五倍子黃丹其草江茶芒硝等分為末敷之

龜胸

蒼木

酒栢

酒芍藥 陳皮

防風

威靈仙

山查

當歸

痢後加生芩

○小兒夜啼此是邪熱乘心

黃連姜汁炒一升半甘草

右用竹葉二十片煎服 又方加人參二錢半作二服入姜

一片煎

又法夜啼不止潛取捕雞窠草一握置小兒身下

○小兒脫肛

戴云脫肛者大腸脫下之說

○脫囊即外腎腫大

戴云脫囊者陰囊腫大墜下不收上之說 或云潰爛陰丸

脫出

入方

木通

甘草

黃連

當歸

黃芩

右以水煎服

又方

治脫胆

用東北方陳壁土泡湯先熏後洗

又方

治脫囊

紫蘇葉為末乾傳如爛用杏油調鵝翎刷 又用青荷

葉包上

○小兒木舌

戴云木舌者舌腫硬不和軟也又重舌者亦是此類二者皆是熱病

入方

百草霜 芒硝

右為末酒調傳之

重舌用好膽礬研細傳之

○咯血

戴云咯紅者即唾內有血非吐血與咳血

入方

黑豆

甘草

陳皮

右煎服

○小兒尿血

甘草湯調益元散加升麻煎服尤妙

○小兒喫泥胃氣熱故也

入方

軟石膏 黃芩

陳皮

茯苓

白朮

并草

右用水煎服

又方

膩粉一錢砂糖和丸如麻子大米飲下一丸瀉出立瘥
○小兒解顱乃是母氣虛熱多耳

戴云即初生小兒頭二骨未合而開者

入方

四君子與四物子母皆可服

有熱加酒炒黃芩連生并

生薑草煎館外用帛束緊用白欬末傳之

○小兒吐蛇虫

以苦練根為君佐以二陳湯煎服

小兒冬月吐蛇多是胃寒胃虛所致錢氏白朮散加丁香二粒
錢氏白朮散

藿香

白朮

木香

白茯苓

甘草

人參各一錢乾薑一錢

石為末每一錢至二錢水煎服

○小兒口噤

治法用搐鼻

鬱金

藜蘆

瓜蒂