

傷寒舌鑑



自序 嘗讀仲景書止言舌白胎滑並無黃黑刺裂至金鏡錄始集三十六圖逮後觀舌心法廣至一百三十有七何後世誕變之多若此宜知傷寒自表傳裏舌胎必由白滑而變他色不似伏邪瘟疫等熱毒自內連外之一病便見黃黑諸胎也觀仲景論中一見舌白胎滑即言難治安有失治而致變者乎所以仲景止言白胎已見一斑不煩瑣屑後人無志先聖治未病之說不得不反覆辨論以啟蒙昧蓋邪氣入裏其虛實寒熱之機必現於舌非若脈法之陰而不顯也况陰盛格陽與邪熱鬱伏多有假證假脈惟驗舌上胎色之滑燥厚薄昭若水鑑無所遁形由是取觀舌心法正其錯誤削其繁蕪汰其無預於傷寒者而奉入家出人治按所紀及己所親歷共得一百二十圖命曰傷寒舌鑑投之剗剗以公同志臨證之一助云

康熙戊申年秋月誕先張登書於雋永堂

傷寒舌鑑目錄

白胎舌二十九圖

黃胎舌一十七圖

黑胎舌一十四圖

灰色舌一十一圖

紅色舌二十六圖

紫色舌一十二圖

微醬色胎舌三圖

藍色胎紋舌二圖

妊娠傷寒舌六圖

傷寒古鑑

長洲張登誕先業纂

白胎古總論

傷寒邪在皮毛。初則舌有白沫。次則白涎。白滑。再次白屑。白泡。有古中舌尖舌根之不同。是寒邪入經之微甚也。舌乃心之苗。心屬南方火。當赤色。今反見白色者。是大不能制金也。初則寒鬱皮膚。毛竅不得疏通。熱氣不得外泄。故惡寒發熱。在太陽經則頭痛。身熱。項背強。腰脊疼等症。傳至陽明經。則有白屑滿舌。雖症有煩躁。如脈浮緊者。猶當汗之。在少陽經者。則白胎白滑。用小柴胡湯和之。胃虛者。理中湯溫之。如白色少變黃者。大柴胡大小承氣分輕重下之。白舌亦有死症。不可忽視也。

微白滑胎古



薄白滑胎古




寒邪初入太陽。頭疼。身熱。惡寒。舌色微白。有津。香蘇散羌活湯之類發散之。

此太陽裏症舌也。二三日未曾汗。故邪入丹田。漸深。急宜汗之。或太陽與少陽合病。有此舌者。柴胡桂枝湯主之。

病三四日。其邪只在太陽。故胎純白而厚。却不乾躁。其證頭疼發熱。脈浮而緊。解表自愈。

古胎滑白厚



古心黃胎白



此太陽經初傳陽明府病古也。若微黃而潤。宜再汗。待胎燥裏証具。則下之。若煩躁嘔吐。大柴胡湯加減。亦有下疫黃水沫無稀冀者。大承氣湯下之。

古胎白厚乾



病四五日未經發汗。邪熱漸深。少有微渴。過飲生冷。停積胸中。營熱胃冷。故令發熱煩躁。四肢厥冷。而胎白乾厚。滿口白屑。宜四逆散加乾姜。

古邊黃胎白



古中見白胎。外有微黃者。必作泄。宜用解毒湯。惡寒者五苓散。




古心黑胎白乾




此陽明府兼太陽舌。其胎邊白中心乾黑者。因汗不徹。傳至陽明所致。必微汗出。不惡寒。脈沉者。可下之。如二三日未曾汗。有此舌必死。

古乾刺黑滿胎白




白胎中生滿乾黑芒刺。乃少陽之裏證也。其證不惡寒反惡熱者。大柴胡加芒硝急下之。然亦危證也。

古刺灰尖胎滑白




此陽明府兼少陽舌也。三四日自利。脈長者生。弦數者死。如有宿食。用大承氣下之。十可全五。

古心黑胎滑白




白胎中黑。為表邪入裏之候。大熱譫語。承氣等下之。倘食復而發熱。或利不止者。難治。

半邊白滑舌



白胎見於一邊無論左右皆屬半表半裡
宜小柴胡湯左加葛根右加茯苓有欬
引脇下痛而見此舌胎者用青龍湯夏月
多汗自利人參白虎湯

白胎黑斑舌




白胎中有黑小斑點亂生者乃水來尅火
如無惡候以涼膈散承氣湯下之十中可
救一二

藏結白滑舌



或左或右半邊白胎半邊或黑或老黃者寒邪
結在藏也黃連湯加附子結在咽者不能言
宜生脈散合四逆湯可救十中一二

白胎燥裂舌



傷寒胸中有寒丹田有熱所以白胎因過汗傷
營舌上無津所以燥裂內無寔熱故不黃黑宜
小柴胡加芒硝微利之

白胎黑根舌



舌胎白而根黑。火被尅水之象。雖下亦難見功也。

白胎雙黃舌




此陽明裏證舌也。黃乃土之色。因邪熱上攻。致令舌有雙黃。如脈長惡熱。轉矢氣煩躁者。大柴胡調胃承氣下之。

白尖黃根舌




邪雖入裏。而尖白未黃。不可用承氣。宜大柴胡湯加減。下後無他證。安卧神清。可生。倘再有變證。多凶。

白胎雙黑舌




白胎中見黑色兩條。乃太陽少陽之邪入於胃。因土氣衰絕。故手足厥冷。胸中結痛也。理中湯瀉心湯選用。如邪結在舌根。咽噤而不能言者。死證也。

古色灰雙胎白




此夾冷食舌也七八日後見此舌而有津者可治。理中四逆選用。無津者不治。如乾厚見裏證。則下之。得湯後灰色去者安。

古紅尖胎白




滿舌白滑而尖却鮮紅者。乃熱邪內盛而復感客寒入少陽經也。小柴胡湯加減。

古根黑紅中尖白



舌尖白而根灰黑。少陽邪熱傳厥陰而傷冷飲也。如水停津液固結而渴者。五苓散。自汗而渴者。白虎湯。下利而渴者。解毒湯。如黑根多白尖少。中不甚紅者。難治。

古紅中胎白



此太陽初傳經之舌也。無汗者發汗。有汗者解肌。亦有少陽經者。小柴胡湯加減。




古黃變胎白




少陽證罷。初見陽明裏證。故胎變黃色。兼
天氣者。大柴胡湯下之。

古黃根灰尖胎白




此太陽併濕熱於陽明也。如根黃色潤。目
黃小便黃者。茵陳蒿湯加減。

古根紅尖白



古尖胎白。邪在半表半裏也。其證寒熱耳聾口
苦脇痛脈弦。小柴胡湯和解之。

古黑俱根尖胎白



古根尖俱黑而中白。乃金水太過火土氣絕於
內。雖無凶證亦必死也。

舌白熱

純熟白

白胎老極。如煎熟相似者。心氣絕而肺色乘於土也。始因食瓜果冰水等物。陽氣不得發越所致。為必死候。用枳實理中。間有生者。

舌粉積如胎白

胎如粉粉

此舌乃瘟疫初犯募原也。達原飲。見三陽表證。隨經加柴胡葛根羌活。見裏證加大黃。

舌明透白淡

透明

年老胃弱。雖有宿寒。不能變熱。或多服湯藥。傷其胃氣。所以淡白透明。似胎非胎也。宜補中益氣加減治之。



南京

大學圖書館

黃胎舌總論

黃胎者裏證也。傷寒初病無此舌。傳至少陽經亦無此舌。直至陽明府寔。胃中火盛。火乘土位。故有此胎。當分輕重瀉之。初則微黃。次則深黃。有滑甚則乾黃焦黃也。其證有大熱大渴便秘。譫語痞結。自利或因失汗發黃。或畜血如狂。皆濕熱火盛。小便不利所致。若目白如金。身黃如橘。宜茵陳蒿湯五苓散。梔子蘗皮湯等。如畜血在上焦。犀角地黃湯。中焦。桃仁承氣湯。下焦。代抵當湯。凡血證見血則愈。切不可與冷水飲之。必死。大抵舌黃證雖重。若脈長者。中土有氣也。下之則安。如脈弦下利。舌胎黃中有黑色者。皆危證也。

古乾微黃純



古胎黃微



舌見黃胎。胃熱之極。土色見於舌端也。急宜調胃承氣下之。遲則恐黃老變黑。為惡候。


舌微黃而不甚燥者。表邪失汗而初傳裏也。用大柴胡湯。若身目俱黃者。茵陳蒿湯。

古黃乾




古見乾黃裏熱已極急下勿緩下後脈靜身涼者生反大熱而喘脈躁者死

古斑黑胎黃



黃胎中亂生黑斑者其證必大渴譫語身無斑者大承氣下之如脈濇譫語循衣摸牀身黃斑黑者俱不治下出稀黑糞者死

古滑黑胎黃



古黃而有黑滑者陽明裏證具也雖不乾燥亦當下之下後身涼脈靜者生大熱脈躁者死

古尖通黑中胎黃



黃胎從中至尖通黑者乃火土燥而熱毒最深也兩感傷寒必死惡寒甚者亦死如不惡寒口燥咽乾而下利臭水者可用調胃承氣湯下之十中可救四五口乾齒燥形脫者不治

古瓣隔黃老




舌乾黃濇而有隔瓣者。乃邪熱入胃。毒結已深。煩躁而渴者。大承氣湯發黃者。茵陳蒿湯。少腹痛者。有瘀血也。抵當湯。結胸大陷胸湯。

古根灰胎黃



舌根灰色而尖黃。雖比黑根少輕。如再過一二日。亦黑也。難治。無煩躁直視。脈沉而有力者。大柴胡加減治之。

舌尖黃



舌尖胎黃。熱邪初傳胃府也。當用調胃承氣湯。如脈浮惡寒。表證未盡。大柴胡兩解之。

古根紅尖黃



根紅而尖黃者。乃濕熱乘火位也。瘟熱初病。多有此舌。涼膈解毒等藥消息治之。

古根黑尖黃




古黑根多而黃尖少者。雖無惡證。惡脈誠恐暴變一時。以胃氣竭絕故耳。

古滿脹大黃



古黃而脹大者。乃陽明胃經濕熱也。證必身黃便秘煩躁。茵陳蒿湯如大便秘利而發黃者。五苓散加茵陳梔子黃連等治之。

古刺黑胎黃



古胎老黃極而中有黑刺者。皆由朱汗所致。邪毒內陷已深。急用調胃承氣下之。十中可保一二。

古根白尖黃




古根白尖黃。其色倒見。必是少陽經傳陽明府病。若陽明證多者。大柴胡湯。少陽證多者。小柴胡湯。如譫語煩躁者。調胃承氣湯。

古尖白根黃



舌尖白根黃。乃表邪少而裏邪多也。天水散涼膈散合用。如陽明無汗。小便不利。心中懊懣者。必發黃。茵陳蒿湯。

古縮短尖白根黃



舌見根黃尖白而短硬。不燥不滑。但不能伸出。證多譫妄煩亂。此痰挾宿食占據中宮也。大承氣加薑半主之。

古尖灰根黃



舌乃火位。今見根黃尖灰。是土來侮火也。不利。心煩而渴者。乃胃中有鬱熱也。調胃承氣加黃連。



黑胎古總論


傷寒五七日。古見黑胎。最為危候。表證皆無。此古如雨感一二日間見之。必死。若白胎上漸漸中心黑者。是傷寒邪熱傳裏之候。紅舌上漸漸黑者。乃瘟疫傳變。壞證將至也。蓋舌色本赤。今見黑者。乃水來尅火。水極似火。火過炭黑之理。然有純黑。有黑暈。有刺。有隔瓣。有瓣底。紅瓣底黑者。大抵尖黑猶輕。根黑最重。如全黑者。總使神丹亦難救療也。

古黑純



遍舌黑胎。是火極似水。藏氣已絕。脈必代結。一二日中必死。切勿用藥。

古黑底瓣胎黑




古紅底瓣胎黑




黃胎久而變黑。寔熱亢極之候。又未經服藥。肆意飲食。而見脈伏。目閉口開。獨語譫妄。醫遇此證。必掘開舌胎。視瓣底紅者。可用大承氣下之。

古紅底刺黑滿



凡見辦底黑者。不可用藥。雖無惡候。脉亦暴絕。必死不治。

古黑底刺




刺底黑者。言刮去芒刺。底下肉色俱黑也。凡見此舌。不必辨其何經何脉。雖無惡候。必死勿治。

古胎滑白邊黑中



滿舌黑胎。乾燥而生大刺。揉之觸手而响。掘開刺底紅色者。心神尚在。雖火過極。下之可生。有肥盛多濕熱人。感冒發熱。痞脹悶亂。一見此舌。急用大陷胸丸攻下。後與小陷胸湯調理。

古嚙自爛黑



舌黑爛而頻欲嚙。必爛至根而死。雖無惡候。怪脉切勿用藥。

古滑黑中邊紅

