

四

西藥略釋

卷四



平脈平腦論

凡脈頻數及腦不安，均能致痛。此平脈平腦之劑所由設也。顧脈之數有數端：一因身熱而致，一因心之下左房肉生厚，及其房門有壞而致，一因心房生大，而令房外之肉軟薄而致，一因血流過多而致，一因久病血薄而致。是皆能令脈急促，而貴有以平之也。惟欲平其脈，須先療其症。症既治，而脈乃可平也。大抵平脈之藥亦多，而要以毛地黃、匪罈稔二藥爲最。此則不論有症無症，而胥能平脈也。乃有時平脈之劑，亦能平腦，而平腦之劑，亦能平脈。是豈必區區致辨哉？惟二者雖頗相通，而或則平脈之功居多，或則平腦之功居多。

故聊分其類耳。若夫平腦之藥亦不一，如草烏頭與白匪鎔稔，則能治身中骨痛及腦筋痛也。如謙落，則能療胃不消化及大小腸久失功用也。如菸葉與路卑利，則能令沉悶昏倦及肉筋無力，而用以續骨，鉸等症也。是知平腦之藥實與平脈之藥同重，而缺一不可矣。至於並行不悖，而脈與腦均能平者，則惟輕炭淡酸及雪水二物，而始有此妙用也已。

謙落

西名高尼亞

此樹產歐洲美國等處高三
尺其臭恍若麝香

采葉及果核入藥用

覈取

葉與果核內皆函有精液可用

法取出

形色

其精液能過光而比水還輕色黃似油

氣味

味辣臭似菸葉

功用

平腦脊髓及自和腦根並可止痛

服法

若以葉研末作散每次宜服

五釐

用作藥膏每次宜

服

三釐

外治

皮膚各症宜以此膏調水搽之

論訂

惟性甚酷毒而且所製之藥其功力或輕或重殊不足

靠故醫家鮮用

洋茉莉 又名遮司咪

藤本蔓生，沿高樹旁過別枝，產美國南邊，春月

開黃花，瓣長寸許，氣甚香，採根入藥用，又可作藥酒。

功用 平脊髓，及自和腦根，減少心之發力，故能止腦筋作痛。

主治 乾咳過甚，不拘老幼服之見效。婦人行經，覺身體不

安者，服之甚效。

亞匿加 產歐洲，亞細亞洲北邊，樹約高八九寸，采花及根入

藥用 **形色** 根約長二寸，厚不及一分，外皮深棕色，內層白

色，中心黃色，氣味

功用 平腦脊髓，平心脈。

相反 輕淡水，火酒，鴉片酒，樟腦。



相佐

藜蘆 毛地黃 草烏頭

方劑

一方 大熱症熱盛時可滅心脈之數疾

亞匿加根

二錢粗末

清水

九安士

煎至賸六安士爲度

每服一酒杯每兩點鐘一服

又藥酒方

亞匿加根

八錢粗末

火酒

二十安士

浸兩日隔淨隔時

加些火酒得回二十安士爲度每服一錢至二錢

主治

主治大熱症退熱未盡時日久身弱服之甚效 每服

五滴和水飲之每

三四點鐘

一服

顛狂將作心內煩躁異

常服此甚效

飲酒醉甚狂妄不知兇險者服之亦效

風溼症日久不愈者服之可愈 走風腳亦可治 凡跌

撲打傷骨痛，外皮未損破者，用此藥酒搓之，甚效。西國以此爲治風溼跌打通行之方也。

帶微搭連

此藥以各等花，加魚肝油，或加牲畜骨油，或加雀

屎，或加浸鹹魚之水，蒸製而成。

形色

清稀無色，有輕淡在內，其氣能焚。

氣味

臭似鹹魚

水

溶化

水能化，火酒亦能化。

功用

平腦，平脈，能減少心脈之發力，故能令身熱略減。

主治

風溼骨鉸腫痛。

服法

每服四滴至八滴，以水和化。

配合

此水合綠氣可成鹽類，名綠氣鹽，每服三點鐘

一服。

乍波蘭吻

出產製法氣味功用俱詳卷

發表門內茲再列

入平脊髓門內以便臨症查閱云

加喇巴豆

加喇巴在亞非利加之西而此豆產於其地故因

以命名也其莢長約一寸內函豆三粒每粒長約八分潤約五

分

考訂用以作藥其性甚毒

辨謬

彼土人嘗以此試驗淑慝謂服之立斃者即為罪人服

而不死者乃非罪人蓋謬論也而實因其性酷毒過服則

必傷生耳

功用

平腦平脈療眼症用以縮小瞳人

服法

研末每服一釐半若作藥膏每一釐宜調水分作十服

外治

眼科用以外塗或將膏開水滴入眼內均能令眸子縮

小此與了刀邊能令眸子散大者實相反也

其療眼之法何多或附紙或用樹膠作薄片預蘸藥

水俟乾貼入瞳裏亦如其法詳上了刀邊篇

凡服了刀邊及顛茄過多又宜用此藥解之

亞司連

即加喇巴豆之精 功助主治皆同不復再述

菸葉

原產美國後各國均有植焉此葉內函有液用法取出

西國呼為尼哥顛者即此物也

形色

其液無色過光露天氣則漸變黃

氣味

味甚辣性

甚毒

考覈

大約乾葉每百分多則能提出該液六分或八分少則

能提出三分或二分 此物若與酸品相合則可製成鹽類

溶化

伊打火酒能化而水與油亦能化

功用

頗能平腦平脈

主治

猝然抽搐牙關緊閉

此症西醫鐵子利士

即燃此葉用法令煙納入囊

門

但此法壯者宜之弱者易用誠以此法甚險未可妄用也

一法以葉泡水用水節射入大腸或將

所泡之水外敷亦妙此則能令肉筋寬鬆也氣喘令吸

其煙亦可略止服士的尼過多者服此可解之

方劑

作藥水方

乾菸葉

三分半

沸水

十八安士量

浸一點鐘濾淨彼大便秘

澀者宜以此水用法射入肛門但須先射一半如歷半點

鐘不驗則再將一半射入可也

善以葉泡水射入肛門嘗有用至五分而未能傷人者故凡用此法療治只宜用葉三分半或三分便定

藥酒方

乾菸葉 八錢

車釐酒 十六安
士量

浸七日濾淨每服十滴

至三十滴

論列

此物氣芳通腦生津故世俗取其葉而製爲各色菸品
迄今各國靡不尙焉抑知燃其葉而吸其烟實多貽害試
觀蝕斯葉者除菸蟲外更無別物是可知其酷毒矣大
抵初吸其煙雖些少亦覺悶若吸過多則頭昏面白脈沉
身軟手足覺冷呼吸覺慢或作嘔或發顫甚至或有昏迷
欲絕之狀其在吸食已慣者將必於應頻作然或間斷
略久頓覺頭腦不安迨吸煙既久則菸癮彌深將見病

端迭起，輕則恒覺胃不化而心不安，重則令目之腦筋變壞而間或失明，此蓋因菸毒由潮入腦而日積月累，故不免壞人也。

路卑利

出處形色功力製用俱詳上文吐藥篇內，茲特再列

入平腦門，以便查閱。

輕炭淡酸

即西名械度
從恩匿醇

製法

用鈹鐵炭淡加入礮強水及清水，甄

製而成

是膏考桃李三樹其葉與仁
均固有此藥膏者亦宜知也

又法

用銀炭淡

八分

輕綠酸六分

九

雨水

一安
士量

同入黑罇和勻

緣此藥水不能見光故用黑
罇存貯或用黑紙封密亦可

此藥水之淡

者也，用以療症甚合。

善療症宜淡不宜濃，若實因藥性酷毒故也，
大約此水每一百分而該藥只值二分而已。

功用

平脈止痛

主治

筋抽

服法

每服三滴，日服三

次加水調服

但此藥水毒極並不能久貯故醫家鮮用

鉄炭淡

西名西泥

製法

用鉄鐵炭淡及鉄炭養和勻入鍋燂熔將

見上浮者即鉄炭淡而下墜者即鉄養也由是取出鉄炭淡而棄去鉄養俟冷凝爲實物貯入玻樽

形色

其色白儼如磁塊

氣味

其臭恍若桃仁

彼映相家恆用此藥

功用

功同輕炭淡酸

服法

每一釐宜分五服

方劑

一方 外治頭扁

鉄炭淡

三釐或五釐

清水

一安士量

調化布蘸此水敷之甚效

他如破銀淡養藥黑其積即以此水滌之可除

惟藥性毒甚若以三釐飼犬則立斃醫者宜

慎用也

亞咪咧淡養

製法

亞咪力火酒一份

淡養酸一份

同

入一大玻璃樽，略燂熱，然後甑之，用法收取，再行製淨，乃可用。

形色

色淡黃，恍同伊打酒，或云略似油能飛。

氣味

別具一種氣息

溶化

水不能化，火酒能化。

功用

專屬脈管，故行血氣，能令心跳速逾平時，而在脈管之

腦筋，反令力緩，故云平腦，即平脈管內之腦筋也。

用法

凡療症，每用兩滴至五滴，洒在手巾內，鼻吸其氣，乃可。

此物毒甚，切勿多用。

主治

羊疳症，將起時，以此藥聞之，可止。婦人頭痛，面色變

白者，聞三滴即止。氣喘症，因腦部不安者，鎖喉症，及

抽筋者，心痛垂危，以致肺部悽苦難堪者，聞之均止。但初聞之際，病人面色通紅，有覺危險者，有不覺者，但總宜小心愼用，逐少試之，庶獲萬全之效。

草烏頭

中國西國皆有，該樹高尺六至五尺，而根則頭大而

末削，及多橫蘗，長約

三四寸

根色外棕內白，入藥則取其根與葉

用，但根之功力比葉尤峻，故釀作藥酒者，或根或葉，亦須聲明。

考訂

查時珍本草言烏頭辛溫大毒，各方主治大風頑痺，風

溼癰癩，頭風等症，而不知其有平腦之功也。西醫用化學

覈明，內函蛤利之味，即草烏頭之霜，西名厄哥匿顛者是

也。

質類鴉片之麻啡，惟不易製耳。

辨別

其在鮮葉，味苦而辛，嗅之令人欲睡，若以葉含數刻，其喉舌始則刺而木，繼則腫而熱，其在乾葉則服後略久而始有此徵，惟葉既陳則不堪用也。根作泥氣，人口則先覺甜而後覺苦辣，此藥自古原入毒品，人所鮮服而用作服劑者，僅百年耳。

服驗

以根少許入口，即能發涎，唇舌間覺有針刺，服後則能平腦，而令遍體腦筋麻木不寧，四肢如觸叢針，肉筋亦隨減力，若服稍多，則必致渙而無力，眼簾收縮，又其甚者，或服至壞人之分，而則尤覺喉刺熱，腹痛甚，作渴作吐，作瀉，通身麻木，而愈形軟弱，惟終不至昏蒙抽搐耳。火酒浸

之能提出其功力故尋常用者多以此所浸之酒入藥

內服藥酒方

草烏根

一兩四錢
研粗末

淡火酒

二十安
士量

先將火

酒十五安士浸此根末兩日隨用一漏斗插入罇口即將

該酒連藥倒在漏斗令其流進罇內其餘火酒尚有五安

士亦用以漂淋至藥滓則仍須揀出餘酒然後濾淨由是

再加入淡火酒以共得二十安士為度此酒酷毒凡內

服者務宜小心每服五滴至十滴每日三服

服法

首

一日每次服五滴第二日每次服六滴嗣後每日每服均

加一滴最多者每次服十滴為率倘服至四肢覺有頑木

即宜暫停待此徵過盡之後方可再服也至若服後而身