

本草綱目

下冊

新安陳嘉謨廷承纂輯

門生 欽邑葉恭
婿胡一貫 乾侍
潭陽後學劉孔敦 若樸 校刊
增補

木部

〔桂〕味甘辛氣大熱浮也陽中之陽也有小毒採皮宜冬至同餌忌生葱收必陰乾勿見天日用旋咀片餘剝瀕密紙重

畏犯風元辛氣泄揚種類多服地產各處〔箇桂〕正圓無骨形類竹生交趾桂林〔牡桂〕區廣薄皮產南海山

谷〔官桂〕品極高而堪克進貢却出觀賓州名屬廣東一說世人以觀字筆畫多懶書之故只作官如寫黃藥作柏薑作姜同意亦通〔木桂〕皮極厚而

向理虛虛乃發從嶺〔箇桂〕因皮嫩如箇卷末〔板桂〕謂皮老若板坦平〔柳桂〕係至軟枝梢〔肉桂〕

指至厚脂肉〔桂枝〕枝梗小條非身幹簾厚之處〔桂心〕近木黃肉但去外甲錯簾皮品分既明欺罔難入

又各主治亦須詳知箇桂筒桂相同一說箇筒字近似人誤書之習以成俗也養精神和顏色耐老牡桂桂板一類堅骨節通血脈墮

胎四者性并辛溫難作風寒正治柳桂桂枝味淡能治上焦頭目垂橫行手臂凋榮血和肌表止煩出汗疎邪散


風經云氣薄則發泄是也肉桂木桂性熱堪療下焦寒冷併秋冬腹疼泄瀉豚利水道溫筋煖臟破血通經云

氣厚則發熱是也桂心美之之義性暑守治多在中官桂實之之醇味甚辛治宜解表如此之異蓋緣本乎天者

親上本乎地者親下理之自然性分所不可移也然柳桂桂枝入足太陽之腑桂心入心在手少經之經本經註

收務向月令建方春採東夏採南秋冬做此纔得節候生氣即止吐衄崩刺重注髮鬚鬚眉為燥濕仙丹係補陰要藥若合黃連煎服小兒蟲痢立痊（白皮）燒灰敷火灼爛瘡長毛髮亦驗（枝節）釀酒主歷節風痺癢痛疥尤靈凡患疥瘡及牛馬畜產有疥並燒敷二三次無不愈

實栢州乾



栢側州密



〔黃蘗皮〕味苦微辛氣寒陰中之陽降也無毒樹高蜀產皮宜夏收擇內黃緊厚為優去外福箴造鏡數先漬蜜水

日際曝乾

糖大邊炙燥惡乾漆治三焦二製則治上焦單製則治中焦不製則治下焦也乃足少陰本藥

又足太陽引經加黃耆湯中使足膝氣力湧出痲癩即差和蒼朮散內即二俾下焦濕熱散行腫脹易退佐澤瀉

利小便赤澁配細辛擦云賴紅瘡一方同青黛研細入水片少許擦之亦効安虛噦就蟲瀉隱伏龍火解消渴除骨蒸補腎強陰洗肝

明目腸風連下血者立効熱痢先見血者殊功去臍腹內濕瘡逐膀胱中結熱女人帶漏亦可治之○〔根〕

名〔擅擅〕如苓結塊療心腹百病主長生神仙不渴不餓安魂安魄

誤按內經云腎苦燥故腎得濕也活人解毒湯用黃蘗黃連黃芩梔子蓋梔子黃芩入肺黃連入心黃蘗入腎
 燥濕所歸各隨其類而然也上下內外通可治之積熱內中誠為要藥至令醫家氣虛用四君子血虛用四物
 有疾用二陳有熱用解毒故常宗述而不易焉

黃蘗



商州黃蘗



「楮實」味甘氣寒與毒近道雖有崇陽屬河獨多為產廢田又名穀實葉類蒲葍作辦實如彈子結蓬初生綠青漸

熟紅赤待深秋採摘浸水以去皮瓢取中子曝乾投酒再浸晝夜務蒸後已至亥任用煎膏為丸陰痿能強水腫
 可退克肌膚助腰膝益氣力補虛勞悅顏色輕身壯筋骨明目「葉」主小兒身熱食下使生肌「皮」煎逐水
 利便浸爛又可作紙「莖」煮淨洗癬瘡之敗「皮開白汁」薦收塗癬更敷蛇咬○「紙」燒存性調酒汁
 亦止血暈血崩剪「有印紙」燒吞街門中有斷婦人產如神効印信之紙

誤 按指有二種名亦不同葉有瓣者曰楮葉無瓣曰楮音殺一說皮斑者楮皮白者楮多生久廢穀田結實味甘

又因名曰穀實也詩云爰有村檀其下維穀是爾即今幽州猶云穀桑荆揚文廣咸謂之楮每逢秋月剝取其皮或織為履穿或搗作紙賣色甚光澤媒利無涯所入醫方惟貴其實赤者頗服不先不飢筋力倍增行及奔馬並載經注決無欺人奈何風補藥中用者稀少惜哉惜哉

楮實



淡竹葉味甘淡氣平寒陰中微陽典毒竹類頗多難指何是惟嘗笋味淡者為然莖竹雷竹水竹味淡兼甜治病

第一筍竹籍竹味皆純淡採用亦宜苦竹紫竹苦辣而種不堪入藥東坡種公云淡竹者對苦竹為文陰苦竹之

外皆淡竹也述此觀之足可徵矣逐上氣款喘促退虛熱煩燥不眠專涼心經尤却風痊一種草類如鐵線草似嫩櫻葉長尺餘亦名淡

竹葉俗多採利小水治喉痺等證並神効一根一止消渴散毒補虛一實一通神明輕身益氣一皮茹一削去青色惟取向裏黃皮主

胃熱飢過疎功瘵噎膈吐或神効 ○ (敗船茹) 原亦竹皮刮下大扁扁用程漏處極多取乾煮之亦止諸血

○ 燒取 (一竹漚) 與荆漚同搗碎截天餘直劈作數塊高磚架起緊火中烘漚後兩頭流出少加薑汁調服 每漚一杯

加生薑 却陰虛發熱理中氣噤牙小兒天吊驚癇入口便定婦人胎產問暈下咽即甦衍義云胎前不損子產

後不得虛止驚悸却痰涎痰在手之四肢非此不達痰在皮裏膜外有此可敗但世俗反以大寒置疑不用殊不

知孫大燉出又佐薑汁有何寒乎 ○ (一竹肉) 狀如肉腐生苦竹枝上鸡彈般大生咬毒多戟人喉類未紅

且令爪甲變黑煩及汁煮鍊三度然後依常蒸食之殺三蟲破老血別有功效人未盡知 ○ (一竹箨) 惟感夏

間收類麻角色白係慈竹道兩涼潤每滴汁着地發生同薑昔煮嗜痢赤白治驗 ○ 節內黃粉即 (天竺黃)

俗云天竺 旋飛塵沙結成去竹筒或可得形類黃土一名竹膏治小兒急慢驚抽瘰肥人辛暴風中鎮心明目解

熱去邪 ○ (一竹笋) 發氣托瘡瘡更止消渴利小便 ○ (一挑竹笋) 苦有毒 懶笋不成竹者 用搗成膏六畜

皮肉生蛆納入盡出及汁煮纔可食不爾亦戟人咳 ○ 更有 (仙人杖) 味鹹是笋成竹時之花色黑如漆收

宜夏初惟苦筍竹多生專主噎氣嘔逆大人翻胃反食以水煮嘗小兒驚癇夜啼安身伴睡痔漏去血燒末湯吞

○ (一舊筍齒) 亦載醫方治活蟲入腹為病狀如癥瘕煮服即除



淡竹葉



〔松脂〕味苦甘氣溫無毒香天下植蒼州土不拘大水中流未澀清松脂便足採取媒利擊多竅可逐貪心練餌延

年待自流易素棹効釋通明成顆分向背陰陽向向日月照者為〔陽脂〕向北日月背者為〔陰脂〕陽脂補陽

陰脂補陰仙經亦云不見日月者皆可取服以人多陰虛欲其專補陰爾製練有方依式無錯水盛釜內氤安水

旁白茅藉氈底兩層黃沙蓋茅上寸許松脂任布桑柴緊炊湯減少旋添脂沉盡方出新箴為掠投冷水沈釜底者勿用

候凝結復灶如前週畢三迴色白如玉研和群藥加白茯苓拍子仁甘菊為丸酒吞逐諸風安五臟除伏熱胃脘解

消渴咽喉輕身通神延年耐老熬膏貼瘡毒長肉作散治齒痛殺蟲〔實〕主少氣虛羸兼改風痺〔花〕維輕

身益氣發熱上焦〔萐〕花底收晒乾研末羅細鷄清鳴彈丸或豆粒暑痢止澀如神〔根白皮〕主辟穀不飢

補虛損勞乏〔節〕性溫燥血中之濕却脚痺軟痿〔葉〕味苦溫能生毛髮搗爛敷風濕瘡効懸挂辟瘧疫氣

靈應節諸風漬酒可服
 一名女蘿詩云蔓莖女蘿施于松上陶云
 萬是寄生當用柔上者女蘿當用松上者
 苦甘無毒煎濃可作吐湯瀉客疾截濕
 瘡利水道改頭風掃頂上瘡癩去頂間瘤癭聖汗堪止噴怒能消

第一卷白松林
 新林巨木

去節中火蘇刺濕心後琳

毛多大約通林者又曰為各縣各


天全新新上竹同計作水而

水巨石月年健者生林木

其

其

其



〔茯苓〕味甘淡氣平屬金降也陽中陰也無毒近道便有雲貴雲南獨佳產深山谷中在括松根底由木被斧斤砍

伐或老遭風雪折摧枝葉不復上并津氣旋向下泄凝結成塊乃名茯苓因其本体相離故取附之之義小如鵝

卵大若瓠瓜猶類龜鼈以形並高沉重結實四五斤塊者愈佳久藏函有無朽蛀初收採須仗陰乾咀片水煎黑皮淨削

研末丸服赤筋盡洵茯苓中有赤筋最損目為丸散久服者研細末入細布袋中以冷水揉方益心脾不損眼目

忌酸物惡白欬仍畏牡蒙地榆雄黃秦芫芎甲種赤白主治略異經上下行走自珠赤茯苓入心脾小腸屬

茯苓

本草綱目卷之四
茯苓味甘平屬金陽也無毒出自松脂所化入土于歲纔成初如挑膠久漸堅硬西戎多產色淡澈光兩群亦
生色深重濁入藥制重濁不計
魚枕造成不可不細詳爾入藥研末用湯調吞利水道通五淋定魂魄安五臟破癥結乘血殺鬼魅精邪止血生
肌明目摩腎治產後血暈及兒枕痛癩延癩金瘡併胃脘痛○又種一瑩者名異產同狀似玄玉而輕質亦
松脂化出歷二千載方得成形安神補心益佳生肌破血尤善不堪造器見風即潤小兒帶之謂能辟惡
用之及致燥急之患不可不謹別祝又云茯苓琥珀皆自松出而所稟各異茯苓生成俱陰琥珀生於陽而成
於陰故皆治榮而安心利水其効同也



〔琥珀〕味甘氣平屬金陽也無毒出自松脂所化入土于歲纔成初如挑膠久漸堅硬西戎多產色淡澈光兩群亦

生色深重濁入藥制重濁不計
手摩熱可拾草芥湯煮軟儼若錫糖遇物即粘如是方妙今市家多煮鷄彈及青

魚枕造成不可不細詳爾入藥研末用湯調吞利水道通五淋定魂魄安五臟破癥結乘血殺鬼魅精邪止血生

肌明目摩腎治產後血暈及兒枕痛癩延癩金瘡併胃脘痛○又種一瑩者名異產同狀似玄玉而輕質亦

松脂化出歷二千載方得成形安神補心益佳生肌破血尤善不堪造器見風即潤小兒帶之謂能辟惡


用之及致燥急之患不可不謹別祝又云茯苓琥珀皆自松出而所稟各異茯苓生成俱陰琥珀生於陽而成

於陰故皆治榮而安心利水其効同也

〔墨〕味辛無毒擇係松煙造成摩入藥劑主治煙細繞効煙簾不靈其桐油煙石油煙併菓草及偽為者俱不可以治病也止血果捷因黑勝紅故天行熱毒鼻衄下血敷汁水摩滴入若產後血暈胸中卒暴來紅摩醋服之遊絲纏眼中摩鷄血速點客忤中腹內摩地漿頓吞下死胎而逐胎衣合金瘡以生膚肉
 〔槐實〕味苦辛鹹氣寒無毒析枝插地即活人家多植門庭實生莢中十月收採粒大如豆色紫而堅一莢兩粒三粒者為良若係單粒五粒者勿用小銅錘擊碎烏牛乳浸宵蒸過纒煎景天為使主五內邪熱去五痔腫疼七月取搗絞汁貯銅器內置高處曝二十日以上煎稠硬圓如鼠糞大納穀道內三易之乃愈止涎唾補絕傷涼大腸消乳痲陰男子陰瘡濕瘡不歇却女人產戶痛癢難當仍理火瘡且墮胎孕酒吞七粒催產尤良〔嫩房莢〕收煎代茶去頭風明目補腦〔老莢〕疎導風熱亦可取搗煎膏〔白皮〕煮酒治風皮膚不仁服効消陰疝卵腫却壯熱驚癇〔莖葉〕功同忌治瘡毒熱膏貼癰疽潰爛煮汁漱口齒風疔〔根〕作神燭可燒仍主喉痺寒熱〔枝〕洗瘡住瘡蝦指齒殺蟲〔花〕味甚苦炒黃亦涼大腸去熱理腸風瀉血及皮膚風止痔瘡未紅併赤白痢去胃脘卒痛殺腹臟蛔蛇〔膠〕主諸風化涎任作湯散丸服却風痺肢難舉動散風毒身如蟲行噤口急風珠功破腦傷風立効〔槐耳〕係菌亦樹所生堅如桑耳者良用作細末酒服去婦人陰中瘡痛治痔瘡殺道血流



槐實



〔枳實〕味苦酸氣寒味薄氣厚陰也陰中微陽與薑商州

屬河

所生似檣極小擇如鵝眼色黑陳者良

近道亦生一種俗呼臭橘

其皮微綠不堪藥用今市家每標指為綠衣者欺世媒利無益有損故凡入藥則必求黑色為真也

剉淨內瓢剉片麩炒用本與枳殼一物因收遠近異名枳實秋

收枳殼冬採今醫者不以此泥惟視皮厚小者為實完大者為殼也殼大則性詳而緩治高者主氣治在胸膈

實小則性酷而速治下者主血治在心腹故胸中痞肺氣結也有枯梗枳殼湯之通心下痞脾血積也有白朮

枳實湯之用白朮補脾枳實去脾經積血脾無積血則不痞也

此高下緩急之分易老詳定以為準的也除脹滿消宿食削堅積化痼疾

破氣佐牛大黃芒硝益氣佐人參乾薑白朮仲景加承氣湯內取疏通破結之功丹溪入瀉疾藥中有倒壁衝

墻之枝〔樹皮〕治風中身直久不能屈伸〔根皮〕主痔瘻朱紅及腸風臟毒〔樹莖〕併〔皮〕收採水脹

風痛齋破○其大枳殼亦貴陳年取翻肚如益口唇製剉剉片麩炒瀉肺臟寬大腸結氣胸中兩脇靈脈者

急服發疹肌表遍身苦瘞者宜加逐水飲傳函關節並利破痰癖積聚宿食亦推同甘草瘦胎即批殺散和黃連滅痔

即連板九能損至高之氣不恒接逆服多靈怯勞傷

第七卷青橘皮款後誤按直系看



女貞實

即冬青
樹子

味苦甘氣平無毒鄉落幽居多植遮覆能欺霜雪又名冬青黑實遇冬至採收皮及將布袋接淨

酒浸一宿日曝待乾研末為丸用旱蓮草熬膏合妙搗碎漬酒同生地黃投罐煮良黑髮黑鬚強筋強力安五臟

補中氣除百病養精神多服補血去風久服健身不老一樹皮一涼而無毒若漬酒每日飲亦益肌膚一枝葉

煎可染緋又燒以面膏塗能治瘡疥一木一白紋細函拔堪為○一蟲白蠟一附樹枝結成條小蟲食樹汁化

者蟲類蠟有白有黑每食冬青樹汁久而化為白脂蠟則成蠟人謂蟲屎看樹而然非也亦有不愛蠟者則結
苞枝上切如黍米漸圓大青紫宛若樹之結實土人呼為蠟種末年春深則苞拚而蟲出延樹矣欲廣蓄者候

芭將折時過枝採繫他
樹其蟲亦應候而出
這玃刮取以水煮
焙濾置冷露之中
或濾冷水內
但去渣滓淨為美
自然凝聚成塊
文理瑩澈不吞石

膏本經厚脫漏未善丹溪始珍重
纔用膏與戴原禮
簡云白蠟者靈氣收斂
堅凝誠為外科要藥
生肌止血定痛

接骨續筋補靈與合歡皮同煎入長肉膏神効
但未試可服否
其合歡皮服之驗矣
蠟有二種
蜜白蠟人可服
餌

否一旬乃知言此蠟也故採之以補脫漏
（百蠟座）取能治瘡毒
本經石蜜款內曾已載詳其

女貞實



（抹）
練（音）
（實）
即金鈴子
味苦氣寒有小毒
蛟龍極畏堤岸多栽在處有之
川蜀獨勝木高丈餘
略大葉密如槐稍長花


紅紫甚香實青黃類
彈待冬收採向日曝乾
取肉堪煎去皮去核
一說將核搗碎漿水煮
一伏時液晒收藏亦堪

入藥大抵用核莫用肉
用肉莫用核此常理也
主中濕傷寒大熱煩狂
理勝脫小腸疝氣
疝痛利小便水道殺三

蟲疥癩（根）性微寒
雌雄兩種根赤與子
大毒忌煎雌根白子
多微毒宜採擇向東者
纔入藥靈略刮外青

只由裏白單味煎酒大能追蟲宜月前忌月後月半前蟲頭向上月半後蟲頭向下先啖鳴彈餅引蟲口開頓飲濃藥湯過盡即利
 多則成團追下少則逐條推來積聚行疼痛止亦堪研細末敷作癩蟲瘡○又石茱萸一即元落子外科亦
 用醫者當知

棟實



挺核一味甘氣溫微寒無毒生函谷及巴西河東類烏豆但略圓而扁外有紋理六月採收碎核殼取仁去皮去研
 爛輔佐良藥專治眼科消上下胞風腫爛弦除左右皆熱障努肉退火止淚益水生光一挺子一咳之亦止鼻衄

本草綱目卷之四十五 木部 棟實 棟實一名棟子 生函谷及巴西河東 類烏豆但略圓而扁 外有紋理 六月採收 碎核殼取仁 去皮去研爛 輔佐良藥 專治眼科 消上下胞 風腫爛弦 除左右 皆熱障 努肉退 火止淚 益水生 光一挺子 一咳之 亦止鼻 衄