

兒科撮要

下卷

何嘉煦圖



何嘉煦圖書



兒科撮要卷二目錄

第八冊

論性質類病

瘰癧

腸吸核癰

嬰花柳毒

第九冊

論脾與血之病

青蓮症

性流血症

血薄症

第十冊

論腦筋部之病

腦膜炎

啞吡啉腦膜炎

腦積水新症

胎生腦積水症

腦瘤症

腦部流血症

嬰癱症

假生大癱症

歪頸症

抽梗症

嬰抽筋症

羊癇症

夜驚症

癡症

腦積血症

跳舞風

第十一冊 論呼吸經之病

傷風

聲管新炎常症

聲管舊炎

聲管痰喘

聲管抽肌炎症

聲管假皮炎新症



北京中醫藥大學圖書館版權所有

氣管新炎

氣管舊炎

微氣管炎

肺體痰炎

囉嚕嗽士肺體炎

肺欠張症

啣啫咖癆傷症

肺外衣炎

第十二冊 論心經之病

心外衣炎

心內衣炎

心門病

兩榻門翻流症

兩榻門堵阻症

總脈門症

胎生心經病

第十三冊 論育經司溺經之病



北京中醫藥大學圖書館版權所有

溺血症

溺暫遏絕症

膿溺症

癰毒腎

腎痲症

腎新炎

夜遺症

第十四冊

論皮膚症

汗粒

溼癬

天泡瘡

癩頭

癬瘡

濕癩

大水蠃癩

大水泡

輕紫皮

溼紫皮



油風

牛皮癬

疥疾

皮錢癬

頭錢癬



兒科撮要卷二

嶺南 文楷尹端模筆譯

第八冊

論性質類病

瘰癧症

此爲何症

乃一種之病、多是關乎氣質者、每屬遺傳、異在發有核質之
癰、性近發膿、

原何而致

此或因氣質、或因遺傳、限於童年、而大都是多侵吸核、



有何病狀

凡癰毒之兒，性格多魯，身心怠驚，而遲鈍不堪，皮厚而穢濁，面貌浮腫，有如麪團，上唇厚，鼻子大，且鼻翼亦變厚，患之最常侵者，爲頸部之核，至腹則脹，而骨端亦腫大焉。

有何繼累之患

氣脂痰炎，腸胃痰炎，聾耳，鼻淵，癰毒，火眼。

如何治之

若有癰毒之情節，不論是父是母，則當孕時，爲母者必須穿溫暖之衣，戒忌驚竦，應出門活動筋骨，必須有定時而勿間，生後毋自哺其子，宜卽僱乳娘代乳，當爲兒斷乳後，須留意。



戒勿食一切不宜之物，初時須用淨牛鰾和少許灰水，以免酸腐，及後可用淡肉湯去肥爲要。衣服則週年須以嘔曬，絨附體，襪則要長，鞋亦要堅厚者。又必須令其在外，天空氣處多活筋骨，每日可用鹽水爲洗濯一次，洗後以略粗之巾擦，巾擦之後，繼之以手。

所用三宗要藥，乃碘鐵魚肝油。四歲大之兒，鐵碘糖，每服可用五滴，和麥芽精而服，一日三次，漸服漸增。鐵碘糖之劑，魚肝油，或淨服之，或勻和鈷礪燐亦可。大便秘用一種平常鹽類瀉劑，使其利而不滯，至發大之核，必當塗以碘酒，或用伊克度油膏亦可。若使成膿，則須立割，生膿之際，還須培補其

力焉

腸吸核癰症

此爲何症

乃一種之嘔吡咖壞變，患於腸吸核者，論其狀，有像乎腹統膜舊炎，或嘔吡咖統膜炎。

有何病狀

腹部覺痛，大便無常，下糞如坭，氣味臭惡，腹大而脹，惟身之別處，則消瘦矣，晚間之熱度，略高於常。

當核發大，便覺比隣諸經爲其所壓，而腹部迴脘，常見其脹大，至水臌亦屢有見，蓋因總吸脘或四合迴脘遭壓而致也。



南京中醫藥大學圖書館版權所有

此外或覺氣脹甚、且或有嘔吐、痙瀉焉、

命之將盡、便發虛熱、脈變急數、而每常汗出淋漓、其死也多、
因氣力耗竭、腸部發炎、或腹統膜發炎焉、

如何辨之

惟獨見核之發大、然後能決然定之、

如何決之

多屬利害、

如何治之

食物必須取其極養體者、惟每次必以少食爲佳、如生牛肉、
搾出之汁、雞湯、羊肉湯、半熟蛋、鮮魚、俱屬可用之品也、牛嬭、

亦可惟必先糞內驗明其果能全化然後用之

論藥則鐵碘糖有效可見魚肝油亦屬可用以小劑由口服下但仍以搓入之法爲尙也鈷綠與挨多方亦有用者三歲大之兒服鈷綠以五釐爲度服挨多方則約半釐若近腹面上摸覺有團團之質可連續數日塗油流汞水於腹其力以五分開百分者後歇些時再塗使若腹痛頗甚可用衣畢格加味散治之四五歲之兒服二釐半日焉兩次

嬰花柳毒

嬰花柳可如何分法

分爲胎生與自得兩種胎生乃從乃父或乃母之血得來而

自得者，則由感染疳毒，如乳娘有此，或他人之常與該嬰親近者有此，便可沾着。

有何病狀

凡生來卽有花柳之兒，多甚渺小，啼聲細弱，皮膚起鱗，而色如銅，唇多厚而裂，肛門臀際有爛瘡毒，莖腳版紅，且亦起鱗。在重症，遍體俱有黑且溼之痂，靨或鱗，及數顆四散之水泡，內含血汁者。

在年較大之嬰，多見其顙門廠開，成骨之功緩慢，牙則早出，聲沙而吱咄，指甲細小，肝大且實，頸後之核，每常發大，至肝之發大，每生肚痛嘔吐，且常起痼瀉，論兒面貌，儼然老相，髮



眉俱落甚或睫毛亦然唇角與鼻每亦潰爛而遍體有凸斑其色如銅鼻之涕膜厚而且腫而兒常縮氣焉

在略輕之症或只有縮鼻兼具一種起鱗如疣之症或乃如銅色之參差點

體質如何更變

肝變大發硬且圓如膠之瘤少見於此蓋異於壯者其肺或遍滿膠瘤而此等瘤之中處多是壞變如牛乳餅肺亦或有變實之處人名爲白變如肝至脾亦或發大色黑而硬焉如何辨之

當始發之際認之易易蓋就皮膚之變色數禮拜後有斑點



發現不歇縮鼻啼聲沙及前時之情節等等便可定之惟是於是患後來之時在年紀有十二歲或十二歲以上則辨症較難於斯則須多靠從前之情節如何及此兒與家內他兒之面貌樣子有何不同至轄治臣先生所云牙齒之另外一種變法及眼明衣間質炎亦須察其有無也

如何決之

若病於生後不久便發則不利使病直至三四禮拜後然後發及其養育尙未大虧與乎調治得宜則論致命一層可云無礙

如何治之

使不能哺其母之乳則必須用最養體之物而極致意於培補其力惟是康健無病之乳媽切不可僱之以養此兒蓋恐爲兒毒所染至於用藥爲治無不用一種汞劑若該兒飲乳則令其母服之雖功力略爲不定然仍以此爲宜也士蔑先生極讚火石汞粉與汞綠毒水之妙用火石汞粉每次可服一釐日二次和鈹司母或鎢雙炭養並服若果須要可增至二釐

方 火石汞粉

十二厘至二十四厘

鎢雙炭養二十六厘

嫻

糖二十四厘

和勻均作十二包早晚服一包

若大便過於利須用汞綠毒水十五滴至三十滴一次若當