

亥23

6(2)47

徐氏十三種醫書

中華圖書館印行



蘭臺軌範卷七

目錄

小金丹方

還魂湯

又方

外臺走馬湯

雄黃粉

治瘰方

辟瘟殺鬼丸

八毒赤丸以上疫癘鬼注

茵陳蒿湯

消石礬石散

梔子大黃湯

桂枝加黃耆湯

猪膏髮煎

茵陳五苓散

大黃硝石湯

麻黃醇酒湯

黃疸方

赤苓散

寒水石散

女勞疸

牛疸煎

救急三十種黃方

療黃疸方

近效瓜蒂散

麻黃連翹赤小豆湯

黃耆芍藥桂枝苦酒湯

以上諸疸

半夏秫米湯

半夏麻黃丸

桂枝救逆湯

黃連阿膠湯

酸棗仁湯

溫膽湯

治多忘

枕中方

鎮心省睡益智方

療虛煩不可攻方

以上情志臥夢

補腎治五聾方

菴蓉丸

麝香佛手散

磁石猪腎羹

通耳法以上耳

七寶散

去聾方

補肝丸

磁硃丸

石斛夜光丸

羚羊角散

蟬花散

洗眼藥

以上目

通草散

顫鼻方

消鼻痔方

凌霄花散

蒼耳散

治鼻淵方

又方

又方

鼻中瘻肉

以上鼻

口甘方

口苦方

療口瘡

推頰車法

口氣鼻穢方

口中臭方

口香去臭方

治緊唇方

又方

塗唇方

刺舌法

療舌腫方

療舌腫方

療重舌

療舌腫方

療舌腫脹

治失音

療馬喉痹

琥珀犀角膏

喉腫刺法

口傍惡瘡方

敷面醫方

又方

止牙痛方

治牙痛仙方

治牙疼方

如神散

細辛散

以上口齒



綱要軌範卷七

吳江徐靈胎撰

疫癘鬼卒

素問

遺篇刺法論黃帝曰余聞五疫之至皆相染易無問大小病狀相似不施救療如何可得不相移易者岐

伯曰不相染者正氣存內邪不可干避其毒氣天牝從來

天牝內經注云鼻也壅虛能受天地之氣故曰天牝欲其來往出入

復得其性氣

出於腦卽不邪干氣出於腦卽先想心如日欲將入於疫室先想青氣自肝而出左行於東化作林木次

想白氣自肺而出右行於西化作戈甲次想赤氣自心而出南行於上化作燭明次想黑氣自腎而出北

行於下化作水次想黃氣自脾而出存於中央化作土五氣護身已畢以想頭上如北斗之煌煌然後可

入於疫室又一法於春分之日日未出而吐之又一法於雨水日後三浴以藥泄紅

病源

一歲之內節氣不和寒暑乖候或有暴風疾雨霧露不散則民多疾疫無長少卒皆相似如有鬼厲故云

疫癘



中惡 精神衰弱爲鬼神之氣卒中之卒然心腹刺痛悶亂欲死凡卒中惡腹大而滿者診其脉緊大而浮者死緊細而浮者生 又中惡吐血數升脉沉數細者死浮焱如疾者生 脈大段如此亦不可泥 然吐血多者多係中惡莫作

治吐血

尸厥 陰陽逆也其狀如死猶微有息而不恆脈尙動而形無知也脉沉大而滑身溫而汗此爲入臟氣復自愈若唇青身冷此爲入臟卽死

鬼擊 謂鬼竊之氣擊著於人也得之無漸如人以刀矛持刺狀胸脇腹內絞急切痛不可抑按或吐血或鼻中出血或下血一名爲鬼排重者死

卒魘 魂魄外遊爲他邪所執欲還未得忌火照之照則神魂遂不復入乃死若在燈光前魘者是本由明出不忌火

三尸諸蟲 其蟲與人俱生而此蟲忌血能與鬼靈相通常接引外邪爲人患害其發作之狀或沉沉默默不知所苦而無處不惡或腹痛脹急或礫塊踊起或攣引腰脊或精神雜錯變狀多端其病大同小異但以一方治之者故名諸尸也

尸注 是五尸內之尸注而挾外鬼邪之氣流注身體令人無處不惡每節氣改變輒至大惡積月累年

漸就頓滯以至於死死後復易旁人乃至滅門以其尸病注易旁人故謂尸注

喪尸 人有年命衰弱至於喪死之處心意有所畏惡其身內尸蠱性既忌惡便更接引外邪共爲疹病其發亦心腹刺痛脹滿氣急但逢喪處其病則發故謂之喪尸

尸氣 人有觸值死尸或臨尸其尸氣入腹內與尸蠱相接成病其發亦心腹刺痛脹滿氣急但聞尸氣則發故謂之尸氣

諸注 謂邪氣居住人身內故名爲注又注易旁人也乃有三十六種九十九種而方皆不顯其名所載有風鬼轉生死邪氣寒熱冷蠱毒惡忤這走溫喪哭殃食水骨血溫痺勞微泄石產土飲以上諸注皆正氣虛而邪氣傳綿也與諸尸病相近

又有九種注

一曰風注 二曰寒注 三曰氣注 四曰生注 五曰涼注 六曰酒注 七曰食注

八曰水注 九曰尸注

疫癘方

小金丹方

素問

辰砂二兩 水磨雄黃一兩 叶子雌黃一兩 紫金半兩
愚按以金箔同藥研之可爲細末 同入合中外同了地一尺築

地實不用爐不須藥制用火二十斤煨之也七日終常令火不絕 候冷七日取次日出合子合子即磁取

順日研之順日研之謂左旋也 三日煉白沙蜜爲丸如梧子大每日望東吸日華氣一口冰水下一丸和氣咽之

服十粒無疫干也

還魂湯金匱 救卒死客忤死

麻黃三兩去節 杏仁去皮尖 甘草一兩炙 千金方四兩 右三味水八升煮取三升去渣分令咽之通治諸

感忤 千金方云此方主卒忤鬼擊飛尸諸奄忽氣絕復覺或已無脉口禁拘不開去齒下湯湯入口

不下者分病人髮左右足踏肩引之藥下復增取一升須臾立甦

又方

韭根一握 烏梅二七 吳茱萸半升 右三味以水一斗煮之以病人櫛內中三沸櫛浮者生沉者死

煮取三升去滓分飲之

外臺走馬湯金匱附方 治中惡心痛腹脹大便不通并通治飛尸鬼擊

巴豆二枚去皮心熬 杏仁二枚 右二味以綿纏搥令碎熱湯二合捻取自然汁飲之當下老小量之



北京中医药大学图书馆藏

雄黃粉千金翼

治卒中鬼蠱及刀兵所傷血漏腹中不出煩滿欲絕雄黃一味為粉以酒服一乃至日三

血化為水

治瘡方外臺 瘡痂轉相染著至滅門延及外人無收視者

赤小豆

鬼箭羽

鬼臼

雄黃研

丹砂各二兩

右五味搗末蜜丸如小豆大服一丸可

與病人同牀

辟瘧殺鬼丸外臺

虎頭骨五兩炙

硃砂一兩半研 鬼臼一兩

雄黃一兩半研

皂莢一兩炙

雌黃一兩半研

燕莢一兩

右七味搗篩以蠟蜜

和蠶月大絳囊盛繫臂男左女右家中置屋四角月朔望夜半中庭燒一丸忌生血物

八毒赤丸實鑑 治鬼瘡病

雄黃

礬石

硃砂

附子泡

藜蘆

丹皮

巴豆各一兩

蜈蚣一條

為末蜜丸小

豆大每服五七丸冷水送下無時礬石或作礬石

紫金錠

蘇合丸二方俱見通治

諸疸附黃汗

蘭臺軌範

卷七瘧癘鬼症 諸疸



北京中医药大学图书馆藏

素問

平人氣象論溺黃赤安臥者黃疸已食如饑者胃疸目黃者曰黃疸

金匱

跌陽脉緊而數數則爲熱熱則消穀緊則爲寒食卽爲滿

脉緊而數則有熱兼有寒故用藥亦當寒熱兼顧古方可考也

尺脈浮爲傷胃

跌陽緊爲傷脾風寒相搏食穀卽眩穀氣不消胃中苦澀澀氣下流小便不通陰被其寒熱流膀胱身體

盡黃名曰穀疸額上黑微汗出手足中熱薄暮卽發膀胱急小便自利名曰女勞疸腹如水狀不治心中

懊憹而熱不能食時欲吐名曰酒疸 夫病酒黃疸必小便不利其候心中熱足下熱是其證也 酒疸

心中熱欲吐者吐之愈

酒疸下之久久爲黑疸目青面黑心中如噉蒜薑狀大便正黑皮膚爪之不仁

脉浮弱雖黑微黃故知之

黃家從濕得之一身盡發熱面黃肚熱熱在裏當下之 黃疸之病當以十

八日爲期治之十日以上瘥反劇爲難治

疸而渴者其疸難治疸而不渴者其疸可治發於陰部其人

必嘔陽部其人振寒而發熱也

黃汗之病兩脛自冷假令發熱此屬歷節食已汗出又身常暮臥盜汗

出者此榮氣也若汗出已反發熱者久久其身必甲錯發熱不止者必生惡瘡若身重汗出已輒輕者久

久必身瞢瞢卽胸中痛又從腰以下必汗出下無汗腰體弛痛如有物在皮中狀劇者不能食身疼痛煩

燥小便不利此爲黃汗

病源

黃病 黃病者一身盡疼發熱面色洞黃七八日後壯熱口裏有血當下之法如純肝狀其人少腹內急若其人眼睛澀疼鼻骨疼兩膊及項強腰背急卽是患黃多大便澀但令得小便快卽不慮死不用大便多多卽心腹脹不存此由寒濕在表則熱蓄於脾胃腠理不開瘀熱與宿穀相搏煩鬱不消則大小便不通故其體面目皆變黃也

利小便爲治黃總訣

急黃

脾藏有熱穀氣鬱蒸因爲熱毒所加故猝然發黃心滿氣喘命在頃刻故云急黃也

勞黃

脾藏中風風氣鬱結相搏故令身體發黃額上黑微汗出手足中熱薄暮發膀胱急四肢煩小便

自利名爲勞黃

腦黃

熱邪在骨髓腦爲髓海故熱氣從骨髓流入于腦則身體發黃頭痛眉疼

陰黃

陽氣伏陰氣盛熱毒加之故但身面色黃頭痛而不發熱名爲陰黃

癖黃

氣水飲停滯結聚成癖因熱氣相搏則鬱蒸不散故脇下滿痛而身發黃名爲癖黃

噤黃

心脾有瘀熱心主於舌脾之絡脉出於舌下若身面發黃舌下大脈起青黑色舌噤不能語名爲噤黃

噤黃

五色黃 凡人著五種黃其人冥漠不知東西者看其左手脉名手肝脉兩筋中其脉如有如無又看近手屈肘前臂上當有三岐脉中央者名爲手肝脉兩廂者名岐脉看時若肝脉全無兩廂壞其人九死一生若中央脉近掌三指道有如不絕其人必不死

酒疸 虛勞之人飲酒多進穀少則胃內生熱因大醉當風入水則身目發黃心中懊痛足脛滿小便黃面發赤斑

穀疸 穀疸之狀食畢頭眩心忪怫鬱不安而發黃由失飢大食胃氣衝熏所致

黃疸 其狀身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便難由大勞大熱而交接卽入水所致也

黑疸 黑疸之狀小腹滿身體盡黃額上反黑足下熱大便黑是也諸疸久久多變爲黑疸

黃汗之爲病身發黃腫發熱汗出不渴狀如風水汗染衣正黃如柏汁其脉自沉此由脾胃有熱汗出而入水中浴若水入汗孔中得成黃汗也

諸疸方

茵陳蒿湯

穀疸之爲病寒熱不食食卽頭眩心胸不安久久發黃爲穀疸此湯主之



茵陳蒿 六兩 梔子 十四枚 大黃 二兩 右三味以水一斗先煮茵陳減六升納二味煮取三升去滓分

溫三服小便當利尿如皂角汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去也

消石礬石散 金匱 黃家日晡所發熱而反惡寒此為女勞得之膀胱急少腹滿身盡黃額上黑足下熱因

作黑疸其腹脹如水狀大便必黑時溇此女勞之病非水也腹滿者難治此方主之

消石 礬石 燒等分 右二味為散以大麥粥汁和服方寸匕日三服病隨大小便去小便正黃大

便正黑是候也

梔子大黃湯 金匱 酒黃疸心中懊懣或熱痛此方主之

梔子 十四枚 大黃 一兩 枳實 五枚 豉 一升 右四味以水六升煮取二升分溫三服

桂枝加黃耆湯 金匱 諸病黃家但利其小便假令脈浮當以汗解之此方主之 亦主治黃汗

桂枝 芍藥 甘草 各二兩 生薑 三兩 大棗 十二枚 黃耆 二兩 右六味以水八升煮取三升溫服

一升須臾飲熱稀粥一升餘以助藥力溫覆取微汗不汗更服

豬膏髮煎 金匱 諸黃主之

豬膏 半觔 亂髮 如雞子大三枚 右二味和膏中煎之髮消藥成分再服病從小便出



茵陳五苓散金匱 黃疸主之

茵陳蒿末 一錢 五苓散 五分 右二味和先食飲方寸匕日三服 此利小便之法

大黃消石湯金匱 黃疸腹滿小便不利而赤自汗出此為表和裏實當下之

大黃 黃柏 硝石各四兩 梔子十五枚 右四味以水六升煮取二升去渣納硝更煮取一升頓服 黃疸變臨瀉者量多此方乃下法也

麻黃醇酒湯千金 治黃疸

麻黃 二兩 以美酒酒五升煮取二升半頓服盡冬月用酒春月用水

黃疸方千金 治身目皆黃皮肉黧塵出

茵陳 一把 梔子二十枚 石膏 一觔 以水五升煮二升取二升半去渣以猛火燒石膏令赤投湯中沸定

服一升覆取汗周身以粉粉之不汗更服 燒石膏之義甚精妙

赤苓散千金 主黑疸身皮大便皆黑

赤小豆三十枚 茯苓六銖 雄黃 一銖 瓜丁 四銖 女薑 六銖 甘草 二銖 以水三升煮豆茯苓取八合搗四

味為散和半錢服之須臾當吐吐則愈亦主一切黃

寒水石散千金

主肉疽飲少小便多白如泔色此病得之從酒

寒水石

白石脂

括囊各五分

知母

兔絲子

桂心各三分

搗篩為散麥粥服五分七日三服

五日知十日差

此方不常用聊備一格

女勞疸千金

治黃疸之為病日晡所發熱惡寒少腹急體黃額黑大便黑溇洩足下熱此為女勞也腹

滿者難療

滑石研

石膏研各五兩

為散麥粥汁服方寸匕日三小便極利差

牛疸煎千金

酒疸身黃麴塵出此主之

牛蠹一枚

大黃八兩

芫花一升

薤花半觔

右三味以酒一升切三味漬之一宿煮減半去渣納牛

膽微火煎令可丸丸如豆大服一服日移六七尺不知更服一丸膈上吐膈下痢或不吐痢而愈

救急三十種黃方外臺

用雞子一顆并殼燒灰研酢一合又溫之總和頓服身體眼睛極黃者不過三顆

鼻中蟲出神效

療黃疸方外臺

取生小麥苗搗絞取汁飲六七合晝夜三四飲三四日便愈無小麥苗穢麥苗亦得

近效瓜蒂散外臺療黃疸



瓜蒂^{二七} 赤小豆^{七枚} 生秫米^{二七} 丁香^{二七} 右四味搗篩重者取如大豆二枚各著一枚鼻孔

中痛縮鼻須臾鼻中漚清黃水或從口中出升餘則愈病輕者小豆大則可不愈間日復頻用效或使

人以竹筒極力吹鼻中無不死者嗅鼻出黃水唐以前卽有此法或用束腰葫蘆內白膜研細加麝少許吹鼻亦能出水

麻黃連軀赤小豆湯傷寒論 治傷寒瘀熱在裏身必發黃此主之

麻黃^{二兩} 連軀^{二兩} 赤小豆^{一升} 杏仁^{四十粒} 甘草^{二兩} 生梓白皮^{一升} 生薑^{二兩} 大棗^{十二枚} 右以

潦一斗先煮麻黃去沫納諸藥煮取三升分溫三服此方治傷寒餘邪未盡之黃與諸證微別

黃耆芍藥桂枝苦酒湯金匱 黃汗之爲病身體腫發熱汗出而渴狀如風水汗沾衣色正黃如麤汁脉自

沉以汗出入水中浴水從汗孔入得之此湯主之

黃耆^{五兩} 芍藥^{三兩} 桂枝^{三兩} 右三味以苦酒一升水七升相和煮取三升温服一升當心煩服

至六七日乃解若心煩不止者以苦酒阻故也一方以美生鹽代苦酒此病在表不在裏金匱等書治疸病之方最多然用之或效或不效非若他證之每

發必中者何也蓋疸之重者有蠱在腹中包裹黃水藥不能入非決破其蠱或提其黃水出淨必不除根此等病當求屢試屢驗和平輕淡之單方治之專恃古方竟有全然不應者

小建中湯見通治 瓜蒂湯方見

情志臥夢

南京中医药大学图书馆藏

靈天賦論五臟六

之精氣皆上注於目而為之精精之窠為眼骨之精為瞳子筋之精為黑眼血之精

為絡其窠氣之精為白眼肌肉之精為約束裏攣筋骨血氣之精而與脉并為系上屬於腦後出於項中

故邪中於項因逢其身之虛其入深則隨眼系以入於腦則腦轉腦轉則引目系急目系急則目眩以轉

矣邪同其精其精所中不相比也則精散精散則視歧視歧見兩物目者五臟六腑之精也榮衛魂魄之

所常榮神氣之所生也故神勞則魂魄散志意亂是故瞳子黑眼法於陰白眼赤脈法於陽也故陰陽合

傳而精明也目者心使也心者神之舍也故精神亂而不轉卒然見非常處精神魂魄散不相得故曰惑

也素舉痛論帝曰余知百病生於氣也怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒則氣收畏則氣泄

驚則氣亂勞則氣耗思則氣結陰陽氣象大論東方生風在聲為呼在變動為握在志為怒怒傷肝悲

勝怒所勝即五行生剋之理南方生熱在聲為笑在變動為憂在志為喜喜傷心恐勝喜中央生濕在聲為歌在變

動為噦在志為思思傷脾怒勝思西方生燥在聲為哭在變動為咳在志為憂憂傷肺喜勝憂北方生寒

在聲為呻在變動為慄在志為恐恐傷腎思勝恐調經論神有餘則笑不休神不足則悲血有餘則怒

不足則恐血并於陰氣并於陽故為驚狂血并於陽氣并於陰乃為炁中血并於上氣并於下心煩惋

善怒血并於下氣并於上亂而善忘

以上情志

不以多臥 靈邪客竊黃帝問於伯高曰夫邪氣之客人也或令人目不瞑不臥出者何氣使然伯高曰五穀入於胃也其糟粕津液宗氣分爲三隧故宗氣積於胸中出於喉嚨以貫心脉而行呼吸爲榮氣者泌其津液注之於脈化以爲血以榮四末內注五臟六腑以應刻數焉衛氣者出其悍氣之慄疾而先行於四末分肉皮膚之間而不休者也晝日行於陽夜行於陰常從足少陰之分間行於五臟六腑今厥氣客於五臟六腑則衛氣獨衛其外行於陽不得入於陰行於陽則陽氣盛陽氣盛則陽蹻陷不得入於陰陰虛故目不瞑黃帝曰善治之奈何伯高曰補其不足瀉其有餘調其虛實以通其道而去其邪飲以半夏湯一劑陰陽已通其臥立至 大惑論黃帝曰人之多臥者何氣使然岐伯曰此人腸胃大而皮膚濕而分肉不解焉

善食人多善臥往往如此

黃帝曰卒然多臥者何氣使然岐伯曰邪氣留於上焦閉而不通已食若飲湯衛氣留久於陰而不行故卒然多臥焉

不夜瞑不晝瞑

靈榮衛生會篇黃帝曰老人之不夜瞑者何氣使然少壯之人不晝瞑者何氣使然岐

伯答曰壯者之氣血盛其肌肉滑氣道通榮衛之行不失其常故晝精而夜瞑老者之氣血衰其肌肉枯

氣道澀五臟之氣相搏其榮氣衰少而衛氣內伐故晝不精夜不瞑 寒熱病篇陽氣盛則瞑目陰氣盛