

內科摘錄卷三

周身部

身痛拘急

爲受風也，用加味香蘇飲見首卷頭痛

身痛重墜

爲受濕也，用二陳湯見脾胃痰飲加蒼朮、白朮、各錢半

中風

此症卒中昏倒不省人事，牙關緊閉，痰涎壅盛，或口眼歪斜，或肢節不舉，或瘡不能言，其外候也，皆未有不由

虛而感者，顧有血虛氣虛之不同，中臟中腑之各異，有宜汗宜下，有可治不可治，非可膠柱鼓瑟者，茲舉通用便方以備

倉卒救治

萍鄉文

晟叔來輯

男星瑞重校刊

星輝全校



南京中醫藥大學圖書館藏

六經中風宜
兼用針灸諸
法詳陳修園
時方妙用

開關散

皂角二錢生半夏比細辛各一錢共研細末每用約二分吹兩鼻中即醒如無細辛半夏單用皂角末亦可吹兩

次不得嚏者難救○又砭法用鋒利碎磁針刺少商穴使血出

即解少商穴在兩大拇指甲側縫肉盡處先從背抹至指間

小續命湯

統治六經中風之通劑口眼喎邪半身不遂言語蹇澀及剛柔二脛亦治厥陰風瀉防風一錢二分桂枝

麻黃人參酒芍杏仁川芎黃芩防己炙甘草各

八分附子四分薑朮煎服如中風有汗惡風依本方桂枝

芍藥杏仁各加一倍如中風無汗惡寒本方麻黃杏仁防風

各加一倍以上三症皆大陽經中風如中風有汗不惡寒

依本方加石膏知母各二錢甘草再加一倍去附子如中風

有汗身熱不惡寒依本方加葛根桂枝各一錢黃芩再加一倍

以上二症皆陽明經中風○如中風無汗身涼此太陰中風水

方附子加一倍乾薑加二倍○如中風有汗無熱此少陰經中

風也本方桂枝甘草各加一倍○如中風肢節攣痛或麻木不

仁此少陽厥陰經中風也本方加羌活連翹各一錢

中腑者多着四肢

故有半身不遂手足中血脈者內無便溺之阻不隨左癱右瘓石瘕之形隔外無六經之

貧者倍用黨
參代之

小便秘澀宜
加滑石燈草
凡冷脫及諸
絕症虛症俱
不可用開關
散與針砭之
法

形症惟目眼歪
斜或左或右、
宜養血營筋、
不可僅用

偏左宜六君子湯

人參二錢、白朮三錢、法夏、茯苓各二錢、陳皮、
草各一錢、用水煎服、

偏右宜四物湯

熟地四錢、當歸三錢、酒芍二錢、川芎一錢、
水煎服、以上二湯俱加薑汁、竹瀝各半杯、以行

經略之痰、再加礪石、鉤藤、天麻、鈴羊角屑各一錢、以熄風活絡、
或加附子以固陰、肉桂以通陽、黃耆以勝風、

中風入臟、熱極閉結

錢三化湯、厚朴、人中黃、枳實、羌活各
元明粉各一錢、并用外導法、

尤效、外導法見下、身大便、

中風入臟、冷脫汗如珠、頭搖

脈必沉細、急用理中湯、人參二錢、
白朮三錢、乾薑炙草各一錢、加附子

一錢、五分水、煎溫涼服、效、再加黃芪炙三錢、肉桂、
去粗皮六分、尤佳、

中風死症

多是風中帶寒、口開為心絕、手撒為脾絕、眼閉為肝絕、
遺溺為腎絕、聲如鼾睡為肺絕、汗出如油、元氣內絕、髮

直、目上視、面赤如豬汗、綴如珠、法在不治、宜急用三生飲看症
加減以救之、

無勞者信用
高麗參錢信
用黨參錢
參下同

以單方

三生飲

治寒風中臟六脈沉細、生南星、生附子、生烏頭各錢半、生薑五片、木香五分、此方加人參一兩更爲

有益、陳修園用熟附子一兩、乾薑五錢、炙甘草四錢、一服汗發止再服、眼睛畧動三服加人參三錢、漸有生意、必須半日內服

三劑方效

地黃飲子

溫補少陰、治舌瘡不能言、足廢不能行、肉桂熟附子肉蓯蓉茯苓熟地麥冬肉五味子遠志菖蒲山茱萸

石斛各五分、薄荷七片、水一盅煎湯八分溫服

中風不語

合人溺澆其面即醒、又方香油二兩雞子一個去殼

中風口噤

好酒調服二錢、刺芥穗爲末用

急救中風方

此症喉內無聲手足冷而身熱、即用生薑不拘多

角即醒、或用白鹽梅擦牙或用龜尿滴舌即愈、又得蛇薑

放病人口內均治、後服十全大補湯見虛癆、又方用濕泥捏

成圈圍住肚臍、痾尿在內

一時即甦而愈、方經屢驗



上海中醫藥大學圖書館

中風不省人事

柏葉一握葱白一握連根搗如泥無灰酒二盞泡煎一二十沸去渣候溫涼灌服不喜飲酒者分數

次服得病之日即服此免成廢

稀涎方

痰涎壅盛用此先吐其痰病即輕鬆皂角四條明礬六兩共為細末溫酒調三錢徐徐灌下

半身不遂

用稀獫草九蒸九晒乾研末作丸水酒送下常服漸愈○又方用大料豆黑色陳皮當歸五加皮各四兩白酒

五斤浸三日早晚溫服二三料自愈即口眼歪斜者多服亦愈○又方金鳳花即指甲花四五兩泡甜酒服十多日即效

中風口眼歪斜

蓖麻子取淨肉一兩水片三分寒天加乾薑二錢生黑附子二錢共搗為膏口眼歪在左以此塗右

歪右塗左今日塗明日正但正即洗去過時又恐偏於彼矣輕者以鱈魚血塗之亦效○又方治口喎皂角為末陳米醋調塗口上左喎塗右右喎塗左乾則易之數次可愈神效

羊頭風病

俗名羊癰風水內送下效黑牛糞瓦上焙乾為末一錢加糖于開

中風痰厥

香油一盞灌入口中仍用鷲毛探吐痰涎○又方肥皂角一個猪油擦七次火上焙七次研末好酒灌下愈

牙齦風

中風

中風

三

卷三

急救中痰方

此症似乎中風惟見喉內有聲口眼斜閉用細辛末吹入鼻內得嚏即甦切不可用薑以薑灌之不救

亦不可開薑氣○又方或以小便對口射之或用白鳳仙沖酒灌之均治後宜服十全大補湯

中痰厥

臘八日大雄猪胆一枚將明礬研極細末盛滿為度陰乾研細末每錢加飛過硃砂三分和勻用無根水服三分效

又方生附子蒜頭醋煮搗成餅貼湧泉穴即足心若渴不可便飲茶中寒中風俱可貼

一切感冒風寒初起頭痛發熱

俱用加味香蘇飲方見上頭痛○又方淡豆豉一兩生薑三片連鬚

葱白五個白芷一兩甘草五錢水二碗煎服汗出即愈○又方淡豆豉二兩連鬚葱白十個生薑三片開水一碗浸一刻再入

瓦瓶內加水半碗煮一沸乘熱服蓋衣被出汗即愈○又方用連鬚葱十四根生薑二錢煎服治同若感冒重者用人參敗

毒散方

見下頁

虛弱人調理不密易于感冒風寒

防風一兩白朮炒二兩黃芪蜜炒二兩共剉每服三錢東一枚

水鐘半煎服

感冒初起發熱無汗頭痛口乾細陳茶二錢核桃肉三個生薑三片連鬚葱白七個共搗碎用小火煎至七分熱服被蓋取汗而愈又方黑豆一合炒深黃色為末分二次黃酒冲服自愈畏風者病在皮毛香蘇飲生之方見上

頭痛

感冒鼻塞聲重用紙撚通入鼻內得嚏則減之畧喫去鼻涕以皂角末二分吹入即得嚏而通再服葱豉生薑湯效

人參敗毒散治傷風傷寒及時氣疫癘頭痛目眩四肢疼痛增寒壯熱項強睛痛鼻塞聲重嵐障鬼瘧或聲如哇鳴赤

眼口瘡濕毒流注腮腫脚腫喉痺毒痢諸瘡斑疹

活扶苓桔梗枳壳前胡柴胡獨活川芎各一錢甘草五分加生薑三片薄荷二分同煎如口乾舌燥加黃

芩一錢并治溫病脚氣加大黃蒼朮各一錢錢并治溫病脚氣加大黃蒼朮各一錢治風熱亦治下血清

十個本方除人參加荆芥防風各一錢治風熱亦治下血清

鮮去人參加連翹銀花各一錢治瘡毒本方加陳廩米三

荆敗毒散
連翹敗毒散
倉廩散

外感風寒兼內傷飲食發熱頭疼吐瀉腹痛

宜用寸金丹三四錢淡薑湯化下方見脾

胃牛商承

感冒傷風

四

卷三

胃部
停滯

傷寒論治

傷寒之治與春溫夏熱不同溫熱症頭痛發熱必不惡寒而口渴

若傷寒則異是其症由表而入裏初起時邪在太陽膀胱經頭痛

惡寒發熱脈浮宜加味香蘇散見頭痛人參敗毒散見上項或桂

枝湯麻黃湯柴葛解肌湯三方見後繼傳陽明胃經則目痛鼻乾

唇焦不渴宜葛根湯葛根二錢升麻秦艽荆芥赤芍各一錢蘇葉白芷各八分甘草五分生薑二片再傳

少陽膽經則目眩耳聾胸滿脇痛口苦寒熱往來頭汗脈弦宜小

柴胡湯見上瘧疾此三陽傳經之表症也失治則傳入三陰矣其

傳入太陰脾經者則腹滿痛下利脈沉宜大柴胡湯即小柴胡湯加枳實一錢

葛根湯

小承氣湯

五苓散

白虎湯

調胃承氣湯

四逆湯
白通湯

大黃二錢其傳入少陰腎經者口燥咽乾痛利清水目不明危矣先

小承氣湯大黃三錢枳實錢半厚朴一錢大承氣湯至傳入厥陰

肝經者小腹滿拒按舌捲囊縮逆用大承氣湯或有得生者亦

有不傳三陰而傳入太陰脾肺者則口渴溺赤宜五苓散錢半桂枝一錢

澤泄各八分白木傳入陽明胃腑者則譫語狂亂燥渴便閉轉矢

氣自汗不得眠宜白虎湯生石膏五錢知母三錢甘草二錢梗米

調胃承氣湯大黃三錢芒硝五錢甘草五分以上為傳經傷寒因寒化火也

其有初起寒邪直中三陰者其症腹冷痛吐清沫利清穀踏臥肢

冷囊縮吐虵舌黑而潤脈沉細此寒症也中太陰脾理中湯見中

中少陰腎肢冷厥逆四逆湯附子乾薑炙甘草各五錢水煎溫服中厥陰肝白通加

傷寒論治

柴葛陰威
格陽熱藥不

人

并治身痛四

肢拘急

此方宜于西

北

猪胆汁湯附子乾薑各五錢葱白二錢人尿半杯猪胆汁五匙温服急投勿緩此係醫中第一

要症故專論之

桂枝湯治太陽中風寒大棗四枚煎服

桂枝芍藥生薑各錢半甘草炙一錢

麻黃湯

治太陽傷寒無汗杏仁十二枚水煎服

麻黃四錢

桂枝二錢

炙甘草一錢

柴葛解肌湯

治濕熱症發熱頭痛不惡寒與傷寒異

柴胡一錢

生地二錢
甘草五分

傷寒

症候不一有傳變不一惟良醫診脈隨症用藥庶幾奏效非單方可治也今惟傳一外治之法凡醫藥不便處

借此救急
頗有奇功

外熨法

治傷寒胸膈不寬作痛一切寒結熱結食結痰結痞結水結等症并中氣虛弱不堪攻擊者以此法熨之則滯行邪

散其效如神

葱白頭一大把生老薑二大塊生蘿蔔四五個如無時以蘿蔔子一合代之三味共搗爛炒熱用布分作二包

輪換久久罨熨心胸脇下痛處無不豁然自開汗出而愈如數
次炒乾則烹之以酒且不宜大熱恐炮烙難受也若大便閉結
宜兼熨臍腹

治傷寒犯內傷食積蓄血小腹硬脹不能言語神思欲脫兩目直

視手足強仆等症候危篤難以下藥者紫蘇半斤煎濃湯將大手

乘熱攤肚上至臍以下用手在巾上旋摩冷則再換數次候暖
氣透入其宿糞硬塊積血自下而病愈如門閉結不得通
須以稠蜜和猪胆熬練成條插入糞門導之有通此法屢驗但
積蠱下後須用藥調理

傷寒初起以江西淡豆豉一兩連鬚葱白十根生薑三片煎服被

酒熬大熱冲入沙梨葉內和勻以布濾去渣取酒飲之被蓋汗
出抹去自愈無酒量者盡量飲之可也

傷寒邪熱初起不拘男女老少患者宜用元參二兩二錢水三鐘

不可用此

以下四條俱
宜服理湯
加桂枝附子
竟中風并

治傷寒譫語狂亂腹脹拒按大便秘結用猪胆一個入醋少許以

頭蘸蒸涎若入穀道約寸半擠胆汁入肉片時扯出竹筒自效

傷寒點眼角粉甘草六分水片六分共研極細末病起一日至六

眼并點甚效每點大眼角點二次

結胸停食傷寒糟蒲餅陳香糟六兩水薑菖蒲各四兩共搗勻炒

如口渴任其飲水吃茶熱為餅貼胸前痛處以火熨之內响即去

傷寒狂走用出過小雞蛋壳七個

傷寒斑出用猪胆汁一個雞蛋一個苦酒三杯合煎三沸分服三

中寒寒氣直中三陰口噤失痞四肢強直攣急疼痛似乎中風者

一斤或厥逆唇青囊縮無脈或卒倒尸厥脫陰脫陽等症葱白
并以葱白三寸煎酒一盅灌之陽氣即回加胡椒末一分尤效

隨蒼醫方
中寒發按
皆方

若病危甚者再以艾九如豆大灸氣海穴元關穴各七壯則脈漸現手足漸溫可得生矣氣海在臍下寸半元關在臍下三寸量而灸之

治中寒四肢厥冷肚腹疼痛亦治陰症腹痛

吳茱萸一分酒炒濕布包二個分包飯甑

蒸透熟更換多熨兩足心兼熨肚臍下候氣透手足暖為度此方加麥麴食鹽葱白等分同煎熟如前熨之亦效

并飲胡椒湯亦佳

陰症腹痛

面色青唇白或微青指甲紫黑手足厥冷腹痛喜按用硫黃胡椒各二錢共研末溫酒調服二錢效如無

硫黃只用胡椒末二錢半葱白二根煎湯一盅加鹽五分或加黃酒半盃亦可暫時急救照前并用熨法或灸法尤效法并

見臍腹寒痛

救陰症

與上同治胡椒一粒搗碎黃丹三分火硝二分男以左手

受藥自按其陰心又法用露蜂房三錢燒灰存性利葱白五寸同研為丸着手中男左女右握于陰口靜卧汗出即愈

內科簡錄

中寒

七

卷三



陰症手足紫黑

脈息微身不熱或微熱不渴黑料豆三合炒熟加連翹葱白三大根好酒二盅煎服乘熱服之立

效終身忌食黑魚

惡寒

右關脈細軟陽虛不達于表也急宜用附子理中湯見上中風二頁

凡大吐大瀉之後四肢厥冷小腸痛久腎縮冷汗出

先以葱白把搗爛炒熱

熨臍後另以葱白三寸搗爛熱酒調灌之即甦此方只可治體實者偶然中寒吐瀉用葱白以通其陽自愈若體虛寒而直中宜用四逆湯加人參芍藥桔梗以葱白生薑同煎服之方能取效四逆湯見上傷寒論治

縮陽症簡便方

用寸多長爆竹二個取硝以燒酒即愈

鐘溫熱對服

婦人乳縮名縮陰

同治

房事後中寒腹痛手足冷諸症

與上陰症腹痛及救陰症同治并詳臍腹門

傷濕

濕流關節身體煩重手足痠軟倦怠夾寒則痛浮腫三者合而為痺與中風畧同走拘急

此濕以尿赤口渴為執濕

片治縮陰



尿清不渴為

寒濕

濕病以燥脾
利小便為主

散濕湯

蒼朮、茯苓、朱苓、木通、木瓜、石斛、濕在上加防風在中加蒼朮在下加車前澤瀉在通身必加烏藥羌活

桑條威靈仙在兩脚必加牛膝草蘇防已痰濕為痛前方加製半夏製南星陳皮香附羌活寒濕加炮薑白朮橘紅濕熱加黃柏濕在上只可微汗兼利小便忌用麻黃等藥致令大汗不可用大下藥亦勿灼灸艾火

坐卧濕地當風涼致腰背痛足膝疼偏枯拘攣用獨活寄生湯

獨活寄生湯

蠲痺湯

風寒濕三氣成痺

羌活、獨活、牛膝、杜仲、秦艽、細辛、桂心、川芎、白芍、人參、當歸、熟地、防風、各一錢、二分、甘草、六分、酒水各半、前服

各八分

腎虛傷濕身重腰冷如坐水中口不渴小便利、炮薑、茯苓、各二錢

如小便赤大便泄者加漂蒼朮一錢陳皮丁香各二分五厘

凡濕病

用薏苡

茯苓

鼈肉

桑枝茶

木瓜酒等類可常服

瘟疫

多發于春分之後夏至之前，有由天時者邪從經絡而入為頭痛發熱咳嗽頸腫發頤大頭天行之類用加

味香

蘇飲普濟消毒飲治之，有由人染者邪從口鼻而入

為增

寒壯熱胸膈滿悶口吐黃涎之類用神朮散治之，比

兩路

之邪若傳入臟腑漸至譫語腹脹唇焦口渴者宜治及

清涼

散若大便秘結承氣湯下之方見傷寒論治并下百

加味香蘇散

見首卷頭痛

普濟消毒飲

見首卷大頭疫症

神朮散

治時行不正之氣滿悶吐瀉發熱傷食，蒼朮 陳皮 厚朴各四兩，炙草 藿香各一兩五錢，砂仁六錢共

研末每服二三錢，或加紫蘇白芷各一兩五錢亦佳

治疫清涼散

治疫邪入裏脹悶譫狂諸症，秦艽 赤芍 知母 連翹各一錢，荷葉七分，丹參五錢，柴胡錢半

人中黃二錢，水煎熱服



後方并見
瘰癧條內

小承氣湯

治胃熱譫語便閉繞臍硬痛

大黃三錢

枳實錢半

四時瘟疫皆治

黃沙糖

一杯生薑

自然汁

白滾水

一大杯

調勻

連服

三錢

葱頭二十根煮成稀粥加好醋一小碗再煮一二滾各食一二碗
熱服取汗自愈已出汗者不用又方松毛切碎搗每用二錢
酒冲服之自效又方蒼朮良薑枯礬各等分爲末每用一錢
以葱白一大個和藥搗勻塗在手心男左女右將手掩肚臍子
須窩起勿着臍又以一手兜住外腎前陰女子亦如之前煮豆
一碗熱飲之點線香半炷久可得汗如無汗再飲菹豆湯催之
汗出即愈此并見瘟疫外治

預防瘟疫

用貫衆二個打碎雄黃一兩研碎放水缸飲之

辟疫方

雄黃一兩鬼箭羽即衛茅生桴足二兩丹參二兩赤小豆二兩半紅半黑者非赤小豆共研細末煉蜜爲丸如桐子

大每服三五丸可却邪氣不至傳染又方每年元旦日未出
時舉家汲井華水各服赤小豆七粒即一年可免疫氣又方
凡入病人家用雄黃蒼朮末擦鼻孔或綿裹塞之或飲雄黃酒
一杯吃大蒜一二瓣則不染疫氣又方蒼朮末紅東搗和丸

外科商錄

瘟疫

九

卷三