

張氏醫通卷十三

長洲石公張瑞路玉父纂述

諸家類集方藥皆隨論次第。是編逐門但錄專方。其藉古方加減。各門可以通用者。彷彿祖劑之義。另自爲卷於後。

中風門

侯氏黑散金 治大風四肢煩重。心中惡寒不足。

菊花三兩 白朮一兩 防風八錢 桔梗六錢 黃芩四錢 人參

芎藭 桂枝 牡蠣 磬石 各二錢

右十四味。杵爲散。酒服方寸匕。日三服。初服二十日用

溫酒調服。禁一切魚肉大蒜。常宜冷食。六十日止。卽藥積在腹中不下也。熱食卽下矣。冷服自能助藥

力。外臺借此治風癱疾 大風四肢煩重。脾土受風水之制。土氣內結。不能敷布於四末也。心下惡寒不足者。胸

中爲濁氣填塞。心火內蘊。不得發越。熱極反兼寒化也。方中用菊花四十分爲君。以解心下之蘊熱。防桂辛桔以升發腠理。參芩白朮以實脾杜風。芎藭以潤燥熄火。牡蠣磬石以固滯腸胃。使參朮之性。留積不散。助其久功。乾薑黃芩一寒一熱。寒爲風之嚮導。熱爲火之反間也。用溫酒服者。令藥性走表以



張氏醫通卷十三

長洲石公張瑞路玉父纂述

諸家類集方藥皆隨論次第。是編逐門但錄專方。其藉古方加減。各門可以通用者。彷彿祖劑之義。另自爲卷於後。

中風門

侯氏黑散金 治大風四肢煩重。心中惡寒不足。

菊花三兩 白朮一兩 防風八錢 桔梗六錢 黃芩四錢 人參

芎藭 桂枝 牡蠣 磬石 各二錢

右十四味。杵爲散。酒服方寸匕。日三服。初服二十日用

溫酒調服。禁一切魚肉大蒜。常宜冷食。六十日止。卽藥積在腹中不下也。熱食卽下矣。冷服自能助藥

力。外臺借此治風癱疾 大風四肢煩重。脾土受風水之制。土氣內結。不能敷布於四末也。心下惡寒不足者。胸

中爲濁氣填塞。心火內蘊。不得發越。熱極反兼寒化也。方中用菊花四十分爲君。以解心下之蘊熱。防桂辛桔以升發腠理。參芩白朮以實脾杜風。芎藭以潤燥熄火。牡蠣磬石以固滯腸胃。使參朮之性。留積不散。助其久功。乾薑黃芩一寒一熱。寒爲風之嚮導。熱爲火之反間也。用溫酒服者。令藥性走表以



開其瘡也。冷食而禁諸熱物者。恐礬得熱而下。不能盡其藥力。以礬石性得冷即止。得熱則下也。○郭壅曰。黑散本爲滌除風熱方。中反用牡蠣礬石止瀉之味。且令冷食使藥積腹中。然後熱食。則風熱痰垢與藥漸次而下也。

風引湯金匱 千金 治熱癰癧。并治大人風引。小兒驚癇癰癧。日數十發。

大黃 乾薑

龍骨熬各一兩二錢

牡蠣熬各六錢

石膏各一兩八錢

赤石脂

紫石英

白石脂

寒水石如無石鹽代之

桂枝各一兩千金作桂心

右十二味杵篩。以葦囊盛之。取三指撮。井花水三升煮

三沸。溫服一升。

巢氏借治脚氣  
郭壅借治火逆

風者外司厥陰。內應肝木。上隸手經。下隸足經。中見少陽相火。所以

風自內發者。由火熱而生也。風生必害中土。土病則四末不用。聚液成痰。癰者風木挾痰注於四肢也。癰者風熱擾其經脈。內應於心主也。前方祛風外散。此方引風內泄。故用大黃兼甘草。桂枝。滑石。石膏。以化風熱。乾薑以爲反謀。使火無格拒之虞。石英。寒水。以潤血燥。石脂。龍骨。牡蠣。以補塞其空。絕風火復來之路也。

千金三黃湯金匱 治中風手足拘急。百節疼痛。煩熱心亂。惡寒。經日不欲飲食。

麻黃

黃芩各三錢

獨活三錢

細辛一錢

黃耆五分

大黃六錢

右五味水煎溫服。一服小汗。二服大汗。心熱

加大黃錢半。腹滿加枳實一枚。氣逆加人參三錢。慳加牡蠣一錢。渴加桔梗根二錢。先有寒加附子一片。石禎曰。此方于金云。仲景三黃湯治惡寒經日不止。不欲飲食。全似內外虛寒之候。而方中反用黃芩之苦寒。豈不礙麻黃輩之溫散乎。既用麻黃。復用黃耆。豈不礙表氣之閉拒乎。曷知惡寒經日不止。雖有似乎虛寒。而實衛虛不能勝邪所致。不欲飲食。亦是風熱內蘊之故。觀煩熱心亂一語。病情灼然。故方中雖以麻黃獨活細辛開發腠理於外。卽以黃芩清解風熱於內。更慮衛虛難於作汗。乃以大劑黃耆助之。與黃耆建中之義不殊。其用黃耆之意有二。一以佐麻黃開發之權。一以杜虛風復入之路也。方後復云。心熱加大黃。言服前藥後心中煩熱不除。知黃芩不能祛之外散。卽以本方加大黃以引之下泄也。其枳實。加人參。加牡蠣。加桔梗等法。或治旺氣。或助本元。各隨標本而施。加附子者。專佐麻黃之蒸發。助黃耆溫經。殊非陰寒之謂。與麻黃附子細辛湯同源異派。○詳金匱以千金二字名方。珍重之也。千金祖金匱之意而銜其集。曰備急千金方不忘祖述之本也。

竹瀝飲子一千金 治風痱身無痛。四肢不收。志亂不甚者。用此方。當先以竹瀝二十生葛汁十分薑汁一分 和服。然後用竹瀝飲子。

葛蕡 防己 附子 人參 茯苓 黃芩 甘草 桂心各一分 羚羊角三分



牛黃清心圓局方  
裁定 治初中痰涎壅盛。昏憤不省。語言蹇澀。瘦瘠不遂。一切痰氣閉塞證。

牛黃 羚羊角勿經火  
鎊爲末 茶芩

白朮生用 桂心

甘草各二錢 麻香

雄黃水飛淨 各二錢

龍腦錢半人參 犀角各五錢

右十二味各取淨末配勻蜜和成劑分作五十丸

金箔爲衣。待乾蠟護臨用開化沸湯薑湯任下。

原方尚有防風黃芩麥門冬白芍柴胡桔梗杏仁菖蒲阿膠大豆黃卷蒲黃神曲白芍乾薑薯蕷大棗一十六味因太冗雜故去之

清心牛黃圓 治暴中神昏不語。痰塞心包口角流涎煩熱氣急。一切痰熱閉遏證。

西牛黃三錢 陳膽南星一兩 黃連薑汁浸炒五錢 萬歸

甘草炙各三分 辰砂五錢水飛

爲極細末蒸餅和勻分

作五十丸。金箔爲衣候乾蠟護臨服剖開生薑湯薄荷湯人參湯量虛實選用調化服。

至寶丹局方 治諸中卒倒。痰飲血氣俱閉。寒熱交錯者。

生烏犀肉鎊 珠砂研水 雄黃研水 生玳瑁鎊 琥珀勿見火研 麝香研 龍腦研各銀箔各五

西牛黃碎半 安息香以無灰酒飛過濾去沙土約取淨一兩 微火熬成膏如無以蘇合香油代之

右將犀玳爲細末入餘藥研勻將安息

膏重用湯煮後入諸藥和搜成劑分作百丸。蠟護臨服剖用參湯調化一丸。卒中山風障氣及產後惡

血攻心童便入薑汁化服。

蘇合香圓局方  
裁定 治傳屍瘞。心腹卒痛。僵仆不省。一切氣閉屬寒證。

蘇合香另研白色者佳 安息香無灰酒熬飛去砂土各二兩

薰陸香另研 龍腦另研 丁香

麝香另研勿經火各一兩 青木香

另研勿經火各一兩 青木香

白朮

沉香另研

極細香附炒

烏犀肉燒屑另研極細

右十一味爲末逐一配勻諒加煉白蜜和劑分作五

十九丸。另以硃砂一兩水飛爲衣。蠟護臨用剖開并花水生薑湯溫酒化下一丸。原方尙有白檀香薄荷  
訶黎勒三味因太濃故去之○蘇合香圓取諸香以開寒閉僅用犀角爲塞因寒用之嚮導與至寶丹中用龍腦桂心無異

李士材曰牛黃圓蘇合香圓皆中風門中奪門之將而功用迥異。熱阻關竅用牛黃圓開之。寒阻關竅用蘇合香圓開之。若夫口開手撒眼合聲鼾自汗遺尿等虛脫證急用參附峻補庶或可救。若用牛黃蘇合之藥入口卽斃也。

稀涎散 治中風卒倒痰涎擁盛者。脈氣虛微禁用。

豬牙皂角四條去皮挖子酥炙另爲末 白礬一兩半生半枯爲末

每用三字溫水灌下未甦少頃再用。一方用巴豆六粒。

去皮膜研壓去油入礬中鎔化待礬枯爲末。和牙皂末拌勻每用四五分吹入鼻中卽吐。濁氣風湧而上則清陽失位倒置故令暴仆以此先治其標使咽喉疏通能進湯藥便止。若欲攻盡其痰則液無以養筋令人掣急筋枯此爲大戒。

舒筋三聖散 治口眼喎斜。左急右緩血脉受邪者。

當歸 肉桂 延胡索等分

爲散每服五錢水煎去滓早暮各一服。

參歸三聖散 治風中血脈。左半肢廢。口左喎。

舒筋三聖散。去延胡索加人參。風中血脈急需流布營氣。營行脈中。便不當泛用風藥。所謂血行風自滅也。至於左半肢廢。氣血不能運行。延胡耗血。胡敢輕試。必藉人參引領當歸肉桂。何慮虛風之衆散乎。

正舌散 治驚痰堵塞竅隧。肝熱生風。舌強不正。

蠍尾去毒滾醋泡炒三錢 茶荳一兩薑汁拌曬 為散。每服一錢。溫酒調服。并擦牙齦。日三度。○面赤倍蠍尾。加薄荷半兩。每服四錢。水煎熱服取汗效。

解語湯 治中風脾緩。舌強不語。半身不遂。

防風 天麻煨切薑汁拌焙 附子泡各一錢 聚仁炒研二錢 羔羊肉鑄 觀桂 羌活各八分 甘草炙五分 水煎 入竹瀝半杯。薑汁數七服。無時脈虛加人參。

祛風定志湯 治心虛驚悸。不能言。

防風 豐仁炒研各一分 生薑五片 水煎服無時。  
羌活 甘草炙各五分 當歸錢一錢 遠志肉一分 橘紅 薏苡各八分 南星泡 茯苓各八分

甄權防風湯金 治偏風

防風 菖蒲 白芷 牛膝 狗脊 草薢

白朮各二錢羌活

葛根 白朮各二錢羌活

附子

外臺

作人 杏仁各六錢薏苡仁

石膏

桂心各九錢麻黃

一兩二錢生薑兩半右十六味水煎分三服。并針

風池肩髃曲池支溝五樞陽陵泉巨虛下廉各一。凡七穴一劑覺好更進一劑。卽針一度。丸劑九針卽

瘥。灸亦得。

薏苡仁湯 治中風濕痹。關節煩疼不利。

薏苡仁一兩薑泡  
芍藥酒洗當歸各錢麻黃去節各八

小茴去皮芝麻炙七分生薑七片水煎眼

桂分

蒼朮拌炒一錢甘草分

生薑

水煎眼

無時。若自汗加石膏。煩熱疼痛加酒黃柏。厥冷拘急加熟附子。

升麻胃風湯 治胃風能食。手足麻聾。目瞤面腫。

升麻

當歸

白芷

葛根

蒼朮

麻黃

去節藁本

羌活

草豆蔻

研

蔓荆子研各四分

柴胡

黃柏

薑製各三分

甘草

炙五分

生薑

三片

大棗

一枚

水煎食遠服。

按風入胃府大

便清血四射。用人參胃風湯之桂芍。祛之內散。風入胃經。面目瞤動。面腫者。用升麻胃風湯之升葛麻

黃。輩。祛之外散。不可不辨。

犀角升麻湯 治風熱頭面腫痛。焮上如燎。咽喉不利。

犀角镑三錢 升麻一錢防風 五分

羌活各一錢 白芷

黃芩 白附子各六分 甘草炙四分

水煎食進

溫服。

烏藥順氣散局方

治暴中風氣攻注。遍身麻痺。語言蹇澀。口眼喎斜。喉中氣塞。有痰聲者。

麻黃去根節泡橘皮

烏藥各二兩 瘤蠶炒

川芎 枳殼

甘草炙 白芷

桔梗各二兩

乾薑炮五錢

右十味爲散。每服半兩。加生薑三片。大棗一枚。水煎熱服。

吳鵠臯曰。此治標之劑。初病

邪氣實者宜之。

解風散 治風成爲寒熱。頭目昏眩。支體疼痛。手足麻痺。上膈壅滯。

人參二兩半

麻黃去節兩半

芍藥

獨活

細辛

甘草炙各一兩

爲散。每服四五錢。入生薑五片。薄

荷七葉。水煎服。

按此本于金三黃湯。去耆苓。加參芍甘草。彼主杜風清熱。此主解散虛風。同源異派。

○今人但知人參爲補虛之藥。不知人參有祛邪蕩實之功。此證因虛風久襲。若獨用麻黃。無人參助其胃氣。必不能克效也。

古今錄驗續命湯方祖

近效白朮附子湯湯下

千金八風續命湯麻黃湯下

千金獨活湯桂枝湯下

三生飲省風湯下

小續命湯續命湯下

十全大補湯保元湯下

八味順氣散四君子湯下

滌痰湯二陳湯下

黑錫丹金丹下

胃苓湯平胃散下

當歸補血湯保元湯下

傷寒門

香蘇散局方

治感冒四時不正之氣。

香附薑汁浸紫蘇葉各二兩  
勿炒 桔皮一兩  
甘草錢五分

熟服。暖覆取微汗。日三夜一服。以得汗身涼爲度。

芎蘇散 治三時感冒偏於血分者。

四物湯方祖

三化湯承氣湯下

大建中湯保元湯下

千金附子散麻黃湯下

涼膈散方祖

補中益氣湯保元湯下

千金排風散續命湯下

黃耆建中湯桂枝湯下

星香湯方祖

麻黃附子湯麻黃湯下

黃耆建中湯桂枝湯下

導痰湯二陳湯下

秦艽升麻湯升麻湯下

大省風湯星香湯下

人參養營湯保元湯下

省風湯星香湯下

四君子湯方祖

大秦艽湯四物湯下

大省風湯星香湯下

星香湯方祖

秦艽升麻湯升麻湯下

導痰湯二陳湯下

小柴胡湯方祖

倉公當歸湯麻黃湯下

小柴胡湯方祖

大秦艽湯升麻湯下

二陳湯方祖

爲散。每服半兩。加生薑三片。大棗一枚。水煎去滓。

半夏

茯苓

橘皮

葛根

柴胡

紫蘇

川芎

枳殼

桔梗

等分

甘草  
炙減半

爲散。每服半兩。加薑漿煎服。取微汗效。

本方去川芎。柴胡。加人參。前胡。木香。名參柴胡。

治虛人感冒。偏於氣分者。

十神湯局方

治感冒頭痛。

麻黃  
去節泡

葛根  
生薑

香附

橘皮

芍藥

川芎

白芷

升麻

甘草  
炙各五分

生薑  
葱白

水煎去滓。熱服。取微汗。

大陷胸丸

玉函

治結胸項強。如柔瘻狀。下之則和。

大黃  
八兩

草薑  
熬半升。芒硝  
半升。杏仁  
皮尖熬半升去

右四味搗篩二味。內杏仁芒硝合研如脂。和散取如彈

丸一枚。別搗甘遂末一錢七。白蜜二合。水二升。煮取一升。溫頓服之。一宿乃下。如不下。更服。取下爲效。

禁如藥法。

大陷胸湯

玉函。治結胸熱。實脈沉而緊。心下痛。按之石鞭。

大黃  
二兩

芒硝  
三合。甘遂  
七錢

右三味。以水六升。先煮大黃。取二升去滓。內芒硝。煮一兩沸。內甘遂

末。溫服一升。得快利。止後服。

小陷胸湯玉函 治小結胸。正在心下。按之則痛。脈浮滑者。

黃連二錢半夏三合桔梗一枚右三味以水六升先煮桔梗取三升去滓內諸藥煮取二升去滓

分溫三服。

葱白香豉湯千金 治時疫傷寒。三日已內頭痛如破。及溫病初起煩熱。

葱白連鬚一握香豉二合 右二味水煎入童子小便一合日三服。秋冬加生薑二兩。按本方藥味雖輕功效最著。凡虛人風熱伏氣發溫及產後感冒。靡不隨手獲效。與產後痢後用伏龍肝湯丸不殊。既可探決死生。且免招尤。取謗真危證解圍之良劑也。

加減葱白香豉湯 治三時風熱咳嗽咽喉腫痛難用葳蕤湯者用此代之。此卽葱白香豉湯。葱白減半。加葳蕤二錢。白薇青木香桔梗各一錢。甘草薄荷各三分。白蜜三七。

萎蕤湯千金 治風溫自汗身重及冬溫發熱咳嗽。

萎蕤錢半石膏二錢白薇 青木香 麻黃去節杏仁去皮尖碎甘草 炙 獨活 蒼藭各一右

九味水煎日三服一方有葛根一錢 按于金萎蕤湯乃長沙麻黃升麻湯之變方。爲冬溫咳嗽咽乾痰結。發熱自利之專藥。以冬時有非節之暖。則陽氣不藏。少陰受病。故首推萎蕤之潤燥止咳爲君。佐以白薇

青木香苦鹹降泄。卽春時伏氣發溫更感於風之證亦不出此。以葳蕤爲少陰厥陰二經之嚮導也。麻黃爲發汗之重藥。得石膏則有分解寒熱互結之功。倘病勢較輕。不妨於中裁去麻黃石膏獨活葛根杏仁等味合以葱白香豉之類。未爲不可。如果熱勢紛斜急須開泄者。麻黃石膏又所必需。在用方者臨病之權衡耳。

犀角地黃湯千金 治傷寒溫病。一應發汗而不得汗。內蓄血及鼻衄吐血不盡。內餘瘀血。大便血面黃或中脘作痛。

犀角 生地黃酒浸另擣牡丹皮 白芍等分 右四味水煎去滓。入地黃再煎數沸。瀝清服。喜忘如狂。加大黃黃芩。脈大來遲。腹不滿而自言滿者。加當歸肉桂。吐衄加藕汁扁柏童便。

豬膚湯玉函 治少陰經伏熱咽痛。

豬膚五兩擣光後以湯泡刮下者 水煎瀝去滓。加白蜜白粉。熬香和相得。溫分大服。

黃連阿膠湯玉函 治熱傷陰血便紅。

黃連二錢 黃芩一錢 芍藥一錢 阿膠三錢 雞子黃生一枚 右三味水煎去滓。入阿膠烊盡小冷。入雞子

黃攬匀服。

葛根黃芩黃連湯玉函 治誤下痢不止。脈促喘而汗出。

葛根 半兩 黃芩 二錢 黃連 三錢 甘草 炙一錢 右四味先煮葛根。次內諸藥去滓分溫再服。

人中黃散 治痃瘧。

人中黃 一兩 雄黃 辰砂各一 炒黑。爲散每服二錢薄荷桔梗湯下。日三夜二服。

導赤瀉心湯 治熱傳手少陰神昏。

黃連 酒洗 黃芩 酒洗 山梔 蜜製 滑石碎 知母 犀角 甘草 生 人參 麝門冬 去心

茯神各一 生薑二片 大棗三枚 燈心一握 水煎熱服。此湯專治傷寒熱傳手少陰心經之證。薑取

金匱瀉心湯爲主。以其熱在上而不不在下。病在氣而不在血。故於本方裁去大黃易入山梔以清包絡之熱。知母犀角以解肺胃之煩。人參麥冬甘草茯神以安君主之神。滑石爲導赤之嚮。導薑棗爲散火之間。使用犀角者卽導赤散中之地黃。用滑石者卽導赤散中之木通。雖無導赤散中藥味。而導赤散之功效備其中矣。嘗見時師畏人參助火。除去不用。此與驅餓疲而禦大敵何異哉。

桂枝湯方祖

桃核承氣湯承氣  
湯下

麻黃湯方祖

黃龍湯承氣  
湯下

大青龍湯麻黃  
湯下

五苓散方祖

小柴胡湯方祖



北京中医药大学图书馆版权所有

藿香正氣散

平胃散下

梔子豉湯

方祖

白通湯

四逆湯下

越婢湯

麻黃湯下

涼膈散

方祖

三黃梔子豉湯

三黃湯下

附子理中湯

理中湯下

附子理中湯

理中湯下

附子理中湯

理中湯下

生脈散

方祖

## 暑門

一物瓜蒂湯

金匱

治夏暑以水灌汗。身熱疼痛。

瓜蒂

十四個熬剉

右一味水煎去滓頓服。少頃卽吐。不吐探之。此方之妙全在探吐以發越鬱遏之陽氣。則周身汗出表和而在內之煩熱得苦寒湧泄亦蕩滌無餘。今人目睹其方而不知用。醫道之陋。何

瀉心湯

方祖

枳實梔子豉湯

梔子豉湯下

通脈四逆湯

四逆湯下

桂枝二越婢一湯

桂枝湯下

雙解散

涼膈散下

桂枝二越婢一湯

桂枝湯下

清熱解毒湯

白虎湯下

保元湯

方祖尤附

回陽返本湯

四逆湯下

附子理中湯

理中湯下

附子湯

尤附

回陽返本湯

四逆湯下

附子理中湯

理中湯下

黃芩湯

桂枝湯下

黃連解毒湯

三黃湯下

人中黃丸

三黃湯下

異功散

四君子湯下

乾薑人參半夏丸

理中湯下

生地黃黃連湯

四物湯下

生地黃黃連湯

理中湯下

白虎湯

方祖

枳實理中湯

桂枝湯下

當歸四逆湯

桂枝湯下

白虎湯

方祖

枳實理中湯

桂枝湯下

生地黃黃連湯

理中湯下

生地黃黃連湯

理中湯下

生地黃黃連湯

理中湯下

生地黃黃連湯

理中湯下

生地黃黃連湯

理中湯下

生地黃黃連湯

理中湯下

竟若此。

消暑十全散 治傷暑兼感風邪發熱頭痛。

香薷二錢 蒜豆炒搗厚朴 薑製陳皮

甘草炙 白朮

茯苓

大瓜

藿香

蘇葉各一錢 水煎熱服無時取微汗效。

香薷飲局方

治傷暑腹中不和煩渴引飲。

香薷二錢 厚朴薑製 蒜豆炒研一錢 甘草炙一錢

水煎井中沉冷服之身熱欲得汗者熱服。

黃連香薷飲活人

治傷暑大熱煩渴。

香薷二錢 黃連酒炒半錢 厚朴薑製 一錢 水煎熱服。

導赤散局方

治小腸實熱小便赤濇。

生地黃五錢 木通 甘草梢生各竹葉一握

右四味水煎熱服瀉血加辰砂五分。一方多燈草。一方多車前。

十味香薷飲 治傷暑體倦神昏頭重吐利。

香薷二錢 人參

黃耆酒炒 白朮

茯苓

甘草炙 蒜豆

陳皮 醋炒厚朴 薑製

木瓜各一錢 水煎欲作汗熱服欲利小便冷服。