

醫方十種彙編卷二



武進費伯雄鑒定

外科摘錄

京江
文成堂藏板



外科摘錄目次

武進費伯雄先生鑑定

萍鄉文

晟叔來輯

男星瑞重校刊

星昭全校

首卷

外科十法

內消法

艾炙法

神火照法

刀針砭石法

復論五善七惡救

援法將息法

證治方藥

發背

對心發

腎俞發

搭肩

手發

足發

鬚疽

發頤

時毒

大頭天行

對口

偏對口

井口

疔疽

脇癰

肚癰

穿骨疽

魚口

便毒

橫痃

方藥二則

外科摘錄

目次



南京中医药大学图书馆版权所有

總治大瘡
瘡疽發背腫毒等症
治良方共四十五條

卷二 雜症

痲瘋
痲瘋發於肌表
非真大痲瘋

楊梅瘡十一

結毒六方

疥瘡
人中疥
開口疥
對口疥
魚口瘡

臍疔
蛇頭疔
紅絲疔

一切頭瘡
腦土癰
奇痒漸至髮落
頭腦

秃瘡
癰癩
赤秃
出膿
秃瘡

羊鬚瘡
癰頭
癰瘰
秃瘡

火珠瘡
形如珠
天泡瘡
形如水泡
治天泡瘡濕熱肥瘡

雷頭風
頭上薄皮瘡
頭上生蛆

面耳目眉
面起白皮作痒出脂水
面生熱毒惡瘡
肺風

耳面肥瘡
骨槽風
初生于耳前連及腮項
面生五色瘡
贅肉疾子

面腫二條
疔腮腫痛
眼苞菌毒
眼皮生紅泡

爛弦風眼
眼土生星子
眼皮生珠
目生努肉
倒睫

拳毛
耳中有核
耳內出膿
耳中出血
諸蟲入耳

耳痛 爛耳 口舌喉瘡 上疳瘡 喉疳牙疳 口疳 口瘡

燕窩瘡 生眉間 舌喉瘡 齒牙齦縫 出血 小舌落

腫脹 木舌腫脹 舌土出血 舌出血 喉蛾喉閉

喉中腫痛 喉風 風火喉腫痛 鼻生瘡肉 人中腫太

頭面諸疾 漆瘡 汗斑 雀斑 白癬風 紫癰風 點痣

頸後結毒 扭扣風 生項下 頑車開不能合 鬚疽二條

對口疽 瘰癧 證治一條

瘰癧 證治共十一條 枯 手足諸疾 晚疽多生足指

脫疽 初起水窠黃泡 手足腫痛以及無名腫毒初起 年

久左右癰換 手指腫痛 手足心腫 又指 蛇頭毒

代指 鵝掌風 穿掌毒生于手心 手足皸裂 手足凍

瘡 手足瘡痛紅爛 手足瘡無力不能收口 石榴疽生

肘尖上 合骨疔生虎口 虎口毒 癰結串生于兩手

瘰癧生于手足肩背壘壘如赤豆 爛膀瘡 治搭手

脇疽 兩 流注濕痰 證治十條

腋狐臭 乳癰 乳巖 男人乳癰畧同 臍瘡 二條 龜胸 龜背 另見

癰 癰 癰 癰 癰 癰 癰 癰 癰 癰 癰 癰 癰 癰 癰 癰

癰 癰 癰 癰 癰 癰 癰 癰 癰 癰 癰 癰 癰 癰 癰 癰



多骨疽三條

附骨疽

皮膚諸疾

蟻蠅腫塊蔓延

人身急救便藥

諸般熱毒

子漸如水泡

疥癩瘡子三條

天行發毒

天火瘡初起

瘡一串十餘個

疥癩瘡子三條

各種丹毒

天火瘡初起

諸瘡發癢

疥癩瘡子三條

肥瘡坐根瘡

汗斑

肺癰證治六條

肺痿

小腹瘡

身上無故一孔出血

血疥出血不止

血箭

下部諸疾

腎腫

血瘰

腸癰證治七條

下部諸疾

腎腫

腎囊風

腎子爛出

陰囊生瘡

陰囊生瘡

疝痛并囊腫

腎子爛出

陰囊生瘡

陰囊生瘡

爛即龜頭生瘡

證治共七條

腎莖疔

門搔痒

于尾間高骨

脫肛

膿毒肛瘻

內外痔瘡

十八條

魚口生左

便毒生右

對後

人面瘡

膝上生瘰

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚指

腫痛

腫腹內成塊

爛腿

爛脚

脚指

腿足諸疾

血風赤遊風

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

人面瘡

膝上生瘰

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

腫痛

腫腹內成塊

爛腿

爛脚

脚指

腿足諸疾

血風赤遊風

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

人面瘡

膝上生瘰

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

腫痛

腫腹內成塊

爛腿

爛脚

脚指

腿足諸疾

血風赤遊風

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

人面瘡

膝上生瘰

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

腫痛

腫腹內成塊

爛腿

爛脚

脚指

腿足諸疾

血風赤遊風

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

人面瘡

膝上生瘰

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

腫痛

腫腹內成塊

爛腿

爛脚

脚指

腿足諸疾

血風赤遊風

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

人面瘡

膝上生瘰

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

腫痛

腫腹內成塊

爛腿

爛脚

脚指

腿足諸疾

血風赤遊風

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

人面瘡

膝上生瘰

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

腫痛

腫腹內成塊

爛腿

爛脚

脚指

腿足諸疾

血風赤遊風

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

人面瘡

膝上生瘰

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

腫痛

腫腹內成塊

爛腿

爛脚

脚指

腿足諸疾

血風赤遊風

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

人面瘡

膝上生瘰

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

腫痛

腫腹內成塊

爛腿

爛脚

脚指

腿足諸疾

血風赤遊風

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

人面瘡

膝上生瘰

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

腫痛

腫腹內成塊

爛腿

爛脚

脚指

腿足諸疾

血風赤遊風

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

人面瘡

膝上生瘰

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

腫痛

腫腹內成塊

爛腿

爛脚

脚指

腿足諸疾

血風赤遊風

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

人面瘡

膝上生瘰

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

腫痛

腫腹內成塊

爛腿

爛脚

脚指

腿足諸疾

血風赤遊風

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

人面瘡

膝上生瘰

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

腫痛

腫腹內成塊

爛腿

爛脚

脚指

腿足諸疾

血風赤遊風

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

人面瘡

膝上生瘰

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

腫痛

腫腹內成塊

爛腿

爛脚

脚指

腿足諸疾

血風赤遊風

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

人面瘡

膝上生瘰

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

腫痛

腫腹內成塊

爛腿

爛脚

脚指

腿足諸疾

血風赤遊風

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

人面瘡

膝上生瘰

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

腫痛

腫腹內成塊

爛腿

爛脚

脚指

腿足諸疾

血風赤遊風

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

人面瘡

膝上生瘰

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

腫痛

腫腹內成塊

爛腿

爛脚

脚指

腿足諸疾

血風赤遊風

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

人面瘡

膝上生瘰

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

腫痛

腫腹內成塊

爛腿

爛脚

脚指

腿足諸疾

血風赤遊風

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

人面瘡

膝上生瘰

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

腫痛

腫腹內成塊

爛腿

爛脚

脚指

腿足諸疾

血風赤遊風

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

人面瘡

膝上生瘰

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

腫痛

腫腹內成塊

爛腿

爛脚

脚指

腿足諸疾

血風赤遊風

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

人面瘡

膝上生瘰

脚腿紅腫

穿火炙

爛脚

腫痛

腫痛 脚上雞眼 遠行脚腫 足瘡 甲疽 脚上風血
 努肉裹趾 脚底板紅腫熱痛 凍指 凍瘡 脚上成泡 脚上風血
 脚丫濕爛 凍瘡手脚指欲墮 遠行脚上成泡 脚上風血
 靴小擦破 脚上生瘡其孔久不長肉 鶴膝風 脚上風血
 則年久癰瘡 脛瘡生脚肚

補遺 龍泉疽發在人中之間 虎鬚毒生於地角之上

齒唇

羊鬚瘡



外科摘錄 首卷

武進賈伯雄先生鑑定

萍鄉文 晟叔來輯

男星瑞重校刊

星輝 全校

外科十法

內消者、腫痛初起、隨自、用藥消散也。凡病癰疽、發背、對口、疔毒、其初起、增寒壯熱、有似傷寒而痛偏着一處、飲食如常者、蓄積有膿也。當初起時、膿尚未成、不過氣血乖違、逆于肉裏耳。外敷遠志膏、或貼普救萬全膏、內服銀花甘草湯、即時消散。若係疔瘡、急宜刺破、或艾炙腫處、搽上蟾酥餅、貼以萬全膏、內服菊花甘草湯、隨即



平復菊花連根帶葉皆治疔瘡之聖藥也。其中亦有挾風寒而發者。宜先用芫芷香蘇散以散之。隨服銀花菊花等藥。即可內消。須及早下手。不可遲滯。

艾炙法二

隔蒜炙法。勝用刀針。書云。不痛灸至痛。痛灸不痛時。凡治癰疽疔腫。流注及一切無名腫毒。以大蒜切片。安瘡頂上。用陳艾炷安蒜上。香點灸之。其艾炷大小。看瘡毒大小。爲取裁。若癰疽之大者。以蒜搗餅敷之。灸之不痛者。灸至痛而止。痛者。灸至不痛而止。若內已有膿。卽將烏金膏塗灸處。外用普救萬金膏貼之。爛開大口。卸却瘀膿。易收功也。若口不收。或腐肉不脫。洗用防風湯敷以海浮



散外貼萬全膏。腐自去。新自生。計日可愈。真神藥也。

神火照法三

凡腫在頭面以上者。不宜艾炙。恐引火氣上攻。宜用火照法。神乎其神。法用火照散。安紙擦中。以麻油浸點。每用火三枚。離毒半寸許。照之。自外而內。俾藥氣透入。皮色紫滯者。立轉紅活。瘡勢平塌者。立轉高聳。仍須不時照之。則毒氣頓解。轉陰爲陽。以收全功。且此法不止施于頭面。卽如發背等毒。亦宜用之。其頭面患毒。亦有用艾炙而愈者。因其毒純陰。平塌頑麻。非艾炙無功。但艾炷宜小。如麥粒樣式。二法乃瘡疽門之寶筏。宜互相參攷。以神其用。

刀針砭石法四



凡毒有脹痛緊急。膿已成熟。無暇待灼艾火照者。卽宜用刀法開之。但刀法須在的確。膿熟之時。又須要淺深合度。以左手按腫處。先看膿之成否。如按下軟而不痛。腫隨手起者。膿已成也。按下硬而痛。或凹陷不起者。膿未成也。已成膿者可刺。未成膿者。宜姑待之。若脾虛氣弱者。宜托補之。又須看其膿之深淺。以手指按下。軟肉深者。其膿必深。軟肉淺者。其膿亦淺。若膿淺刀深。恐傷好肉。膿深刀淺。恐毒不出而內敗。最宜斟酌。更有伏骨之疽。膿腐於肉。皮色不變者。宜以刀刺入深處。放出瘀膿。或炙開大口放出之。不得姑息。因循。俾毒氣越爛越深也。其小刀須利。勿令病者見之。恐驚彼耳。砭法施于頭面及耳前後。因其漫腫無頭。急用此法以瀉。

其毒取上細磁鋒用竹箸夾定緊緊放鋒出半分對患處
敲之徧刺腫處俾紫血多出爲善刺畢以精肉貼片時再用雞子
清調乳香末潤之此地不宜成膿頭肉中空耳前後更多曲折提
膿拔毒恒多未便故砭法斷宜早施

圍藥法 五

書云用膏貼頂上敷藥四邊圍凡腫毒之大者將以成膿用烏金
膏貼瘡頭上然後用萬全膏蓋之四旁用芙蓉膏敷之貼膏處取
其出膿敷藥處取其消散並能箍住脚不令展開共作三層敷圍
法第一層用烏金膏貼瘡頭若漫腫無頭以濕紙貼上先乾處是
瘡頭也第二層萬全膏貼之第三層芙蓉膏圍之然予嘗用萬全



膏徧覆腫處連根脚一齊箍住其中消處自消潰處自潰竟收全功可見膏藥之妙矣

開口除膿法六

凡治瘡疽口小膿多則膿不出或出而不盡或薄膿可出硬膿難出以致瘀不去而新不生延綿難愈法當爛開大口俾瘀膿盡出爲善其爛藥烏金散最佳祛瘀肉不傷新肉且不甚掀痛爲至妙也若有膿管以綿紙撚裏藥絰入頻換數條卽化祛耳亦有頑硬之極非烏金散所能去者則用化腐紫霜膏搽之然終不若烏金散爲至穩

收口法七

凡瘡疽最難收口者山瘀肉夾襖瘀膿不盡所致庸工不識妄用



補瀉之劑。勉強收口。恐他日內毒復發。更甚於目前。惟予所用海浮散。堪稱至寶。以此敷上。瘀肉自脫。不必用刀。新肉自生。又不藏毒。萬舉萬當也。大法先用防風湯洗之。再上末藥洗時。須避風。為主書云。頻將湯洗。切忌風吹。是已。更有體虛不能收口者。須內服補藥以助之。

總論服藥法八

凡瘡疽服藥。宜照顧脾胃為主。不得已而用清涼。但期中病。切勿過劑。大法初起時。設有挾風寒者。宜先用芎芷香蘇散一劑。以散之。散後而腫未消。隨用銀花甘草以和解之。若腫勢掀痛。大便閉結。內熱極盛者。則用衛生湯加大黃以疏利之。若病勢雖盛。而元

氣漸虛者。則清藥中須兼托補之劑。透膿散主之。若膿水已潰。必須托補。元氣爲主。參耆內托散主之。如或元氣虛寒。則托補藥中須用辛熱以佐之。脾虛者。理中湯。參苓白朮散。氣虛下陷者。補中益氣湯。胃經受寒。飲食停滯者。藿香正氣散。氣血兩虛者。十全大補湯。加附子。鹿茸。輩間亦有虛而挾熱者。卽于前方中去附子。姜桂。加麥冬。銀花。丹皮等藥。以收功。是又不可不知也。大抵有陽毒有陰毒。有半陰半陽。宜細辨之。陽毒者。瘡勢紅腫。瘡頂尖聳。根腳不散。飲食如常。口渴便結。五心煩熱。脈洪數。陰毒者。瘡勢灰白。平塌。頑麻少痛。根腳走散。食少便溏。手足厥冷。口鼻氣冷。脈沉遲。半陰半陽者。瘡腫雖紅。不甚聳尖。飲食差減。大便不結。寒熱往來。微

渴喜熱。脉虛軟。此三者。必須細辨。俾用藥寒溫得宜。方爲治法。陽者。清涼解毒。治陰者。溫中回陽。半陰半陽之治。清不傷胃。溫不助邪。如斯而已矣。

復論五善七惡救援法九

或問癰疽五善七惡何謂也。答曰。飲食知味。一也。便溺調勻。二也。膿潰腫消。膿水不臭。三也。神氣清爽。動息自安。四也。脉息有神。不違時令。五也。七惡者。大渴發熱。泄瀉淋閉。一也。膿潰尤腫。膿稀臭穢。二也。目睛無神。語聲不亮。三也。食少不化。服藥作嘔。四也。恍惚嗜臥。氣短力乏。腰背沉重。五也。唇青鼻黑。面目浮腫。六也。脉息無神。或躁動不和。七也。古語云。五善得三則吉。七惡得四則凶。余謂



七惡之凶不待四矣。然而拯救之法正不容以不講。大抵熱渴、喘急、內熱、皆直陰受傷。宜用六味湯加麥冬、五味。如不應，用八珍湯加麥冬、五味，更不應，用十全大補湯兼服六味、地黃。此四法補陽生陰之說也。若氣短、倦怠、昏憤、乏力、飲食不化，乃陽虛之候。宜用補中益氣湯。若睡卧不安，宜用歸脾湯。若飲食減少、面目浮腫，宜用香砂六君子湯。若兼脾胃虛寒，更用理中湯。腎氣虛寒，須用桂附八味丸。兼用十全大補湯加附子，此溫補回陽之法。若瘡疽潰後膿血去多，變爲角弓反張、手足搐搦、肢體振搖而發瘡者，并宜用參芪歸朮附子等藥以救之。如不應，急用十全大補湯間有可生者。當此時勢性命急如懸縷，司命者宜叮嚀反覆熟思而