

救偏瑣言六八

救偏瑣言卷之六

申明貫珠攢簇怪痘

痘不在乎稀得勻朗散布。雖多何害。若連串貫珠有
形相似。而雜乎其間者。若堆聚攢簇。有象可名。而間
乎其內者。有一於此。空地雖多。亦何取焉。須知梟毒
深藏。氣血錮閉。毒無領載。痘不得透。故多隙地。內却
受其殃。其貫珠攢簇者。梟毒衝突。氣血不能駕馭。一
任毒之縱橫。凝結成條者。外見連串貫珠。團結片塊
者。外見堆聚攢簇。誠中形外。信不誣也。是毒禍而不


暴伏而不透猶賊之巨魁也。此毒不治諸痘皆爲拒。治不以攻治之何益。巨魁授首前途不戰有倒戈之勢。然世於貫珠者習矣。不察而多忽。於攢簇者歸咎于命而棄絕焉。興言及此亦慘甚矣。庶狀其圖象或得觸目經心。詳其治法或得挽回萬一。未必無小補云。

遊蚕

○○○○○○○

是痘貫珠成條其形如蚕故燕窩名遊蚕有稀密有長短身上者輕頭面者重身上短而稀所見無多者輕長而密更繁多者重則必攻令鬆透如一赤豆莢其毒方起

疊錢



是痘圓圓攢簇絕不成點錢計之大故名之也。僅見二三者輕多見者重重則必攻亦以藥胭脂膏封貼更和猪尾膏大桑蟲于劑內透之冷毒如蒸餅其毒方透

雁行



是痘攢簇疊疊象似燕窩而名者也。單見尚重見而不一者不治急攻之務令鬆擡如餅其毒方化以油胭脂調入化毒丹用綿紙攤貼更佐以猪尾膏大桑蟲

雁行者狀似遊蚕但曲而甚長以其排行而若鴈字也。單見者亦重不一者更重矣攻之鬆若遊蚕而毒化矣

鼠跡

是痘或四五粒或六七點相



簇如鼠跡故以是名無多者輕見於周身者重重則必攻令相併成泡其毒方鬆劑內請入化毒丹并猪尾膏

珠殼

珠殼者其痘有莢而平四圍

貼附一細圈宛如珠殼無多


者輕及於周身者重重者必

攻務令圓滿綻突其毒方透



瓢沙

瓢沙者其痘扁闊歪斜無頂



無盤有剏點如沙攢簇于囊宛似瓢沙而名之也可以數紀者輕徧及者重重則必攻務令高擡如茨實殼其毒纔化而成漿

鳥跡

鳥跡者連串三條頭簇脚開

其痘若鳥之跡也單見者輕


五六處者重重者必攻亦如

遊蚕鬆透爲準



蟹爪

蟹爪者貫珠連串粒細一粒尖稍有隱隱黑絲如髮竟與蟹爪無異無幾者輕繁多者重重者必攻其形統脹成條而毒盡洩矣。




履底

履底者形似蛇皮不若蛇皮散漫耳隨處皆凶其形得小更得早圖庶可有為速以猪尾膏和入攻毒劑內并大棗蟲透之急以藥胭脂膏封貼令得膿水淋漓方能慶生。




蛇皮

叢簇成片散漫無拘形似蛇皮而名之也見此不治或見點之初燈下照之隱隱簇簇細密無倫將形未形之際即便攻之佐以猪尾膏破之不使其成庶可有為。



蟾窩

蟾窩者較疊錢而更大也另別其名者其形大其毒亦更重也即屈指無多毒已不淺攻之自不容已佐以大棗蟲猪尾膏外亦以藥胭脂貼得鬆泛平擢方可成膿。




蛇疔




其毒頭大根尖頂黑形若螺肉深入于肉裡有大小有深淺按其四圍板硬治法見於餘毒若放點時而即見者最惡先以挑鬆即將應服之藥大人含于口中吮其數次隨用法

環珠



是痘連串環遶故以是名有臂因鐳阻痘即如鐳而遶者有項以圖繫痘即如圈而聚者於臂稍輕於項則重因阻猶重無因更重不特項臂為然頭身亦有之凡見宜攻

紫背



瘡之形似萍其色似萍之背紫而帶黑有六有小目之有點手按無形無幾便繁多者莫救急宜攻毒破瘀務令漸淡淡而退去方可回生必須早圖

遊蚕治驗

吾宗漣漪。四歲一愛。身熱如火。神情昏憤。兩頰通紅。鼻衄成流。身上隱隱數點。色滯乾紅。以必勝湯減紅花地龍。加佗參二劑後。紅中泛點。細碎如麻。周身稠密如鋪。而多遊蚕珠殼亦間乎其間。前方服至三朝。兩頰界地未清。却成顆粒。滯色畧轉。每劑和大桑蟲一枚。六朝滯變爲紅。色猶如絳。唇口腫裂前方減蟬蛻葛根。加黃連石膏。七朝放白。珠殼泛頂。九朝遊蚕統脹成條。時或咬牙腹痛。熱猶

火熾。十一二朝。頭收斂而痂燥。身漿滿而盤暈。猶赤。神情尚困而未舒。以一方貫及十六朝。發臭異常。二十朝諸症頓愈。寢食得安而收全功。後左眼赤痛多淚。以撥雲散治之得痊。

風蟬窩治驗

張又卓兄。一小公郎。方一歲。一日壯熱如烙。徧體如霞。痘不甚密。色滯而平。有蟬窩見於手背。神情愁楚。不時叫哭。是腹痛使然。以消癰快毒湯加大黃。臨服和桑蟲一枚。日服二劑。手背以胭脂封貼。

六朝霞色清。愁眉散。手背鬆浮泛白。七朝氣尊血
附。俱放白成漿。熱勢減半。去大黃蟬蛻黃連。加連
翹。佗參。日服一劑。十二朝回好。

疊錢治驗

一錢氏子。四歲。痘在五朝。唇裂掀腫。體熱如火。頭
面稠無隙地。身上疎明板實。磬紅。四肢胸脇。疊錢
者不一而足。躁亂不寧。以涼血攻毒飲。加山查地
丁。減犀角。和大桑蟲一枚。日服二大劑。更以金汁
日服。蓋餘外用胭脂膏封貼。至八朝。鬆泛如蒸餅。

十朝通身漿足。十二朝漿臭收結。十四朝身熱始和。寢食俱安。方易忍冬解毒湯收功。

珠殼治驗

韓尺龍兄一公郎六歲。乙未仲夏。一日忽體熱如
爐。頭面通紅。神情昏憤。見痘稠無餘地。僅不細碎
盤若塗硃。內有珠殼幾半。以涼血攻毒飲。倍生地
大黃。去紅花紫草。加玄參地丁。四朝加黃連。每劑
和大桑蟲一枚。五朝神情清爽。七朝珠殼皆透。減
蟬蛻葛根桑蟲。九朝漿足。十朝紅暈漸淡。飲食漸

進頭面收結。十二朝壯熱方和。遂去大黃。減生地及半。十六朝回足。如此血熱。不致帶火成痢。爬肌抓肉。大黃生地荆芥之力不淺也。後以忍冬解毒湯調治。落痢未久。腠理未固。餘毒亦未能盡淨。見風太早。忽爾昏暈。急以疏風消毒飲而愈。

鼠跡蘘沙治驗

吾宗儻如一子。一日身熱如火。汗出如油。神情困苦難支。似痘非痘。數點隱隱于頭面。色滯乾紅。痘本是而若非。且熱如火。汗如油。非惡痘不爾。以清

熱透肌湯。未用生地。加大黃。二劑後。次日頭面細
碎如麻。身上見點處若集。隱伏處若無。此氣爲毒
滯而通塞不均也。又二劑。頭面顆粒分明。色亦寬
潤。汗卽頓收。徧體湧出。內間鼠跡瓢沙。難以數紀。
囊窠不鬆。色近于白。此血爲毒鬱而未著。非血虛
白也。不則有一體兩局者乎。前劑每服和大桑蟲
一枚。五朝窠脚漸鬆。囊頂未起。色轉深紅。神情得
定。熱不稍減。前方重以生地。加黃連石膏。至九朝
頂綻。食稀粥碗許。十一朝。鼠跡與瓢沙俱得統脹。

如泡而漿俱濃。十四朝盤暈始淡。頭面收結。十六朝身得溫和。胃氣日強。方易忍冬解毒湯調治。至二十朝收功。弗藥。

鴈行治驗

有一段氏子。三歲見痘。三朝兩顴細如蚕種。背多雁行。更有蘗沙間乎其間。椒紅其色。叫喊不已。熾熱如焚。以清涼攻毒飲。和桑蟲一枚。日服二劑。四朝顴卽成顆。六朝色卽紅活。八朝怪象俱統。脹放白。十朝漿足。猶然愁楚。不能進食。一方服及十四

朝。眉宇方舒。得進飲食。身體溫和。一朝霍然。收靨落痂而愈。

蛇皮治驗

一女年及十四歲。倏爾身熱如火。神卽昏憤。兩眼如畏刀鋸。徧體如霞。痘未及見。死期若將至矣。卽以大黃石膏一兩。生地七錢。佐以荊芥赤芍青皮葛根木通牛旁。日投三頭汁。次日午後見痘。細似泥沙。色似礬硃。通身無一隙地。前方又服四劑。卽成點粒。却稠密如鋪。方叫腹痛。畧知人事。大渴不

已。揭衣棄被。前方加黃連犀角。生地兩半。并大桑
蟲服至九朝。始得紅潤。周身起脹。十一朝。貫漿連
成一片如松皮。不能轉側。大便日去四五次。水米
不沾。十四朝發臭滿室。頭將收結。唇黑如煤。身若
寒戰。熱仍如火。一方貫至十六朝。頓思飲食。夜臥
得半。熱渴稍減。二十朝外。痂成一片。如蛻一殼。得
脫此難。方易忍冬解毒湯。月餘全愈。約用大黃觔
半。生地石膏二觔餘。是痘得治于未見之前。更得
首尾一轍。庶得挽回。若令見點。其勢便成。牢不可

破矣。

蟹爪治驗

中介閔老先生。三公郎。方半週。痘出稠密如鋪色。滯乾紅。窠粒平板。內多蟹爪。身體壯熱。脉惕筋抽。時在二朝。以鬆肌透毒散。加大黃七分。和入桑蟲錢許一枚。日服二頭汁。次日粒數卽磊落。四朝紅潤。八朝鬆泛。九朝行漿。遂減大黃。十朝安睡。乳食如故。大便如常。收回而愈。

燕窩治驗