

丹台玉案

丹臺主案卷之三

明新安休邑後學孫文胤對薇父叅著
嵎峨縣令友生游士進旂揚父較正
常山縣庠盟弟徐待問洪鍾文
雲間盟弟何遠履方父

全閱

瘧疾門

夫瘧者。殘虐之意也。從病從虐。故名曰瘧。是病者多
發於秋。因夏傷於暑。故至秋而發也。有先寒後熱。先
熱後寒。單寒無熱。單熱無寒。大寒大熱。微寒微熱之

異分而言之。先寒後熱者。先得於寒。先熱後寒者。先得於熱。又云。先熱者爲血虛。先寒者爲氣虛。單寒無熱者。內傷必重。單熱無寒者。內病必多。大寒大熱者。邪必深微。寒微熱者。邪必淺。又有久寒久熱。經年累月而不愈者。必其不守禁忌。兼以元氣虛弱。取也。合而言之。不專於外傷客邪。亦平日飲酒不節。及七情六慾所傷。兼之以脾衰痰而不散。與內之飲食外之寒氣相結。交固流聚於少陽之分。少陽位人身之中。陰陽往來必由之路。又在半表半裏之間。陰血流

過其處激而發熱。或陰陽交會則寒熱交作。久而不愈則結成瘧母。藏於脇下。脇下者少陽之分也。治此病者以引經藥引至少陽之分。而以消食化痰疎風調氣之劑。量其輕重而投之。無不應矣。然同一瘧也。有一日之發。間日一發。有三日一發者。何也。蓋病之所出來者有遠近也。冬傷於寒。不即病。直至明年秋而後發者。則三日一發之瘧也。三日一發者。受病或一年間日一發。受病或半年一日一發。受病或三月。每以得病之遠近爲所發之日期也。醫者以心度之。

見其三日一發。則知其得於寒。當以辛溫之藥散之。
見其間日一發。則知其得於暑。當以清暑之藥治之。
然又必見其症有相合者。方可接也。如浙西但初發
瘧疾者。皆言謂之胎瘧。蓋莫敢服藥。若瘧疾始初不
去疎表邪。何能自散。而愈發愈盛矣。及至延之日久。
氣血兩虛。肝邪日旺。脾經受尅。以至四肢消瘦。飲食
少進。面黃膚腫。纔議用藥。如體厚者還可救療。體弱
者竟無救矣。既然有胎瘧。亦該有胎傷寒。胎痢疾之
說。何獨瘧疾有胎。而他疾無胎乎。此言大謬之甚。如

此說明。後人諒不再朦蔽。以至誤人之性命者。耳。然
不拘初發再發。但有食則消食。有痰則化痰。有風則
散風。有寒則攻寒。有熱則驅熱。有氣則開氣。新病則
去其病。久病則補其元。神而明之。則存乎人也。

脉云

瘧脉自弦。弦遲多寒。弦數多熱。代散則死。弦短者傷
食。弦滑者多痰。弦如刀刃者死。弦小者生。

立方

清脾飲

治脾瘧脉來弦數。或熱多寒少。日苦咽乾。

小便赤澀

茯苓 去皮 青皮 醋炒 厚朴 薑製 草菓 去皮

半夏 各六分 薑馨製 白朮 土炒 黃芩 酒炒

柴胡 各一錢 甘草 四分

水二鍾 薑三片 棗二枚 煎七分 空心服。

桂枝芍藥湯 治瘧大作戰動陽盛陰虛此太陽陽

明合病也。

桂枝 一錢五分 黃蓍 知母 芍藥

石膏 各三分

水二鍾薑五片熱服。

四獸飲

治五臟氣虛陽明偏勝結聚涎飲與胃經

相傳者。

白朮

人參

各一錢

甘草

茯苓

半夏

各八分

陳皮

一錢二分

烏梅

一箇

水二鍾薑三片棗二枚空心服。

七寶飲

治一切瘧疾無論寒熱多少及山嵐瘴氣

青皮

陳皮

厚朴

甘草

各一錢二分

草薺

檳榔

常山

水酒各一鍾。清晨服。

蟹甲飲子

治瘡久不愈。脇下痞滿。腹中結塊。各日

瘡母。

川芎

黃耆

白朮

蟹甲

各一錢五分

草菓

橘紅

甘草

白芍

檳榔

厚朴

各八分

烏梅二箇

水二鍾。棗一枚。食遠服。

秘驗方

治瘡疾久遠不愈。一服止。

人參

三錢

知母

白朮

柴胡

藿香

各一錢六分

常山

一錢 烏梅

七箇

何首烏

一錢四分

水二鍾薑三片煎八分露一宿空心服。

神妙丸

治瘧母積塊作痛發熱。

真沉香

兩 阿魏

檳榔

穿山甲

雲木

各一兩五錢

硃砂

雄黃

各八錢

右共為細末醋和為丸如梧桐子大每服六十九

空心薑湯下。

參苓養胃湯

治瘧多寒少熱脾胃虛弱飲食不進

受暑以致癰疾。

黃蓍

白朮

黃芩

人參

柴胡

各一錢

半夏

陳皮

各八分

升麻

三分

白芍

當歸

各一錢二分

甘草

五分

水二鍾薑三片棗二枚空心服。

七棗湯

治癰疾但寒無熱。

附子

一箇以鹽水浸泡七次去皮臍

分爲二服水二鍾棗七枚薑七片煎七分臨發日

空心服。

二陳湯

以此湯為主。照各經病症。加藥錄後。

茯苓一錢

甘草

六分

陳皮

半夏

各一錢五分

太陽經瘧。必腰背頭項俱痛。加藁本。防風。羌活。

少陽經瘧。必口苦嘔吐。惡心脇痛。加柴胡。黃芩。青皮。

陰經瘧。發于子午卯酉四正之日。舌乾口燥。嘔吐。

欲閉戶牖。加芩歸黃連黃柏。或小柴胡。半夏。

厥陰經瘧。發於寅申巳亥四旁之日。小腹痛。引入陰。

作淋。加桂枝。蓄附。重者。四物加玄胡。金鈴子。附子。

經瘧。發於辰戌丑未之日。腹滿自利。善嘔。嘔已。

加蒼白朮柴胡此三味瘧家必用以止三陰
血分受病發在處暑後者俱謂之瘧瘧寒重者理
中湯方見傷寒門

痢疾門

無痢疾之名惟曰滯下。今從病從利故名之曰痢。
其爲症豈一朝一夕之故哉。蓋因平素飲食不節。
滯膩生於恣食無忌。或飢飽。或冷熱不擇。停蓄
於中。久而不化。又或感暑濕。內傷七情。行房於既
醉之餘。勞力於過飽之後。皆積滯之物。煨煉稠粘。有赤

日相雜與純黃之異不見

四惟見其積者蒼

氣血而變成也。傷於血則變爲青。傷於氣則變爲白。氣血俱傷則赤白兼黃。則脾家亦傷而純於赤白者。亦未必非傷脾之所致也。使其無赤白而其色純黃。則專傷脾土而氣與血猶未甚動焉。至若下痢如黑塵之色。及屋漏水者。皆不治之症。而噤口者亦多。灰以其無胃氣而邪熱獨結於上也。大法初起當先推蕩。而後調理。病久則帶血。帶收切不可驟用澀藥。初痢澀積蓄不去多致死亡。又不可因久利之人氣

血不攝。妄投黃耆升麻之類。下痢若服黃耆。卽發膨脹。多服升麻。則小便與損皆升至上焦。此速死之道也。但傷血則調血。傷氣則調氣。傷脾則養脾。當寒而寒。當溫而溫。當燥而燥。當清而清。因病用藥。其可以執一乎。

脉云

下痢之脉。宜微小。忌浮洪。宜滑大。忌弦急。所謂身涼脉細者。生。身熱脉大者。死。叔和云。下痢微小却回生。脉大浮洪無瘥日。

方

導滯湯

治初痢膿血赤白混雜裏急後重日夜無

度

黃芩

酒炒

黃連

酒炒

木香

各二錢

當歸

赤芍

檳榔

山查

各錢五分

大黃

三錢

水二鍾煎入分熱服

木苓調中湯

治過傷飲食大便泄瀉下痢肚腹膨

脹等症

白芍

猪苓

茯苓

澤瀉

厚朴

各一錢二分

陳皮

甘草

蒼朮

白朮

各八分

山查

香附

麥芽

神麴

各一錢

燈心三十莖食前服。

倉廩湯

治噤口痢熱毒盛極。水米不下。

前胡

柴胡

甘草

厚朴

川芎

各一錢

獨活

羌活

茯苓

桔梗

人參

各八分

陳倉米

三錢

棗二枚。食前服。